

62210/13

MEDICAL SOCIETY
OF LONDON



ACCESSION NUMBER

PRESS MARK

BRUNNER, B.

LONDON. MEDICAL SOCIETY OF

BALTHASARIS

BRUNNERI

SS. PRINCIPUM ANHALTINORUM

ARCHIATRI

ET

PRACTICI HALENSIS SAXONUM

FELICISSIMI

**CONSILIORUM
MEDICORUM**

LIBER UNICUS.

EX BIBLIOTHECA

JO. JACOBI STRASSKIRCHNERI

Med. D. & Practici

REIPUBLICÆ RATISPONENSIS.

ACCESSERUNT

VITA AUTORIS ET INDEX RERUM NOTABILIUM
COPIOSISSIMUS.



FRANCOFURTI ET LIPSIAE,

Apud **CAROLUM CHRISTOPHORUM IMMIG,**

BIBLIOPOLAM RATISPONENSEM.

MDCCXXVII.

D U U M - V I R I S
I N R E M E D I C A P E R I T I S S I M I S
V I R O
A D M O D U M R E V E R E N D O R E L I G I O S O
E T D O C T I S S I M O
I N C H R I S T O P A T R I
D O M I N O

D N. J O A C H I M O E D L I N G E R

O R D. S. P. B E N E D I C T I P R O F E S S O
E T

S U B - P R I O R I
M O N A S T E R I I S E I T E N S T E T T E N S I S
S P E C T A T I S S I M O E T M E R I T I S S I M O

A E Q U E A C
V I R O

N O B I L I S S I M O E X P E R I E N T I S S I M O
E T D O C T I S S I M O

D O M I N O

D N. G E O R G I O J O S E P H O
H Ü R S T E L L

P H I L O S O P H I Æ E T M E D I C I N Æ D O C T O R I
A C P H Y S I C O O R D I N A R I O

C I V I T A T I S E N S E N S I S A U S T R I Æ S U P E R I O R I S
M Æ C E N A T I B U S S U I S A C F A U T O R I B U S
G R A V I S S I M I S

C O N S I L I A H Æ C C E M E D I C A
I N T E S S E R A M D E V O T I O N I S S U Æ I N D E F E S S Æ
D. D. D.

C A R O L U S C H R I S T O P H O R U S I M M I G
B I B L I O P O L A R A T I S P O N E N S I S.

VITA AUTORIS

LAURENTIO HOFFMANNO,
MED. D. HALENSI
DESCRIPTA.

Dominus BALTHASAR BRUNNERUS, in salinis Saxo-
nicis oriundus, patre LAURENTIO, cive ac fenato-
re Halense, fatus, in schola patria prima jecit artium
liberalium fundamenta; postmodum in perantiquam Er-
fordensium academiam missus, tamdiu inibi commora-
tus est, usque dum totius philosophiæ encyclopædiam
absolvisset & magisterii gradum, primum studiorum seco-
rum præmium, magna cum laude consecutus esset.

Paulo post in academia Salana, præceptore usus cele-
berimo SCHROETERO, studium medicinæ feliciter inchoa-
vit, & in academia Lipsiensi continuavit, ubi etiam à Se-
natu academico in numerum Professorum extraordinario-
rum receptus, usque dum in Italiam proficisceretur. Com-
moratus autem est in Italia per integrum fere triennium,
familiaritate & conversatione usus præcellentissimorum
totius Italiæ medicorum & chirurgorum, inter quos præ-
cipui tunc temporis fuerant *Capivaccius*, *Mercurialis*,
Augenius, *Aquapendens* &c. tandem Hispaniam,
Galliam, Belgium & Angliam perlustravit, in iisdemque
etiam regionibus illa vidit & annotavit, quæ aliquan-
do sibi in praxi necessaria & fructuosa futura esse arbitra-
batur.

Helvetiam transiens in inclyta Rauracorum academia
Basiliensi summos in arte medica honores & doctoralia pe-
tiit insignia, postquam disputationem de phrenitide ha-

buisset, quæ etiam ineffabili omnium cum applausu, nemine penitus atque penitus discrepante, consentientibus & congratulantibus omnius, feliciter adeptus est.

Denique voti sui compos factus, in Germaniam reversus, celeberrimo trium invictissimorum Imperatorum medico, Domino CRATONI à CRAFTHEIM se humanissimè & modestissimè associavit, ita ut domesticus fuerit, ab ipso filii loco dilectus, cujus etiam suasu clarissimi Electorum & Marchionum Brandenburgicorum archiatro, Domini D. GEORGII LAURÆ p. m. gener factus est, qui ad praxin medicam fores ipsi quam fidelissimè & apertissimè aperuit, ita ut quotannis non saltem ipsius insignis eruditio, sed & nominis celebritas ingens indies ceperit incrementum; adeo ut multi Principes, Comites, Barones, Nobiles & alii viri primarii operam & curam ipsius in facienda medicina, quâ domi, quâ foris certatim expetiêre. Tunc igitur temporis CONSILIA sua conscribere aggressus est, quæ cum diversis sint scripta & collecta ætatibus, diversitatem etiam fortassis aliquam præ se ferent.

Et quanquam propter praxin medicam & peregrinationes penè quotidianas fuit occupatissimus, interim tamen in oratorio & laboratorio chymico sudare nunquam cessavit. Quotidiè enim unum vel duos aluit amanuenses chymicarum operationum haut ignaros sed in arte peritos, qui labores spagyricos promovere potuerunt. Ita enim in indagandis naturæ mysteriis ardebat, ut intra viginti annorum spatium plusquam sedecim millia florenorum, summa cum animi sui delectatione & satisfactione, in conficiendis arcanis chymicis & quæsitando lapide philosophico consumserit. Si etiam benignus & in omnia potens DEUS diuturniorem vitæ usuram ipsi concessisset, nullum super-

superest dubium, quin ad summa philosophiæ hermeticæ & veræ chymiciæ fastigia pervenisset, ita ut posteritas hermetica nunquam promeritas ipsi gratias reddere valuisset.

Cum igitur fama BRUNNERIANI nominis celeriter latè diffunderetur & ad aulas magnorum aliquot Principum aliorumque heroum transvolaret, iidemque quoque intelligerent ac exploratum haberent, BRUNNERUM non saltem græcè & latinè esse disertum, sed & germanicè eloquentem, insuper philosophum, medicum ac chymicum eximium & elegantem, multo illorum legitime ipsum per litteras vocarunt ac in numerum archiattrorum suorum receperunt, inter quos serenissimi & potentissimi heroes, CHRISTIANUS I. DUX ET ELECTOR SAXONIÆ & JOANNES GEORGIUS, ELECTOR ET MARCHIO BRANDENBURGICUS; non dicam de FRIDERICO GUILIELMO, DUCE SAXONIÆ, & ejusdem electoratus administratore DE MARCHIONE BADENSE, qui magnis sumtibus aliquando ipsum avocaverat.

Nec præterire possum illustrissimos & celsissimos Principes Anhaltinos JOACHIMUM ERNESTUM, JOANNEM GEORGIIUM, CHRISTIANUM, AUGUSTUM & cæteros, quorum archiatri munere per annos complures functus est. Præter hosce multi etiam alii Principes & Heroes ipsius usi sunt consiliis, inter quos primum facile sibi vindicat locum magnanimus & potentissimus Daniæ & Norvegiæ Rex, CHRISTIANUS DEI gratia hujus nominis IV.

Bis etiam ipsi professoris publicæ munus oblatum est ab illustribus academiis Heidelbergensi & Basileensi, sed amore patriæ compluriumque amicorum & cognatorum hortatu & precibus vocationes illas honestè recusavit & in patria remanere maluit.

Vixit

Vixit alias vitam inculpatam cum binis uxoribus & numerosa ex DEI vitæ datoris benedictione soble , in timore DEI & amore proximi , spartamque , quam nactus erat , studiosè exornavit , & quamquam millenis obrutus erat patientibus , interim tamen in studio , veritatis christianæ indagandæ occupatissimus erat , educationem liberorum & curas domesticas matrifamilias demandans , pauperibus etiam , sacerdotibus & præceptoribus omnibus gratis inserviens pari etiam fidelitate & cura pauperes æquè ac divites medicando respiciens.

Tandem post varios exantlatos labores , apoplexia debili correptus , per septennium ferè integrum enervatus ac senio quasi confectus , die nocteque de morte , vitæ æternæ janua , meditatus , anno Christi MDCIV. animulam suam redemptori suo ardentibus suspiriis commendavit , vitamque placidissimè cum morte commutavit , postquam LXXI. ætatis suæ annum complevisset.





CONSILIVM I.

IN DIUTURNO
CAPITIS DOLORE, ET DEFLU-

XIONE IN BRACHIA, PULMONES ET VENTRICU-
LUM: UBI ETIAM DE GENUINO CATARRHORUM
MEDICAMENTO BEZOARTICO
DISSEKITUR.



UÆ Clarissimi Medici de temperamento
Nobilis & generosi Domini Comitis, tam
totius quam singularum partium, de affectionibus
atque ex his promanantibus symptomatibus, ho-
rum causis & inde nisi solers auxilium feratur,
emerguris morbis; quæ similiter de remediis cau-
sam doloris & capitis & brachii sinistri diuturni at-
que rebellis, non modò aperta sed & occulta atque bezoartica vi oppu-
gnantibus, doctè & solerter scripserunt; mihiq; à Clariss. Domino N.
partim exhibita, partim exquisita commemoratione enarrata sunt, depræ-
hendi, eâ fide, diligentia & iudicio scripta esse, ut vel noctuas Athenas vel
ligna in sylvam portare velle videri possim, si ista prolixè repetere velim.

Quia autem omnia ad id unde cuique sua natura est, ut ait Hippocra-
tes, nempe ad unam causam universalem, discrasiam videlicet viscerum
& capitis atque hanc foventem latentem & abditam qualitatem, ex
quibus tanquam ex equo Trojano omnes hostes sive symptomata, qui-
bus cum à multis annis sua Celsitudo conflictatur, directâ sunt: & τὸ
ὑπερλόν (quod quamvis crebris curationibus sæpius demulsum sit, neuti-
quam tamen superari potuerit) Bezoarticâ antidoto extirpandum rectè

consulant viri doctissimi, nihil video relictum esse quod scribendi occasionem ostendere possit; nisi generosi Domini Comitis voluntati mos gerendus esset.

Dicam igitur quid mihi videatur, non quod à doctissimorum virorum consiliis studiosè dissentire velim: sed ut satisfaciam postulationi generosi Domini Comitis, proponam ea quæ ex usu valetudinis futura arbitrabor. Ut autem non dubito doctissimos quosque viros, quorum de proposito casu sententia rogabitur, unanimi consensu in curatione ad τὰ ὑπερλόν seu latentem *κακὴ δειὰν* doloris, qui decennium & amplius duravit, unicè respecturos: ita omninò etiam statuo eos mecum ad duo fundamenta oculos conversuros, nempe ad impedimenta curationis removenda, & ad naturam medicamentorum bezoarticorum.

Impedimenta voco cacochymiam ex inæquali viscerum constitutione ortam, quæ partim est frigidus & crudus, isque ob epatis caliditatem adustus humor in toto corpore redundans, partim lentus & viscidus in capite collectus, suo lentore carunculas cerebri obstruens & expurgationi superfluitatum quæ continuò in capite congeruntur, vias præcludens, qui non modo collectionem harum & inde dolorem exuscitat: Verum etiam causa est perpetuæ defluxionis ad partes subjectas & doloris in illis: veluti mutua vicissitudo doloris capitis & humeri atque brachii sinistri ostendit. Certum enim est crassa & lenta pituita per nares excreta, suam dominationem à dolore tam brachii quam capitis esse liberam; quod humor pituitosus per vias consuetas expurgetur: Vicissim ea instar fluvii cuius ostia obstruuntur retenta dolorem capitis denuò exacerbari, nisi vel ad pectus & ventriculum reliqua viscera, vel ad sinistram scapulam atque vicinas partes exoneretur.

Cum verò talis humor multus sit, atque etiam peculiariter in capite & humero tanquam locis remotioribus sedem fixerit; certè ut tutò bezoarticum medicamentum exhiberi possit frequenter & exquisitè prius evacuandus est; & quidem per ea medicamenta quæ conspirationem habent cum istis partibus singularem: non enim quidlibet agit in quodlibet, ut est sententia Aristotelis. Id enim nisi fecerimus, vel serosos saltem humores relictis crassis & viscidis subducemus, vel parum, relictà maximà parte crudorum humorum expurgabimus, causamque præbebimus vel difficili & periculosa, vel infelici minusque efficaci curationi. Nam si magna pars crudorum humorum relinquatur: hi verò beneficio medicamenti bezoartici concoquantur, concocti per sudorem partim expellantur: partim quod crassiores sint, vel propter nimiam copiam uno impetu dissipari non possint,

possint, retineantur, reterti exitum quærant, & hunc non reperientes furere incipiant: de loco ad locum moveantur: Non video quid aliud consequi possit quam morbi acuti cum gravissimis symptomatis conjuncti procuratio: cujus naturam longi morbi diligenti & exquisitâ evacuatione non prius præmissa, in curando induere solent.

Quare in ea sum sententia, majorem securitatem & fidem, absolutè & feliciter perficiendæ curationis, sanitatisque firmioris consequendæ, futuram. Si purgantia medicamenta non modo sæpius bezoarticis præmittantur, atque in ipso etiam usu bezoartici frequenter repetantur; sed etiam talia sint, ut pituitam simul cum humoribus aduſtis ex partibus remotis singulari facultate educere possint: ea tamen solertia præparantibus (tam humorum quam singularum partium, præcipuè verò capitis conditionem respicientibus) complicata, ut absque violentia agant & suaviter atque sine ingenti perturbatione copiosam illam saburram subducant. Id ego facerem præmissis primum pilulis sequentibus.

Recip. *Aloes lotæ*
agarici trocisc.
rhabarb. opt. ʒj

Cum aq. cinamomi f. pill. no. xxv. sumendæ duabus horis ante prandium. His sequentem syrupum evacuandis humoribus crassis atque aduſtis subjicerem.

R. *Rad. Cichor. ʒj*
Fœnic.
Petros. ā. ʒx
pentaphyll.
filipend. ā. ʒv
pæonie ʒvj
Calami aromar. ʒß
galang. major. ʒij
Ireos ʒß
borrag. ʒvj
polypody ʒj
Cort. rad. cappar. ʒij
glycirrhiza ʒvj.
rad. Ononid ʒij
 Sem. *Carthami ʒj*
citri ʒvj
pæon.

floris mont. ā. 3j

anisi

carui

cymini in aceto preparat ā 3ij

melon 3v

endivia

portulace ā 3j

gran. alkekengi no. iiij

sort. myrobal. Ind.

chebul.

citrinor.

In oleo amygd. dul. friz. ā. 3ij

herb. origani

calamintha

primula veris

salvia

beton.

agrimon.

meliss.

chamadr.

chamapych.

adianti hi nigri

borrag.

cichor.

endivia ā. M. j.

Incid. & contund.

omnia & in vase.

satis capaci coq.

pro ʒ ij s. fortiter expressis, in quibus, iterum parum bulliant : flor. an-
thos, thilia, lil. convall. melissa, stœchad. Arab. borrag. buglossa ā. pi.
epithym. Cret. p. ii. fol. sennæ s. f. 3ij. Postquam satis bullierunt, stent
in infusione horis 3. post col. sine expressione pro 3xvj. In quibus ite-
rum coq. turbith albiss. 3j s. helleb. nig. styr. 3ij. zinzib. 3j caryophyll. 3j s
con. citri 3ij. In expresso fortiter facto infunde per noctem agar. tro-
cis. 3vj. rhabarb. opt. 3j s. Manè ut decet expressis adde syr. de stœ-
chade, de betonica ā. 3ij mell. anthosati 3j. Sacchari 3viii f. syr. coctus
ad justam spissitudinem. Cui tandem affundatur aq. cinamomi 3j.

De hoc syrupo exhiberem cotidie manè circiter horam quintam aut paulò post 3ij ut ad horam decimam jejunaret : atque ad medietatem epoto interponerem diem quietis , quo tunderem venam mediam dextri brachii : sequenti mane syrupi usum reiterarem donec omnis absumeretur : atque die uno vicissim interposito , sequenti mane circa horam quartam pro electiva evacuatione exhiberem 3j pilular. Alexandri de nitro, quæ in Lipsiensi, Genensi atque etiam in nostra officina prostant : quarum tanta est efficacia in capitis affectionibus & defluxionibus, occultam malitiam participantibus ut non facile sit par remedium invenire.

Post pilulas exhiberem pro exiccandis reliquiis & exuscitando calore nativo tam in capite, quam in visceribus 3j Mithridatici cum conserva borraginis & cichorij a. 3ij. Idque facerem ante horam quartam matutinam. Hujusque usum quam frequentissimè possem propter singularem cerebri & partium nutritioni inservientium corroborandi facultatem. Tribus vero horis à prandio ad educationem earum superfluitatum, quæ post usum medicamentorum purgatoriorum in intestinis relinqui, & usum decocti Bezoartici primo quatruiduo impedire solent; exhiberem tale Enema.

Recip. rad. polypod.

sem. caribam. a. 3vj

rad. pentaphyll.

peron. a. 3ij

alibea 3vj

calami aromati. 3ij.

sem. lini

fenugrati a. 3ß

anisi.

carui.

cymini a. 3ij

herb. betonica

origani

calamintha a. M. j.

malva

alibea a. M. j.

Flor. chamomel.

meliloti

anethi a. M. B.

Coq. pro 15 j. In colat.

dissol. elect. de hier. f. 3vj

A 3

lenitis

*lenitivi ℥iij.**diaphœnic. ℥ij**Ol. chamomel ℥ij**anethini ℥j**mell. ros. colat. ℥j**Vitell. ovi no. j.**Mis.**f. Enema.*

Corpore sic satis purgato ad Bezoartici usum pergerem, sin minus pilularum, clysteris atque mithridatici usum repeterem. Atque hæc de impedimentorum remotione dicta funto. Alterum fundamentum erat medicamentorum Bezoarticorum, quorum vis & natura in duobus consistit, nempe in singulari proprietate, qua naturæ humanæ amica, malignitati verò adversa sunt: & apertâ qua humorum frigiditatem contemperant, crassitiem incidunt & attenuant, lentorem verò detergunt. Etsi autem lignum Sassafras odoris suavitate omnes virtutes cordis, epatis & cerebri mirificè recreet, capitis affectionibus peculiariter appropriatum & Bezoarticum sit: non tamen video, quomodo propter tenuitatem suæ substantiæ pari felicitate crassitiem humorum incidere & lentorem detergere possit, atque lignum Guaiacum. Consuluerim igitur propter præsentis affectionis diuturnitatem & materiæ, quæ dum dolorem exacerbat calidissimis etiam fomentis (ut D. D. N. retulit) demulceri non potuit, rebellionem, ut inter bezoartica collocentur ea remedia, quæ una cum abdita proprietate, materiam crassam & lentam potentius incidere, resolvere & detergere possint: Quale est lignum Guaiacum cum cortice, quod non solum naturæ amicum est, sed & omnes scopos quæ lignum Sassafras, (cui propter novitatem nonnulli hoc tempore medici nimis intemperanter addicti videntur) perfectius absolvit. Collocarem autem pro basi lignum Guaiacum & Cortices, pro devehente verò & appropriatis ad caput, reliqua hoc modo.

*Rec. Ligni Guaiaci ℥viij cort. huius ℥j**passular. ℥j Lig. aloes pulv. ℥ij*

Infund. in lb. aq. xv. ferventis. in olla vitrea & ponantur super cineres calidos per hor. 24. Postea benè clausa coquantur. Antequam verò ad medietatem coctio facta est, injiciatur,

*Ligni Sassafras ℥j sem. anisi ℥iij**cinam. elect. ℥iij fantal. citr. ℥j*

Coq.

Coq. probè tecta sine favillis & fumo donec ad medietatem pervenerint : postmodum per se refrigerata , colatura cautè defundatur.

Hujus exhibeantur ℥vj

A sudore semper exhibeantur v. rotulæ exsequentibus confectæ :

R. Spec. Diambra

Diarnosch. dul.

Plires Archont. .i. 3℔

Aromat. ros. ℥ij

Diarrhod. Abbat. 3℔s

Extr. Pæon. ℥j

Sachari alb. ℥iijs solug. in aq. rosar.

& cichor. F. Confectio in rotulis.

Fecibus prædicti decocti affunde Aquæ communis lib. xx. Coq. ad tertias, sub finem coctionis addendo cinamomi ℥ij. Refrigerata per se colentur, & f. potus communis. Quo deficiente :

Recip. Ligni guaiaci probè limati ℥iiij

lig. aloës 3j. passular. 3vj

Coq. in lib. xx. aquæ ad tertias, sub finem, ut per quadrantem horæ unâ coquantur, addendo :

Lig. Sassafras 3vj

fem. anisi 3ij. cinam. el. 3j

Ubi sua sponte refrixerint colentur. Etsi autem generosissimo Domino Comiti difficile fortè videbitur ab usu cerevisiæ & vini abstinere , ubi tamen ipsius Generositas de diuturnitate mali, quod secundum medicamenta paulò angustiorē victus rationem requirit, moneatur ; non dubito ea in parte facile obsecuturam. Stante usu decoctionis, octavo quoque die cum cassia & Conf. Hamech vel pilulis de Chamepithide purgarem & in tertium quemque diem usum mithridatici ad ℥ij immediatè ante usum decocti pro singulari capitis confirmatione & malignitatis extirpatione repeterem. Continuarem verò decoctionem ad quatuor septimanas.

Victum præciperem eum, qui humoribus peccantibus & morbo oppugnando esset idoneus, ita quantitatem commoderando, ne vel nimis tenuis esset, vel negligentia calamitatem accersere posset.

Hujusmodi Curationi tantum fido, ut prolixiorē dissertationem frustra institui existimem. Nam hæc rectè absoluta, omnia symptomata sub quibus & sanguinis sputum comprehendendo, sponte cessabunt. Idem statuo de cæteris medicamentis localibus atque adeò de thermis, quarum usus non videtur fore infructuosus, abdito hoste superato.

CONSI-

CONSILIUM II. IN CEPHALAEA, CATHARRO, CACHEXIA ET SPUTO SANGUINIS.



Magna Fide summaque diligentia corporis habitum ac valetudinem Nobilissimi Domini scriptis expressam obtulit, & de ea sedulo mecum contulit vir Clariss. D. N. N. Ex omnibus autem, quæ conscripsit, & coram retulit, satis apparet: Nobiliss. Dominum morbis vehementibus, iisque diuturnis affligi. Ab iis quod hætenus liberari non potuerit, in causa est, materiæ contumacia, & occulta quædam malignitas, quæ digestivis & evacuativis vix cessura est, nisi verum ejus bezoar adhibitum fuerit. Pervestiganda itaque est talis medendi ratio, quæ blande & sine ulla offensione curet, malignitatem ex proprietate corrigat, ac viscera ad æqualitatem reducat.

Cum verò ante decem annos laboraverit, ut doctè N. N. conjicit, feбри ardenti, ex qua integræ sanitati non omninò restitutus, in capitis ingentem dolorem, versus syncipitis partem inciderit, non mirum est, si ex eo tempore, magnam eorum quæ proposita sunt, symptomatum patiantur permissionem, cum ex eodem fonte omnia derivari videantur. Etsi enim quæ describuntur symptomata & indicia sint malè affecti capitis & cerebri, non tamen inferiorum partium solo consensu, sed & proprio affectu cerebrum laborare indicat doloris perseverantia, morbi que totius diuturnitas.

Verisimile igitur est, caput ex inferiorum membrorum discrasia, & succorum pravitate, aliquid proprii vitii ob longum temporis spacium in se attraxisse.

Adsunt præterea aliqua signa malè constituti jecoris, quod primum ex crudis humoribus, obstructione cacochymica debilitatum fuit, donec in totam ejus essentiam expravorum humorum illuvie corruptio invaserit.

Ob quas causas mali fontem in jecore olim fuisse dicendum est, ex quo vitiosus humor in caput, thoracem, renes & alias vicinas sedes redundavit, ità ut nunc non solum caput, sed etiam totum corpus malè affectum sit. In priori autem cerebri ventriculo, ex pituitoso succo inhærere obstructions, propter quas viæ eventationis cerebri, circa ejus carunculas occludantur, vel inde patet, quod gravitatem in capite sentiat, propter materiam in panniculos infusam, quæ in naribus mucosæ pituitæ intercipit

intercipit transitum. Hinc crudi viscosi & glutinosi in capite catharri, qui si ad scapulas & brachia defullent, dolorem in musculosis, & carnosis partibus excitant, si ad thoracem & præcordia, pectoris dilatationem intercipiunt, orificia venarum aperiunt, ut cruentum sanguinem sæpè expuat.

Primariam verò harum ægritudinum causam fuisse, rectè vir ille conijcit, ventriculi & totius dispositionem calidam & humidam, quod crudæ multiplicatæ fuerint superfluitates, ex quibus fumosæ eructationes, & per ambitum venarum evaporationes cerebrum adeò molestarunt, ut in priori ejus ventriculo sedem fixerint, cephalæam gravem & antiquam causerint, ex qua communis sensus diminutus est, ut ad soporem dispositus videatur.

Renum passio iisdem ex causis oritur, siquidem renes epari, epar cerebro, & ita cerebrum renibus alligatur. Humor autem peccans est materia crassa, viscosa, tenax, quod si subtilis & aquosa, vel biliosa, fervens & levis, verenda forent, pleuresis, pulmonum corrosio, melancholia hypochondriaca, tremor & paralyfis.

Hæc sunt quæ impendere video, ita tamen ut partim præcaveri, partim jam genita, curationem aliquam tempore sint admissura, si ea fuerit lenis & blanda, quæ tanquam per antidota sensim symptomata evellet, observatâ debitâ victus ratione.

Et quoniam cruentum ejicit sputum, quod nondum ex rupta aut erosa, sed ex aliqua aperta vena forsitan propter abundantiam sanguinis fiat, abstinendum erit à vehementer aperientibus & abstergentibus, ab hiera, aloë & agarico, quod venas corradere oraque patefacere soleant.

Observandum etiam erit, an tussis cum lenta febris dominum fatiget, an difficilior sit respiratio, an malignitatis aliquid in thorace sit collectum: cum id genus mali medicos non rarò soleat decipere.

Præmissis itaque digestivis & Evacuativis, ad id genus morbi accommodis, vena media dextra secanda. Procuranda est jecoris, ventriculi, cerebri, renum & thoracis proba concoctio, tunc adhibenda cura ligni aromatici Sassafras, quæ licet sudorem provocet, gratior tamen in eo esse solet, quod jucundum spiret odorem, suavem habet saporem, & quod aliquo modo liberis & primarijs viris liberiores licentiam promittat.

Thermarum usum hoc tempore multis de causis dissuadeo, ante ejusmodi sudorificam curam. Ea autem absoluta, tum thermæ profuturæ erunt, si pravi humores consumpti & nobiliora viscera ad æqualitatem prius redacta fuerint.

Revulsionem & localium ac exteriorum medicamentorum administratio, quam tu latius inquiris, iusto ac debito tempore adhibita, suas quoque facultates præstat, quibus vix indigebimus, si nobilissimus nostris præscriptis obsequi voluerit.

R. Herb. Paralyf.

Eupator.

betonic.

ceterach.

Cuscuta

asari

endivia ā. M ij

Rad. Polypod. querc. ℥i

Ireos

fœnic.

liquirit. ā. ℥ss

Sem. Carthami conguass. ℥ss

anisi

fœniculi ā. ℥j

flor. anthos

majoran.

stæchad. Arab.

rosar. rub. ā. P. ij.

Galanga

Nuc. mosch. ā. ℥j

F. decoct. in lb iij aq. cor.

ad consumpt. tert. Col.

Incolat. inf. fol. senna Alex.

absque stipitib. ℥j

agar. el. ℥ss

zinzib. alb ℥ij

Cinamon. el. ℥ij

Bulliant rursus una atque altera ebullitione, deinde fiat fortis expressio.

Recip. Colatura ℥iij.

Syr. de Stæchad.

Beton.

Cichor. ā. ℥ss

Mis. f. haustus pro una vice.

Reiteretur sepsies.

Recip. Colatura dicta ℥ij

Syr. ros. sol. ℥js

Confect. Hamech. ℥ij

Extract. Rhabarb. ℥j.

Mis. f. haustum.

R. Mass. pill. Aurearum

Cochiarum

Agar. rec. trocis. ā. ℥j

Diagryd. gr. iij

Cum Syr. Violar. f. Pill. no. xvij.

R. Cinamomi elect.

Rosar. rub.

Santali citrini ā. ℥ij

Margarit. præp.

Corall. rub. præp. ā. ℥j.

Cornu cervi ℥ß

Spes. Diambre

Diamusch. dul. ā. ℥j

Sacchari albiß. in aq. ros. dissol. q. s.

F. Conf. in rotulis.

R. Sassafras minutim concis. ℥ij.

Sarsa parigl. ℥j

Lig. aloës crasse pulveris. ℥ij

Aq. fontane ℔ x.

Aqua calc fiat ut serveat, & super fundatur aliis in olla vitreata magna positis, & per 24. horas tecta macerentur, dein bulliant ad consumpt. 4. librarum, deinde ab igne remota servantur bene tecta dum refrigerentur, denique colentur. Dosis ℥v.

R. Semel decoct. Inf. aq. font. ℔ xj

Bulliant ad consumpt. ℔ ij

Serventur bene tecta, dum refrigerentur, tum colentur.

S. Potus pro siti.



CONSILIUM III.

IN ERYSIPELATE FACIEI ORTO
à CALIDITATE IECORIS ATQUE CEREBRI,
ET OBSTRUCTIONE LIENIS CUM
INFLATIONE UTERI.

Quod uxor tua, vir Clarissime, toties Erysipelate faciei corripitur, in causa est, calidissimum ipsius epas, & lien obstructum pariter ac induratum accedit cerebri quoque caliditas. Et cum hepar ac lien humores colligant in æquales, ex commistione horum non solum Erysipelas in facie, sed & rimæ in labijs prodeunt, præsertim si adjungantur ichores falsi & acres.

Cum etiam splen sit obstructum, non mirum si intumescat, doloresque in sinistro latere sub costis squarijs proferat. Propter istas enim obstructions lien probè officio suo fungi, sanguinemque crassum ac melancholicum segregare nequit, qui cum reliquo sanguine mistus, propter crassitatem cum menstruis exire non valet, hic in venis uteri retentus, uterum non solum refrigerat sed & adeò inflat, ut ægra se gravidam esse aliquoties frustra existimaverit. Talia itaque ipsi propinare volui medicamenta, quibus divino favente numine ab insultu prædictorum affectuum liberabitur.

Primò omnium summo mane deglutiat pilulas A. jejusetque per horas tres eoque ipso die super nodulum C. fundat uncias octodecim cerevisiæ, & usque ad mediæ partis consumptionem coquat, & exprimat, expressum ac colatum refrigerari sinat, refrigeratum in ollam novam cum facculo B. mittat, tantumque cerevisiæ addat, ut sex digitos supernatet, tandem in cellam colloset, & triduo continuo de expresso, in principio videlicet cujuslibet prandij cyathum plenum capiat.

Quarto die ab usu noduli abstinendum, venaque mediæ brachij sinistri tundenda sanguisque ad uncias sex mittendus. Postero statim die repetendus est usus prædicti noduli, cumque eodem pergentum, usque nihil amplius reliquum fuerit, ad purificationem etenim sanguinis & lienis evacuationem quam maximè conducer.

Post usum noduli pilulas D. ægra nostra devorabit, reliquis vero diebus singulis tempore matutino quinque rotularum confectionis litera G. notatarum comedet, & ante horam decimam prandium non capiet, moxque linimento F. regionem epatis sub costis nothis lateris dextri, simili-

ter quoque linimento E. tepefacto regionem splenis inungere, linteolumque calefactum superponere non grave sibi ducet: hasque inunctiones circa horam tertiam pomeridianam sedulo repetet, usumque oleorum & rotularum ad aliquot dies continuabit.

Hoc facto manipulos duos nasturtij aquatici communis in ollulam lacte caprino plenam mittat, coquat, percolet, exprimat, & quaternis diebus de hoc lacte præparato uncias quinque exhaustiat. Interea quoque temporis unguento H. labra rimarum plena inungere potest, quò & ipsa sana reddantur.

Hoc modo uxor tua ad exoptatum pristinae sanitatis statum reducetur, præsertim si fomentum pro matrice, & cætera ad faciei Erysipelas medicamenta non neglexerit, quæ suo præscribentur tempore.

Quod victus attinet rationem, ipsamet cane pejus & angue fugiat omnes calidos cibos & aromatibus conditos, similiter cibos dispeptos, caseum, placentas, carnes & pisces salitos & fumo siccatos, ut & carnes ferinas, cervinas, leporinas &c. præcipuè rancidas. Insuper ab usu sinapi, raphani, allij, ceparum, leguminum & omnium eduliorum caput replentium abstineat, nec minus à potu vini fortioris, ab aëre intensè frigido & calido ab irâ & terrore, quæ omnia tanquam hostes infensissimos summo prosequi illam odio oportebit. Benè vale.

R. mass. pill. de rhabarb. recens diss. ℥ij

de hiera c. agaricc ℥j

diagryd. gr. js.

cum aq. fumarie

f. pill. no. xxij

f. Catapotia A.

Reci. Rad. Scorzone ℥ss

lapat. acuti ℥iij

cickor ij

endivia a. ℥ss

Cort. rad. cappar.

tamaris.

fraxini a. ℥iij.

Sem. Aquilegia

dauci

endivia a ℥ijs

rhabarb. opt. ℥iij

B 3

Spica

Spica Ind. ʒss
 agarici trocisci. ʒiijss
 Fol. senna ʒijss
 Epithymi Cretici ʒj
 Herb. Epat. nobil.
 cichorij
 endivia ā. M. j
 ceterach
 lingua cervina
 spicanti ā. Mss
 fumaria
 adianthi nig. ā. P. j
 flor. Sambuci M. j
 Incisa & contusa ligentur in sacculo
 facto ex panuo lineo albo duplici.
 S. Sacculus B.
 R. Rad. ellebori nigri Styriaci
 preparati ʒiij
 Caryophyllor ʒij
 pulverisata ligentur in nodulo.
 S. Nodulus C.
 Recip. Maß. pill. coctiar.
 aurear. ā. ʒj
 aggregat. ʒss
 ammoniaci in aceto scyllitico dissoluti ʒss
 cum aq. flor. sambuci f. pill. no. xxj
 S. Pila D.
 Recip. Ol. chamomel.
 pingued. Taxi ā ʒiij
 de capparib. ʒvj
 laurini
 rutacei ā. ʒij
 Mis. s. Linimentum E.
 Recip. Unguent. rosar. Mes. ʒss
 Ol. rosar. ʒiij
 de absynth. ʒij
 Mis. s. Linimentum F.

R. *Spetier. diarhod. Abbatiz*

diatrion santal. a. ʒjs

troc. de capparib. ʒß

diamargar. calid. ʒj

Ol. macis gr. iiij

Sachari albiß. soluti in aq. cichor. &

endivia ʒiiij. f. confectio in rosul.

f. Confectio G.

Recip. *Ol. amigdal. dul. ʒvj*

Mastich. ʒiiij

Rosar. ʒijs

Ol. nuc. mosc. per expr. f. ʒj

cera parum.

Mis. f. Unguentum H.

CONSILIVM IV.

IN ATROPHIA, CAPITIS GRAVITATE AC VERTIGINE, ET SICCITATE ORIS PERPETUA.



Uoniam ægrotans iste non solum non pinguescit, sed indies macrescit, insuper jejunos cum perpetua oris ariditate non leves capitis perferunt dolores, nec raro vertigine tentatur, certo certius est, hæc ab incallescencia melsaraicarum venarum, intra ventriculum, epar ac lienem sitarum, promanare. Quando enim prænominatæ venulæ à nimio potu incallescunt, chylus præparatus unâ cum sanguine atrabilario, qui à liene debebat sequestrari & attrahi in iisce retinetur, qui postea instar aceti acescit, & fervere factus crebras exhalationes & fuligines ex sese promit, ac vertiginem cum cæteris affectibus gravissimis producit. Cum etiam in ægroto nostro tumor hypochondrii sinistri infallibile obstructionum lienis signum appareat, nec non epar cum vesicula fellea sit obstructum, quod ex lètero conjiciendum, non mirum si prædicta symptomata omnia accrescant, deterioraque evadant. Maximè itaque necessarium, ut maturè illis occurramus, alias tota massa sanguinea acida & biliosa redderetur, atque lèterus cum atrophia (quippe cum sanguis ad nutritionem corporis sit ineptissimus) ingens caperet incrementum.

Ne forte

Ne fortè igitur hæc eveniant, primò omnium Bolum A. summo mane ægrotus noster devoret, atque ad 4. usque horam jejunet. Postero statim die usum noduli B. aggrediatur. Tertio verò die è vena dextri brachij basilicâ vel mediâ uncias quatuor vel quinque sanguinis mittat, sequentibus verò diebus ad aliquot dies, ut moris est, cum nodulo pergat. Absumto nodulo catapotia C. deglutiat & quibuslibet matutinis morsulum E. comedat, regionemque Lienis cum unguento F. tepide inungat, idque circa horam tertiam vespertinam repetat.

His ità peractis decem diebus continuis Drachmam unam de pulvere D. cum uncijs quatuor Seri caprini summo mane & horis quasi anteluca- nis capiat, cyathumque unum & alterum Seri superbibat, moxque deambulando se tantopere commoveat, ut & sudor minetur eruptionem. Venis hoc modo refrigeratis sitis evanescet, ἐμφράξεις lienis epatisque adaperientur, corpusque legitimâ gaudebit nutritione. Quod si fortè accidat, ut ventriculus Seri ratione gravamina persentisceret quædam, tum verò ægrotus noster à quolibet prandio & coenâ cochlear trageæ G. capiet, nihil bibendo ulterius. Cautus quoque esto in διαίτην cibis vitandis. DEUS medicationi nostræ clementer annuat.

R. *Elect. de Psyllio* ʒij
de succo Rosar. ʒjs
Spec. Elefscop. ʒß
Misc. pro Bolo.
S. Electuarium A.

R. *Rad. Petrosel. Endivia,*
Fœnic. graminis a. ʒiij
Chelidon. major. ʒvj

Cort. Rad. Thamarisc.
Fraxini, Cappar. a. ʒijs

Rad. Cichor. ʒvj

Sem. Scariola, carduibened.

Aquileg. Dauci a. ʒjs

Flor. Cyani M. j

Herb. Carduibened. Cuscuta, Ceterach.

Agrimon. Ling. Cervin. Cichor. a. Mß

Fol. Sennæ ʒij

Epithymi Cret. ʒj

Rhabarb. opt. ʒjs

Spica ʒß

Agar trociscati ʒvj
 Pulverisata ligentur in modulo facto ex
 panno lineo duplici.

S. Nodulus B.

R. Maß. pill. de Rhabarb. recent. dispens.

Aggregat. ā. ʒj

Ammoniacy in aceto scilicet.

dissol. gr. xxij

Dacryd. gr. is

Cum pul. ceterach.

F. Pill. no. xxvij.

S. Pilula C.

R. Spec. Diarhod. Abb. ʒijs

Diatrion Santal. ʒß

Sem. Aquileg. Pulv. ʒjs

Card. ben. ʒij

Scariol. ʒj

Pul. Verm. terrestr. ʒij

Rad. Cichor. ʒß

Reste bovis ʒß

Succini, spodij, de ebore ā. ʒß

Troc. de Capparib. ʒj

Sach. alb. ʒß

Mis. f. Pulvis D.

R. Troc. de Capparib. ʒiij

Spec. Diarhod. Abbat. ʒjs

Cinamomi acutiss. ʒj

Cort. citri condit. ʒvj

Cons. anthos ʒiij

Sach. alb. sol. in aq. Cich. & cuscute q.s.

F. Cons. in morsulis.

S. Morsuli E.

R. Bdellij, ammoniaci ā. ʒij in aceto
 dissol.

Ol. amigdal. dul.

Lilior. alb.

De capparib. ā. q. s. cum pauxillo cere

F. Linimentum F.

C

R. Cori-

R. Coriand. præp. ʒß.

Anisi ʒij

Cinamomi ʒß

Cariophyll. ʒj

Calami aromat. ʒß

Mastic. ʒij

Sachari alb. ʒij ʒij

Misce

F. Tragea Stomachalis G.

CONSILIUM V. IN MELANCHOLIA HYPOCHON- DRIACA ET CATHARRO.



Quid ad recuperandam Illustrissimi Principis ac Domini, Domini N. N. secundam valetudinem, quod maximè faceret, à mea tenuitate proficisci posset, (viri Clarissimi & Consultissimi, Domini & Amici honorandi) ad illud certè subjectissimo studio, summâque voluntate præstandum nihil pateret in me desiderari.

Adhibita hætenus, ut relata testantur à vestris præstantiis sunt ea, quæ maximopere è re esse videntur, & adhuc methodicè καὶ κατὰ λόγον adhibentur. Ad quid ergò meum, quod vel nullum vel infirmum esse facilè gusto iudicium requiratur utique non video. Eadem ut sanè Illustrissimo Principi in eadem dispositione præter naturam, jam ante profuerint, in alia tamen jam non ità prodesse posse, quis est qui non intelligat? Εὐδείξας δεῖξαι τε, cum indies etiam ferè mutantur, absens ego quid certi in medium proferre potero? Veruntamen ne vel Illustrissimi Principis Clementissimæ voluntati videar repugnare, vel consiliis vestris saluberrimis non velle subscribere, paucis quantum per alias occupationes hoc tempore fieri poterit de præsentī statu quid sentiam, exponam.

Præcipuum autem quod Illustrissimum Principem nunc exercet malum, est melancholia consensus ex hypochondriis maximè autem à sinistro, atque illa quidem confirmata.

Fons illius mali quis alius quam frigida ac nativa ventriculi intemperies, & calida sed accidentalis, ratione obstructionis, lienis? κύριον αἴτιον quod

quod nam aliud quam flatus? τὸ περιγόμενον succum esse mixtum, partim frigidum lentum & viscidum, partim calidum, adustum, feculentum, dubium non est.

ἀπὸ τὰ περικαταρκτικά varia cum sint, nec ἐνδείξεις suggerant utiles, omitto.

Διπλοπῆν huius mali methedicam quod attinet, flatus ac symptomata inde enata, reprimentibus, discutientibus, revellentibus &c. coërceri quidem & sedari possunt: possunt etiam σὺν θεῷ causæ præcidi antecedentes successivè, medela τῇ δὴ κερατικῇ pro ratione qualitaturn succi misti, contemperantibus scilicet concoquentibus, incidentibus, attenuantibus, abstergentibus, evacuantibus &c.

Fontem autem penitus exhaurire velle (non dico diminuerè) tantum abest, ut hominis esse alicujus nostri seculi existimem, ut haud sciam an ipse Æsculapius, si viveret, præstare idipsum posset. Rectè igitur facitis viri præstantissimi, curationi τῇ κατ' ἰκτερίαν quod insistitis, dirigendo nempe oculum dextrum ad mali hypochondriaci causas, sinistram verò ad vires & symptomata à vehementia causarum pronata.

Electuarium Horatii Augenii absque Dronico quod attinet, eximium sanè id esse, maximeque utile corporibus robustis non nego: Sed quorum calor languidus deprehenditur, iis offerre non audeo: malignitatem chalybis attendens, quæ ut ut corrigatur, semper tamen in ejusmodi corporibus appetitum prosternendo exerere se solet, ἢ ἐνφορία, an continuendus sit ejus usus, brevi indicabit.

Quod si illius vices suppleat claretum ex ingredientibus Syrupum de scolopendria vel similibus paratum? (Syrupos Illustrissimus Princeps averfatur, nec sine causa, dulcia namque bilem movent, nauseam pariunt & ex usu illorum teste Medicinæ parente ἐξείκεται καὶ μέγας γίνεται ὁ πάλιν) hoc modo:

R. Fol. Ceterach.

Leg. Cervinæ

Endivia hort.

Epaticæ

Absynth.

Cichor.

Casuta ā. M. B

Sem 4. Frig. major. excort. ā. 39

Flor. Borragin.

Bugloss.

C 2

Melissa

Melissa
Capill. Veneris ā. M. j
Rad. Fœnic.
Asparagi
Eringij
Scorzonera ā. ʒß
Enula ʒij
Cassia Lignea
Lacca
Spica Ind.
Macis ā. ʒj

Incisa postmodum incidenda non contusis ponantur in manicam Hippocratis, affundendo ter vel sæpius vini Neccarini oligophori calefacti, primâ vice & in quo Sachari candi albi ʒj dissoluta prius fuerit ʒiij donec vinum colorem acquisiverit pellucidum, non subfuscum & obscurum. Dosis illius vini ʒiij plus minus, pro ratione indicationum, tempore prandii & cœnæ, loco primi haustus per biduum vel triduum.

Et quarto quoque die, donec obstructions viscerum expeditæ atque ater & viscidus succus per intestina propulsus à natura fuerit locum habet Claretum Catharticum ἐν τοῖν ὕπνι ἅ ταν μελαναγέγων καὶ φλεγμαγέγων, quale erat, quod nuperrimè ipsius Celsitudo usa est, mutatis jam mutandis pro ratione Ἀγέστως præsentis.

Morsulos confortantes, discutientes flatus, aperientes viscerum obstructions, divertentes per vesicam à nobis præscriptos planè approbo, modo olei zedoariæ ingredientis exigua sit quantitas.

Quantum ad serum lactis, sentio quoque vobiscum tutum ejus usum hoc tempore non esse: tum quia serum aquosis & nitrosis partibus ventriculum frigidum unâ cum intestinîs offendit & inflat, tum quia alvi fluxum læsâ facultate recentrice & alteratrice concitare potest, non ità facile sistendum.

Extractum Cardui benedicti & Veronicæ frigiditatem seri coërcens & incidendo abstergendoque penetrans licet addatur: ægrè tamen & tardissimè calor illorum extractorum in actum deducitur à calore corporis languente. Decoctum radicis Clinæ utiliter tentari poterit, expeditis viscerum & venarum Mesaræi obstructionibus, apparentibus notis concoctionis, & victoriæ caloris nativi: emendatâ tamen & refracta nonnihil facultate ejus siccandi.

Thermis Carolinis verno tempore ad finem properante locus vix erit: corpus enim nondum præparatum, neque intra menstruum spacium satis præparabitur.

Lentum & frigidum succum, ut ut sanè consumant, atque educant thermæ illæ, & ventriculum calefaciendo confirment: attamen atrum succum, cui veræ atræ bilis aliquid admistum fuerit, illas irritare, atque ejus majorem effervescentiam efficere pro certo haberi debet. Expertus enim sum in non paucis melancholicis, eos paulò post usum illarum thermarum in febrim incidisse ac postremò vitam ipsam cum morte commutasse.

Hæmorrhoides si natura aperiret *ὑποταυμάτῃς*, benè quidem esset, verum, cum veræ atræ bilis non parum latitet in massa sanguinis non suaderem ut arte aperirentur.

Subsequi enim posset, non modò dolor in intestino recto paracutus, sed & fistulosi ulceris generatio.

Tussim quod spectat, licet is, DEO fortunante, penè omnis abierit, præclare tamen faciunt vestræ præstantiæ, quod reliquiis consumendis operam dant, attendentes simul, ne quid in thorace delitescat *ὄψαλον*, neve putrescente materia ulcus succedat aut hestica.

Atque ita mentem meam quâ fieri potuit brevitate viri clarissimi vobis aperui, non dubitans vos in optimam partem, quæ prolata sunt accepturos, meamque opellam, qua par est reverentiâ humillima principi illustrissimo oblaturus esse meo nomine promptissimam, ac quovis tempore paratissimam. Valete.

CONSILIVM VI.

IN MELANCHOLIA HYPOCHONDRIACA OB MOEROREM ANIMI.

Retulit mihi tuus minister aulicus, Vir Nobilissime, ut sese res tecum habeat. Explicite id adeò factum & expedite, ut periti etiam Medici palmam eâ in enumeratione ambiguam fecerit. Colligo autem ex signis competentibus, te Melancholicâ laborare hypochondriaca. Signis autem iis hic ubertim recensendis supersedebo, quod id alibi à me factum. Rectà ergò ad causas morbificas me conferam, ut & ad indagationem symptomatum.

Malum hocce primum apud te extitit à causâ externâ, mœrore quippe animi, qui viduum lectum subsecutus fuit. Ibidem enim ob perseverantem mœstitudinem cor & vitales spiritus plus quam par erat, incaluerunt, & exsiccati sunt. Eo ipso malo & vicinæ partes contabuerunt penitus. Inde splen cum venulis mesaraicis in similem intemperiem, quæ calida est & sicca, deducta fuit. Est ergo morbus hic ex eorum numero, qui in via dicuntur. Clarius loquar; est obstructio venarum mesaraicarum tum dextri, tum sinistri hypochondrii. Iis in venis tum chylus, tum pituita, quæ ex depravata ventriculi coctione ob calorem & siccitatem exteram generata est, moras neſunt. Sic ergo chylo ad epar transitus minimè patescit: sic etiam successu temporis ea ipsa materies reddetur contumacior.

Proinde impoſterum lien humorem melancholicum nequaquam ſufficienti in quantitate attrahet. Adauctum fuit hoc à te malum, dum quædam, quæ contra ſacram Scripturam militant, volens commiſiſti.

Quæ verò illa, inquires dubio procul? Date ſinceram mœrentibus aſcriptura: id eſt, Mœrentibus imperare dimotionem curarum & mœſtitiæ ex animo, & ſtatuire illis modum convenientem, ne in morbos incidant graves & incurabiles.

Vides jam, nobiliſſime Domine, ut temetiſpum hætenus poſſumderis. Vitium enim depravatæ in ventriculo coctionis inde certiffimò extitit. Hæc omnia cum in immenſum excreviſſent penitus, natura per terribiles vomitus hætenus tentavit ejicere. Talibus autem tantisque ſymptomatibus, vertigines, lipothymia, palpitationes cordis, paroxyſmi paralitici & quaſi apoplectici, ſeſe junxerunt comites.

Eo tempore ſuccurri fortasſe potuiſſet per evacuationes, quæ obſtructiones hypochondriorum vel aperirent, vel attenuarent & detergerent: addita fuiſſet poſtmodum quæ viſcera principalia corroborarent. Id cum omiſſum hætenus, primaria ſymptomata radices egerunt profundiffimas. Sunt ea dolor univerſum caput occupans, præſertim in vertice, tinnitus aurium, catharri, dolor orificii ventriculi compreſſivus, murmura ventris & hypochondriorum, tandemque ructus & flatus ventriculi. Licet autem quædam eorum ſymptomatum jam mitigatiora ſint reddita, foves tamen adhuc metum vel apoplexiæ vel paralyſeos. Unicuique hoc ſupereſt flagellum, quod te adhuc flagellat & excruciat unice. Quod etiam dolot colicus, qui jam ante te miris afflictabat modis, jam penitus ſit ſublatus, nequaquam certis caret cauſis. Cruda enim & copioſa pituita, quæ primæ coctionis eſt excrementum, nequaquam ob obſtructio-

structionem venarum mesaraicarum ad colon usque promoveri potuit. Cum verò minera ejusdem doloris colici minimè sit educta penitus, sed in venis adhuc moras agat mesarxis, metuendum, ne ipsius soliti paroxismi reversionem faciant. Hoc ut ne fiat, tali cavebitur ingenio.

Primò omnium minera ea seu materia obstruens per alvum educitor. Dein obstructions referentor. Primaria viscera, ut epar, ventriculus, splen, cerebrum & cor, in naturalem reducuntur temperiem: Venæ demum mesaræ utroque in hypochondrio aperiuntor, humectantor. Si etiam ob calorem cordis excedentem sinistrum exastuarit latus refrigerandum id decenti modo. Urinæ id prodent clarissimè. Si enim ex cruda fuerint, aquosæ & carentes hypostasi, à refrigerantibus abstinendum, Tinctæ si fuerint, crassæ & turbidæ, refrigerantibus utendum.

PRIMUM CURATIONIS CAPUT.

Lenientia, seu materiam obstruentem educentia hæc sunt.

Recip. *Agaric. recent. trochisc.*

Rhabarb. optimi

Spes. Hieræ simpl. ã. ʒj.

Cum aq. Betonitæ f. Pilul. no. xxj.

Sumuntor manè, hora 7. jejunetur ad horam usque decimam.

Illud insuper non involvendum silentio, me bolo quodam hæctenus usum fuisse, quem & hic, pilularum loco non dissuaderem. Cum enim obstructions utriusque (ut existimo) hypochondrij pertinacés sint, bolo illo paulum fortius educente viæ communes expurgabuntur, in iisque contentæ materiæ commovebuntur. Statim autem post usum boli illius hor. 3. cibus exhibendus, ut *ὑγραινός* & concitatus humor depri-
matur, minusque intestinis faceffet torminum. Est autem ejus hæc descriptio:

Recip. *Elect. Lenitivi ʒss.*

Sp. Elect. Eleseceph. ʒij

Ol. Cinnamomi qu. i

Misce cum Sacharo pro bolo.

SECUNDUM CURATIONIS CAPUT.

Obstructio venarum jam aperienda. Cacochymia setiam in habitu venarum cum emendanda, tum subtrahenda. Exstitit ea obstructio ab inæqualibus humoribus, tum calidis & siccis, tum frigidis & humidis, pituitosis, melancholicis, frigidis & siccis. Quapropter medicamini aperiendi miscenda erunt calefacientia refrigerantia & hume-
ctan-

Etantia. Cacochymia autem, quæ pituitosa est & melancholica, partim alterabitur, partim expurgabitur.

R. Rad. Cichorij ℥j

Fœniculi

Felcis mar. ā. ℥vj

Scorzoneræ ℥j

[Cort. rad. Cappar

Tamarisc.

Fraxini ā. ℥iij

Rad. Polypodij quer. ℥j

Pentaphyll. ℥℔

Pœonia

Calami aromat. ā. ℥ij

Medulla seminis carthami ℥j

Passularum ℥j s.

Sem. Citri ℥iij

Pœonia

Seseli Massil. ā. ℥ij

Ocymi

Caryophyll. ā. ℥j

Dauci

Aquileg. ā. ℥ij s.

Pulp. Tamar. Ind. ℥j

Herb. Agrimonia

Ceterach

Spicanthi

Lingua cervina

Carduibened.

Neronica

Chamedrios ā. M. j

Herb. Paralyf.

Chamapithyos ā. M. j

Cichorij

Endivia

Epatica nobilis ā. M. j

Coq. in s. q. aq. Cochlearie, Nasturtij

Aquatici & Betonica pro ℥ xxviij.

In ℥xvj ifferuescant

Fol. Sennæ f. s. ℥iij

Epithymi Cretici ℥i s.

Stent. infus. per h. 3. Deinde colentur sine expressione

pro ℥viij & ferventur: signenturq; PRIMA COLATURA.

Deinde R. alteram partem colaturæ, quæ pendet lib. 1. & in illa coquantur ad medietatem.

Cortic. rad. Elleb. nig. Styr. præp. ℥iij

Turbith. alb. ℥ij

Garyophy. ℥ij

Zinzib. ℥j

Vbi sat cocta fuerint, colentur pro lib. s. quæ addatur prima colatura, & in his colaturis ambabus in nodulo ligata per noctem infundantur.

Agarici trochisc. ℥viij

Rhabarb. opt. ℥j s.

Spice Indic. ℥j

Manè ebulliant parum, & exprimantur fortiter, & adde

Syrupi Bizantini

de Scolopendria ā. ℥ij

Mellis anthosati ℥j

Succi Rutæ ℥viij

Cochleari ℥j

Sachari albiss. lb s.

Coq. ad formam Iulepi aromatizati Cinnamon. gr. X. & S. Purgiersafft.

Quamvis autem hoc medicamentum ingrediantur radices Ellebori nigri & Turbethum eorum tamen activitas adeò emendata, ut naturæ convenient, peccantesque materias suaviter benignè & sine violentia educant. Usus hic erit. Singulis diebus, post usum lenitivi, mane h. vj tres uncias capiat, quibus tamen vel oleum anisi, vel cinamomi, vel caryophyllorum adstillarit, ebibet, servato ad hor. x. jejunio. Post assumptas illas tres uncias licet dormire paululum, non tamen ultra semissem horæ; sudor etiam omninò esto prohibitus. Quinquies cacabit de die ab usu hujus medicaminis. Quod si, nobilissime Domine, per singulos dies usum hujus medicaminis sustinere nequis, quandoque uno abstinebis die. Vel etiam triduum usurpet, quarto subsistat, venamque curet incidi epaticam, ad effluxionem sanguinis ℥v. Arbitror ego, præterea ut id adjiciam, ex diuturnâ moestitia venas ad ventriculum tenden-

tes incaluisse supra modum. Id si ità, earum refrigeratio innuitur. Per phlebotomiam autem optimè eventabuntur (ignoscant mihi manes Ciceronis) & refrigerabuntur.

Quin imò ejusmodi ventilabrum, requirit & ipsum cor, propter vicinitatem & rectitudinem: requirunt id venæ splenicæ sinistri hypochondrij: requirit id totum ferè corpus. Phlebotomia autem ea partienda est. Primo ergo die aperiatur epatica in dextro brachio, emittendo sanguinis uncias tres. Diebus succedentibus ex eadem, sed sinistri brachij, epaticà sanguinis emittuntur uncia duæ vel duæ cum semisse. Hâc ratione non solum caliditati undiquaque succurretur: sed & purgans medicamentum penetrabit facilius, succedetque felicius. Syrupi postmodò, quem supra præscripsi, ulterius continuetur usus. Iste postquam absumptus fuerit, suaserim, ut pro expurgatione mineræ residuæ, bolus supra præscriptus in usum revocetur, sic eum non solum obstructio tollitur, sed & materia quæ ulterius obstructura radicitus extirpabitur. Hâc ratione primæ & secundæ intentioni satisfiet plenariè.

Attendendum autem hoc loci ad lotium. Id ubi clarum fuerit, album, aquosum & tenue, humores in venis melsaraicis contentos, non intensè nimis incaluisse, ostendetur. Aperientia itaque adhibeantur ejusmodi, quæ calida sint attenuantia, incidentia & detergentia. Satisfiet huic indicationi thermis, acidulis, Jure galli decrepiti, secundum descriptionem Avicennæ & Aëtij. Bibas ergò aquam thermalem vel ejus loco jus galli decrepiti, vel acidulas. Aperientia ista duùm sunt generum, calida & refrigerantia. Non autem nullo cum discrimine bibendæ sunt aquæ ex thermarum medicatæ, sed quadrante horæ prius quam bibantur, massæ pilularum sequentium dantur grana x. vel. xiv, Ita enim ijs thermarum aquis major penetrandi vis conciliatur,

R. Rad. Filicis maris

Pentaphylli

Fol. Cardui bened.

Chamaedryos

Ceterach

Veronica ā. ℥ij

Pulveris. subtiliter & ex ipsis f. Extractum. Cujus extracti recipe gr. 12. vel 14. vel ℥j. form. pill. no. v. vel 7. vel 8. sumendæ mediâ horâ ante thermas. Non solum autem manè hæc sumuntur pilulæ ante potum thermarum, sed & post meridiem hor. 3. Neque etiam post meridiem iterandis thermarum potus, sed solæ dantur, sine thermis, ut cum cibus coenæ commisceantur, sicque cibus evadat medicamentosus.

Usus

Usum acidularum dissuadeo penitissimè, quod multis humoribus melancholicis corpus tuum abundet. Quod si urinæ apparerent rubræ, thermæ neutiquam prodesse. Obstructiones enim calefacientibus & refrigerantibus simul aperiendæ essent. Tunc verò demùm pilulæ ex extractis præparatæ dabuntur h. 7. subsequatur serum lactis caprini in quo ℥ij emulsionis sem. melon. ex aqua graminis vel hederæ terrestris factæ, immiscendæ erunt. Dosis lib. iij. Ebibatur calix alter post alterum pitiflando. Jejunium habeatur ad horam usque decimam. Post seri hujus usum, si aëris patitur clementia, deambulandum, ut ita sese id lactis serum profundius in corpus insinuet. Compertum est hoc modo materias, quæ obstructionem faciunt, per urinas & alvum educi. Heic verò medicorum quidam plenis buccis mihi contradicent. Tres seri libras inquierent, cur propinabis vice unâ: ventriculo id non exiguam creabit molestiam? Hæc illi. Euge verò, habento sibi hoc responsi. Si sero lactis per venas penetrandum mesariacas, magna requiritur quantitas. Quibusdam tamen pro ratione tolerantia patientis, in minori quantitate exhiberi poterit. Sed non citra noxam id fit ventriculi? Ita illi. Tu noli credere. Stante usu seri caprini, ut ne noxa inferatur ventriculo, sequens pulvis circa meridiem & vesperam, quando nihil ulterius bibit, dabitur.

R. *Coriandri in aceto vini præp. ℥s*

Sem. Arisi

Fenic.

Siler. mont. ā. ℥j

Glycyrrhizæ rasæ

Cinamomi ā. ℥ij

Calami arom.

Caryophyll. ā. ℥j

Margarit. præp.

Corall. rub. ā. ℥j

Masticis ℥ij

Rad. Imperat. ℥ij

Sachari rosati tabulati

Candi albiss. ā. ℥j

Mis. f. Tragana.

Præsens etiam Medicus, ne noxa inferatur ventriculo sacculos, unguenta, scutaque Stomachalia fieri curabit. Retulit mihi præterea tuus famulus, te impotentia quadam eundi laborare. In ipso enim paroxismo hypochondriaco dum te hinc inde manu duci per famulos curas, motu eo

te non parum leviri persentiscis. Unde autem obsecro hæc motus impotentia: unde & hæc per motum & manuductionem allevatio? Impotentia movendi crura & pedes symptoma est motivæ actionis, quæ fit in nervis. Nervi autem læsâ actione motrice moveri nequaquam possunt. Cum ergò motu & manuductione spiritus animales in cerebro, qui Principium motus sine quo vocantur, nondum alterentur, allevatio hæc nervis nequaquam ascribenda. Quandoquidem ergò motio hæc potentiam locomotivam promovet, verisimile est, quiddam musculis, qui pedes & crura movent, ipsorumque musculorum tendinibus inesse, quòd motivam impediat. Impedimenti ejus materia partim flatus est, partim humor melancholicus, tenuis & flatulentus, qui ejusmodi scorbutica symptomata plerunque causare est solitus. Humor quippe ille & flatus tendines versus centrum eorum contrahit, unde crura difficulter possunt extendi. Materia verò ea in tendinibus & habitu musculorum nidificans, per balnea, per motum, & per medicamenta scorbutica alia discutitur. Motus imprimis in hoc casu masculè flatus discutit, ut & humorem melancholicum ichorosumque. In paralyti venenosa & apoplexia levi motus & manuductio nocent permultum. Vaporum quippè minera, quæ motu commovetur, si ex hypochondriis sursum feratur, nervos magis magisque opplet.

In tali ergò paroxysmo malum motu intensius redditur in scorbuticis symptomatis mitius. Proderit ergò, si & tu ipse sero caprino nasturtium vel cochleariam incoquas, bis de die bibas, & si natura facilè toleret, sudoribus te accommodes. Vinum chalybeatum & decoctum Saffras & ipsa hic adhiberi possent. Quia verò malum hoc quasi scorbuticum thermis, sero caprino & nasturtio expelli & possit & debeat, silentium de iis esto silentissimum.

TERTIUM CURATIONIS CAPUT.

Corroborandæ jam partes principales: sunt ex ventriculus, epar, lien, cor & caput. Hæc intentio alterantibus & obstructionem aperientibus inclusa est. Inprimis verò thermæ non solum obstructionem aperiant potenter, sed & haud segniter viscera calefaciunt, humiditates superfluas absumunt, partesque principes corroborant. Sed cum cautione hæc dicta sunt. Præstant id thermæ partibus omnibus generaliter: in specie verò & cuilibet parti sua specifica medicamenta haud quaquam in simul deneganda.

QUAR-

QUARTUM CURATIONIS CAPUT.

Viscera singula jam singulatim obfirmanda. Pro ventriculo hoc faciet:

Recip. *Cinamomi elect.* ℥ij
Galanga ℥ij
Garyophyll.
Corall. rub. ā. ℥j
Rosar. rub.
Cortic. Citri ā. ℥ij. ℥.
Cardamom.
Nuc. Moscat. ā. ℥ss
Santal. omn. ā. ℥j
Pell. Stom. ch. gallin ℥ij.
Conserv. Cochlearia ℥ij. ℥.
Rosar. ℥ij
Diacyton. sine spet. c. sach. ℥ij
Sachari solut. in vino Malv. ℥vj
F. Electuar. S. Magenstercung.

Electuarii hujus particula, in quantitate nucis castaneæ sumenda quater per septimanam, bis hor. 7. matutinâ, bis itidem hor. 3. pomerid.

Pro roborando Epate & Liene.

R. *Conserv. Capill. Ven.*
Flor. Cichorii ā. ℥j. ℥.
Ceterach.
Troc. de Eupatorio.
Capparib. ā. ℥j. ℥.
Sp. Diarhod. Abbat. ℥ij
Cum Syrup. de Byzantiis F. Electuar.
aroma isat. C. Ol. Canella gui. ij
S. Stercung jui Milch und Leber.

Electuarii istius capiendæ particulae decem per septimanam pro diebus quinque, quantitate castaneæ nucis hor. 7. mat. & 3. pomerid. Utriusque hujus electuarii usus continuandus per septimanas plusculas.

Possent & parari rotulae ex speciebus capitalibus: ut & morsuli ex seminibus cum oleo carui. Cum verò id generis remedia demum post evacuationes, cacochymiam sublatam, postque intemperiem partium emendatam, locum habere possint: eò loci & ego ea rejecta volo. Postquam enim cognovero, quomodo res successerit, expeditius rotulas &

morsulos ordinare potero. Unum diligenter te volo monitum, Nobilissime domine, quod te certò facere, tuâ permultum interest.

In promptu habeas medicinas prophylacticas pro recidivo (quod DEUS prohibeat) paroxysmo hypochondriaco.

Recip. Spec. Diambre

Rosat. novell. ā. ʒj

Margarit. preparat. ʒj

C. C. usti præp. ʒij. s.

Ambra gryseæ gr. iij

Ol. Carui gut. iij

Sach. solut. in aq. Carduihened. ʒiij

F. Confect. in rotulis. S.

Rüchlein zur Preservation des
Paroxysmi hypochond.

Rotularum istarum aliquot semper habebis in strophio. Quando-
cunque igitur persentiscis, instare jam iterum paroxysmum hypochon-
dricum, unam vel duas in osingere, ut ibidem pedetentim dissolvantur.
Quod si paroxysmus ille hypochondricus non soli capiti, molestias pa-
riat, sed & cor invadat, ibidemque palpitationem concitet. Tunc verò
protinus sequentes parentur rotulæ.

Recip. Ol. Nuc. Moscat. per express. s. ʒij
destillat. ʒ s.

Extract. Pæon. ʒj

Calami aromat. gr. XI.

Margarit. præp. ʒj

Corall. rub. gr. VIII.

Ol. Macis gut iij

Sachari soluti in aq. flor. Pæon. & Cicher. ʒvj

F. Confect. in rotulis.

S. Rüchlein zu der Ohnmacht.

Dosis rotula una. Evidentissimus certè est earum effectus in paroxysmo
hypochondrico, cui cordis palpitatione conjuncta fuerit. Haud inferioris
virtutis cognovi sæpius, eas quæ sequuntur, rotulas.

R. Extract. Aromat. rosat. ʒ s. gr. ʒ

Ligni aloës

Zedoarie ā. gr. ʒ

Galanga gr. iij

Margarit. præp. ʒ s.

Quando-

Quandoque pro ratione urgentis intentionis addere soleo

Ol. Cinnam. gut. iiij

vel Carui gut. iiij

vel Macis gut. ij

Sach. alb. ℥iij ℥. solut. in aq. Carduibened.

F. Confect. in rotulis.

Modus utendi idem, qui priorum rotularum. Ejusdem efficaciam in paroxysmo hypochondrico cum iisdem symptomatis, est succus is, qui sequitur.

Recip. Extract. Carduibened. ℥j

Calami aromat.

Scabios.

Melisse ā. gr. iiij

Sach. albiß. ℥ij. dissolut. in aq.

Meliss. F. Sycopus, cui adde

Syrup. acetositis Citri ℥ss

M. S. Gass.

Qui vult, quandoque momentum admiscebit olei cinamomi.

Gloriantur plerique Itatorum in suis lectionibus hunc in modum: Domini mei, hoc notate bene, hoc meum est inventum. Possum ego cum DEO & rei veritate gloriari, hunc, quem annotavi, succum, esse meum inventum, meque infinitos verè hypochondricos eodem sublevasse. Quæ tamen à me modo dicta, sine invidia & præjudicio à me dicta, & sine invidia & præjudicio ab omnibus nationibus accepta & recepta esse velim.

Ejusdem ~~ingrediam~~ est pulvis, qui sequitur.

Recip. Margarit. præp. ℥j

Corall. rub. præp.

C. C. usti ā. ℥ss.

Lapid. Bezoartic. gr. iij

Mis. detur pro una vice in paroxysmo.

Exhibetur in aqua card. bened. addendo nonnihil aquæ cinamomi.

Hisce ità durante paroxysmo peractis, ad ea quæ finem paroxysmi subsequuntur, progrediar. Tunc verò particulam sequentium morsulorum exhiberi impero.

Recip. Margarit. præp. ℥j

Corall. rub.

Garyophyll. ā. ℥ij

Cubebæ,

Macis

Macis ā. ℥j

Ol. Nuc. mosc. destill. gut. X.

Express. ℥j.

Extract. *Pæon.* ℥j

Calami aromat. gr. XV.

Conserv. flor. Pæon. ℥j

Cichor. ℥j

Sach. solut. in aq. Cichor. F. Confect. in morsulis. S. Morsellen.

Ut etiam cor ad extra muniri queat contra vapores tenebricosos & piceatos, qui in paroxysmo id invadunt, volo jubeo, ut iidem hi antecedentes Morsuli aq. borrag. meliss. & violar. & cinam. paulatim irrorentur, iidemque intra utramque manum compressam detenti & concalefacti, cordis regioni applicentur. Alia externa medicamina, ut sunt unguenta pro epate, splene & renibus; item odora externa &c. nolui præscribere, quod ea magno cumulo à præsentibus medicis fuerint adhibita.

Jam verò & remotio causarum externarum molienda. Dependet ea ex sex rebus non naturalibus. Aere nimirum, cibo & potu &c.

Cum verò à præsentibus Medicis sufficienter de his actum sciam, lubens ijs denuò recensendis supersedebo. Unicum tamen addam colophonis loco.

Mœror animi diuturnus primaria & principalis causa est hujus affectus. Non solum enim longum is duravit tempus, sed etiam habitu quasi perpetuo conservatus fuit.

Si ergò Nobilissime domine, in integrum cupis restitui, certò credas, hostem eum vitæ tuæ struere insidias.

Experimentis ego edoctus sum quamplurimis, non paucos stante viduitate lecti, & perseverante tristitiâ & mæstitia, vitam vixisse calamitosam & miserrimam.

Sed & hoc addo: multos eorum post crebras meas admonitiones ad secundas transisse nuptias, postmodumque incolumes prolixâ sobole familiam adauxisse suam.

Id ipsum & tibi, vir nobilissime, animitus comprecor.



CONSILIVM VII.

IN MELANCHOLIA HYPOCHONDRIACA.

Melancholia, quam nonnulli à flatibus Hypochondria tendentib., Hypochondriacam: Arabes, & inter hos præcipue Avicenna Mirachialem: quod in venis, quibus mesenterium, quod ipsi suâ linguâ Mirach appellant, substratum est, situm habeat: plurimi præcordiorum ob angustias & anxietates circa orificium ventriculi (quam sedem veteres, teste Galeno, communi consuetudine præcordia appellare soliti sunt: Melancholiam nominaverunt.

Proprie non humorem melancholicum (licet ab eo tanquam causâ remotâ originem ducat) sed errorem mentis cum metu & tristitiâ significat.

Et est actio Imaginatricis depravata à vapore aut adusto, aut melancholico, flatulento, impetuosè ex venis hypochondriorum vel dextræ vel sinistræ partis, aut utriusque simul obstructis, & proinde à calore quasi inflammatorio, in illis effervescente, elevato in partem cerebri anteriorem, plerunque per superius os ventriculi, tanquam per medium (nonnunquam sine eo) impulso, spiritusque animales suis tenebris obfusante, & metum atque tristitiam excitante.

Hujus duæ sunt differentix: una notha, levior: altera perfecta, eaque gravior. Utraque tamen actioni Imaginatricis infesta, & eam ad depravatè agendum impellens.

Illa levior seu notha, suam mineram in venis dextris ab epate, super mesenterio, in ventriculum distributis & per eum dispersis, ex crudo chylo attractam, caliditate & siccitate jecoris, & venarum dextri hypochondrij quasi inflammatoriâ, sive nativâ sive affcitiâ sive utraque, retentam, sitam habet: atque inde deinceps ebulliendo vapores fervidos, adustos & simul flatulentos, rarò tamen mediante orificio ventriculi superiore, sursùm ad cerebrum elevat, & spiritui animali permiscet, atque mentis perturbationis causa est. Hæc, seu perfecta, eaque gravior consistit in obstructione earum venarum, quæ à splene ad ventriculum remeant, & venæ mesaraicæ, quòd mesenterio eâ etiam in parte instratæ sint, appellantur. Obstruuntur verò ab humore feculento & melancholico, ob retentionem partim diuturniorem, partim etiam splenis calore,

lorem , calefacto , & quasi inflammato. Tantiò autem est gravior , quanto humor propius ad naturam melancholiæ vel atræ bilis accedit. Vapores enim obscuriores , attriores , acriores & magis partes nervosas vellicantes expirat , qui ut nunquam ad cerebrum feruntur , nisi mediante orificio ventriculi : ita etiam symptomata tetriora , gravioraque excitant.

Sunt & aliæ duæ differentiæ (quas obiter recensere libet) quarum una ex qualitate innominatæ alicujus luis : alteræ ex atoniâ seu labefactatâ Attractrice & Expultrice splenis proficiscitur , & scorbuticarum affectionum , puta splenum magnorum , volvuli hæmatitis , sceletyrbes , Stomacaces , & icteri nigri mater est , & contagione propagatur , victuque melancholico fovetur , & in Esse conconservatur. Quæ utræque , ut symptomatis hypochondriacis plerunque ægrotantibus molestæ sunt : ita ut plurimum cum illis confunduntur , & à Medicis , in arte non diù multumque exercitatis , difficulter distingui possunt.

Sed cum utrorumque diversæ sint essentia , certæque causæ & symptomata appropriata & distinctiva , facile à peritis medicis in suos ordines rediguntur , & ab Hypochondriacâ , exquisitè discernuntur.

Galenus 3. de locis affectis , cap. 7. ex autoritate Dioclis , unam tantum speciem Hypochondriacæ melancholiæ commemorat , eamque pyloro , quod quasi inflammari putabat , attribuebat : quam sententiam veteres plerique retinuerunt. Sed Moderniores , rem exquisitiùs & majori diligentia ad rei naturam rimantes , deprehenderunt , duas Hypochondriacæ species esse , ratione causæ materialis seu mineræ vaporum , diversis subjectis inhærentes : unam in venis dextræ partis , perinde ut paulò ante commemoratum est , ab Epatis caliditate excedente , ita calefactis , ut calefaciendo chylum perpetuo fervore & ardore molestiam quasi caliditatis alicujus internæ , in eo loco exhibeant : alteram in sinistra parte in venis mesaraicis vocatis , inter ventriculum & splenem collocatis.

Subjectum hujus Melancholiæ proximum est anterior pars cerebri , & secundum ventriculos & poros ejus omnes : remotum verò sunt venæ in hypochondrijs tam dextræ , quam sinistræ , in quibus nidum habet materia , à quâ vapor flatulentus sursum ad partem cerebri anteriorem exhalat.

Producitur autem hoc malum , atque in perpetuo suo Esse fovetur à duab. potissimum causis. Quarum prima formalis seu proximæ vicem gerit , & est ipsa essentia morbi , videlicet vapor , aut fervidus , biliosus & adustus : aut melancholicus : utrobique tamen flatulentus & spiritus animales perturbans , & Imaginatricem frustrans. Altera remota est , & est minera dictorum vaporum , cerebrum afficientium. Estque nihil aliud , quam

quàm humor aut calidus, fervens, biliosus & adustus: aut melancholicus, nonnunquam multa copiâ pituitæ tenuis, acidæ, ponticæ & crudæ permixtus, contentus in venis vel dextræ, vel sinistræ partis, aut utriusque simul. Venæ dextræ partis sunt eæ, quæ ab Epate super mesenterio in ventriculum feruntur atque per ejus substantiam disperguntur.

Sinistræ partis venæ, quæ mesaraicæ appellantur, inter splenem & ventriculum sitæ sunt, & spleni sanguinem melancholicum adducunt, ex eoque excrementum melancholicum in ventriculum, ad eum constringendum, famem exuscitandam & deinceps expellendas quasi exprimendo superfluitates ejus devehunt. Hæc in utrisque venis collecta & obstructione contenta minera, gignitur ex vitio & primæ, & secundæ coctionis.

Primæ coctionis ob labefactionem chylicationis, quæ à perfrigeratione ventriculi originem ducit: & est vel nativa, vel affcetitia. Nativa ea est, quâ ventriculi calor in primâ generatione, à caloris gradu & temperie naturali, in frigiditatem secundum latitudinem aliquam recessit, ita ut frigidior sit, quàm secundum naturam esse debebat. Affcetitia, quâ ventriculus de statu naturali post ortum declinavit in frigiditatis declinationem eam, ut officio chylicationis pro eo atque secundum naturam fieri debet, non perfectè fungatur, & imminutè coquat. Atque hæc à duabus causis proficiscitur: internâ videlicet & externâ.

Interna ventriculi caliditatem lædit primùm resolvendo aut dissolvendo; quando videlicet epas & venæ ab ipso ad ventriculum dispersæ, item splen & venæ mesaraicæ suâ quasi inflammatoriâ caliditate & siccitate, ventriculi calorem resolvunt & dissipant, ita ut quemadmodum lumen minus à majore obscuratur, calor ventriculi ab isto calore, qui illi est extraneus, & excedens, dissipatione fiat inferior, & sic suâ naturâ frigidior. Deinde coctionem in ventriculo impediendo.

Nam quotiescunque ventriculus ab ingestis cibis in majorem molem extenditur, à caliditate viscerum & venarum adiacentium quasi ustione læditur & premitur, & tali anxietate afficitur, ut ob igneam caliditatem fugiat & sese contrahat, sicque coctionem nullo modo debite peragere possit. Unde chylum non temperatè coquit, sed ustione corrumpit in calidum & siccum à naturali statu longè discedentem, quem vicinæ venæ & viscera ob nimiam caliditatem, quoad tenuis est, maturius attrahunt, attenuandoque in caput deferunt, & illud replent, doloresque tam in vertice & antrosum: quàm retrorsum, adeoque secundum dextram & sinistram partem exuscitant. Insuper simili imbecillitate, partim in pituitam acidam aut acerbam, partim pro ratione ciborum assumptorum

rum in succum nidorulentum & amarum convertit : tandem quoad ea crassior est, calore igneo in venis torret, & ita lentam reddit, ut illi propter obstructions non pateat descensus ad epar & partes inferiores. Dùm hoc fit, anxietatem magnam ventriculus sustinet : quippe qui à chylo crudo & crasso per longiorem moram diutius retento, perinde ut ab excremento undiquaque torquetur & lancinatur, nec prius quiescere potest, quàm ipso per vomitum liberetur.

Externa verò causa ventriculi caliditatem ita labefactans, ut imminutè coquat, sub se comprehendit sex res non naturales à Medicis vocatas.

Quarum prima est aër, suâ frigiditate, si quis fortè sese ab eo non probè muniat, ventriculum æquè, atque reliqua membra totius corporis vehementer lædens. Altera est peccatum commissum in cibo & potu : in quibus consideratur primò substantia : quando nimirum cibus crudus & difficilis coctionis frequenter usurpatur. Quo in casu est vituperanda beluina & audax quorundam intemperans ostentatio, quâ certando de bonitate ventriculi, quòd non modò carnes & pisces fumo induratos & crudos, imò quasi etiam lapides pro cibis concoquere possint, vorant. Secundò, quando copiosior cibus & potus non ad famem satiandam : sed ad nauseam & vomitum usque ingeritur. Quo etiam redigendæ sunt crapulæ, quæ plerorumque morborum, præsertim apud nostram gentem, procreatrices causæ sunt præcipuæ. Tertiò, quando ventriculus oneratur quotidianis cibis & potibus refrigerantibus, qualia sunt lactinia, usus lactis & casei, olera refrigerantia, ut sunt lactucæ, sonchi, cichoracea, melones, pepones, fructus horarii : quorum multiplex & frequens usus non prohibendus sed execrandus erat. Quartò, quoties nec tempore justo & debito, nec ordine conveniente cibi ingeruntur, imò crudi & inconcocti apponuntur, tandemque verè vix masticati, frustulatim deglutuntur.

Tertia est error commissus in motu, qui post cibum sumptum est concitator, quàm convenit : qualis est saltatio, exercitium equitationis aut gladiatorium, quo calore à coctione in superficiem evocato, necessariò cruditates causantur.

Quæ verò in excernendo & retinendo corporis excrementa, somnoque & vigiliâ, ac tandem animi affectibus quotidiana committuntur errata, unà cum iis, quæ hætenus commemorata sunt, tantæ sunt potentiæ, ut hæc sola primam coctionem aut planè evertere, aut tantum lædere & labefactare possint ; ut rarò ægrotos esse audiamus, qui sobriè & temperanter, id est, secundum naturam, vitam suam traduxerint.

Atque

Atque hæcenus de causis, ventriculi facultatem coëtricem ita labefactantibus, ut imminutè coquat, tam externis, quàm internis, nativis & afficitis. Sequitur nunc de causis secundam coctionem, quæ vaporis mineram, de quâ sermo præcipuus est, producit, labefactantibus.

Cum enim vitium primæ coctionis non emendetur in secundâ, diligenter sciscitari oportet, unde, & quomodo minera vaporis adusti, acris & melancholici atque flatulenti generetur.

Dictum autem est pro ratione ingestionum & imbecillitatis caloris ventriculi & caliditatis extraneæ viscerum & adjacentium illis venarum, chylum inæqualem generari, illumque in secunda coctione non perfici, melioremque aut benigniorem fieri: idque propterea, quòd chylus & secundum substantiam & qualitatem & quantitatem perfectione suâ destitutus est. Considerandus igitur est secundum omnes circumstantias.

Quoad substantiam: est crudus inconcoctus & inæqualis. Partim enim est tenuis & aqueus: partim mediæ consistentiæ. Quoad qualitatem: est crassus, & modò acidus & subastringens, modò acris, modò amarus. Quoad quantitatem: est copiosior, quòd ob frigiditatem ventriculi, hypochondriaci semper plus ciborum, quàm rectè coquere possunt assumere solent.

Quotiescunque igitur natura in talibus ægris secundam coctionem aggreditur, ob caliditatem epatis & venarum, tenuem chyli & aquosam partem maturiùs, crassam seriùs & tardiùs attrahit: illam in vapores tennes, acres & nonnunquam subfalsos resolvit, & in caput, ut paulò antè dictum est, extrudit, illudque replet & sudoribus, vel catharris, vel cerebri perturbationi, & (ut suprâ memini) capitis doloribus, sed tamen hac in parte rariùs, materiam & causam præbet. Hanc in venis diutiùs ob ficitatem & caliditatem morari facit, & adurit, vel in adustum humorem, vel in melancholicum succum, qui deinceps in lienem transmittitur, vel in atrabilarium humorem, qui morbi (atrabilis ab Hippocrate appellati) causa est, convertit. Colliguntur autem isti humores, qui sunt flatulenti vaporis, caput, ut dictum est, replentis & afficientis, minera, in dextrâ parte ob igneam, quæ in epate est, & venis ex ipso per ventriculum disseminatis, caliditatem & ficitatem: in sinistrâ, ob humoris melancholici vel crassitiem, & propter admistam aliquam portiunculam pituitæ lentæ, viscidæ, in venis mesaraicis adhærescentem: vel copiam à splene imbecillo non sufficienter attractam: aut ad concitandam famem, & ventriculum, constringendo sese, exonerandum plenè, & secundum quantitatem, naturæ convenientem, non expulsam: sed eo quasi in itinere ob

E 3 expul-

expultricis debilitatem, relictam : deinceps verò propter morem, ratione obstructionis diutius detentam, efferveſcentiam & ſiccioſiorem & ad expulſionem rebellioſiorem redditam. Minera igitur in utràque parte utrobique eſt actu calida & ſicca : potentiâ autem in ſiniſtrâ parte, frigida & ſicca : in dextrâ partim pro ratione chyli in calidum & ſiccum humorem traducti, calida & ſicca : partim in humorem aduſtum converſa, frigida & ſicca : facultatis autem acris & aſtringentis. Unde in apertum prodit cauſa gravitatis, imò etiam acerbioris mitiorisque paroxyſmi. Quotieſcunque enim vaporis minera in utroque hypochondrio fixa eſt, & ab utroque viſcere, puta, epate & liene ſimul proficiſcitur : paroxyſmus hypochondriacus graviffimus eſt : quando verò in alterutro tantum ſedem habet, & unum tantum viſcus læſum eſt, mitior eſt. Ubi verò nullo viſcere læſo in ſolis venis, iisque vel hujus, vel illius partis minera nidum habet, miſſima acceſſio eſt, & facilis atque citius terminatur. Porro etſi hæ mineræ in utroque latere ſive hypochondrio, maximè verò in ſiniſtro perpetuò hærent : non tamen proinde concludendum eſt, tumorem, tenſionem, duriciem aut dolorem in alterutro, niſi fortè ſplen præter naturam intumuerit, ſequi oportere : quòd iſtius mineræ (quamvis plurimorum flatuum, ructuum, murmurum & rugituum, circa imum ventrem, & ſitum venarum meſaraicarum ſiniſtræ partis continua ſit productrix) copia ſit exigua, quæ plerunque repetitis intervallis excernitur, & potiffimum quando materia cruda & pituitoſa, in ventriculo copioſius collecta, & eum gravans, impulſu naturæ, quaſi criticè ad inteſtina ruit, & cum humore melancholico in tranſitu ita permifcet, ut non alba : ſed atrâ fuſcedine inquinata colorataque appareat. Atque hætenùs de cauſis, mineram vaporis melancholici in ſecundâ coctione producentibus, internis. Ex quibus hoc malo conflictantes diligens inſtituere debent examen erratorum ſuorum, ut ea, à quibus læduntur, aut læſi ſunt, evitare & ſic ſibiipſis auxilium medicum afferre poſſint.

Ut verò id tantâ majore confidentiâ & certitudine ab illis fieri queat : recensenda ſunt ſigna, ex quibus, tanquam certis & demonſtrativis notis naturam atque eſſentiam hujus mali dignoſcere & firmiter concludere poſſint, non alio, quod plerique uſa veniunt, quàm hoc malo affligi ſe. Ac primum, quòd actiones læſas, easque animales attinet : depravatur functio imaginatrix, ob admiftoſ ſpiritibus animalibus vapores, obſcuros, retros & tenebroſos, ita ut patiens ſibi falſò imaginetur varia & multiplicia. Plurimi enim in eum errorem incidere ſolent, ut ſleu ſeſe & ejulatione macerent, metuendo ſibi ab apoplexiâ : multi ab epilepſiâ : nonnulli

nulli à subitâ morte, ita ut ejus metu cotidie testamentum condere velint, quasi cras aut perendie morituri, cum tamen peractâ septimanâ, nihil de sepultura rectè instituendâ sese offerat. Plurimi alios morbos sibi imaginantur, ex quibus nonnulli calculum: alii tumores in ventre inferiore & mesenterio: alii aliquod viscus internum corruptione in abscessum abiturum, & incurabilem morbum sibi persuadent. Memini, me in hospitali Torgensi quandam famulam ex sinistro hypochondrio melancholicam, propter quotidiana *μωρολογεῖα*, ructus, flatus, rugitus & murmura ranas sese in sinistrâ parte ventris inferioris, quâ venæ mesaraicæ à splene ad ventriculum feruntur, alere, imaginari: cui post obitum, cum aperiretur, non modò ingens Saburra melancholici & pituitosi humoris in venis reperiiebatur: sed etiam (quod mirum est, attamen ab Hieronymo Cardano multo tempore antè observatum) calculi in aliquibus venis deprehensi sunt. Quidam in eo errore versantur, se malo, nulli unquam hominum cognito detineri: qui quoniam eâ in felicitate sunt, ut in imperitos medicos incidant, tale malum planè immedicabile opinantur. Multi dùm cum tantâ animi errantis luctâ bellum gerunt, tristitiâ perpetuâ sese macerant & metuunt, se, quando sub noctem lecto sese componunt, vicissim non resurrecturos, vesperam sequenti die non assecuturos, multo minùs cubitum rursùm ituros.

Atque hoc est saxum Sisyphi, quod imaginatione depravatâ patientes volvunt, ut sibiipsis sint perpetua calamitas & miserabile flagellum. Quomodo verò & cur Imaginatio in hoc morbo depravetur, paucis est declarandum.

Notum est omnibus, omnes mentis actiones perfectè perfici, mediantibus spiritibus animalibus, qui sunt instrumentum animæ proximum, & tanquam causa per quam: & actioni rectè obeundæ plurimùm conferunt. Spiritus etiam esse de naturâ lucis, splendidos, aëreos, puros atque lucidos. Quocirca si actio imaginatrix exquisitè & debitâ naturæ legi fieri debet: spiritus animales puros & lucidos esse oportet. At cum in melancholiâ hypochondriacâ sursùm ferantur, & spiritibus animalibus permisceantur vapores obscuri, nigri, tenebriosi & flatulenti, illosque obscuros, nigros turbulentosque reddant: fit, ut subitus accidat motus & translatio spiritus animalis lucidi, contrarii scilicet in contrarium, lucis in tenebras, splendidi in obscurum. Quo circa ex hoc contrario, in contrarium mens transiens, de objectis, non secundum, sed præter naturam judicat: non concludit & rectè ratiocinatur: sed opinatur & errat, imò expavescit & metu contremiscit: quemadmodum videmus pueros & juvenes.

venes subito clausis fenestris alicujus conclavis, ex luce in tenebras translato perterrefieri, & metu alicujus praesentis mali, non aliam ob causam exclamare: quod propter tenebras subitaneas circumstantia quaeque, ut ante, non liquido & exacte videant, periculum vitae, aut causam aliquam morbi, aut alterius mali impendentis metuant. At quoniam vapor iste flatulentus non modo spiritus animales, quatenus imaginatrici: sed etiam quoad ceteris sensibus exterioribus inserviunt, permiscetur, praeter jam dicta, sensoria illa etiam perturbat: unde aures perpetuo tinnitu sonant, aut fragoribus & strepitibus, quasi molarum & aquarum impetuose currentium, vel etiam campanarum sonantium modo magis, modo minus percelluntur. Oculi etiam obscure vident, & res visibiles impeditè & quasi perturbatè cernunt, imò saepe vapore admodum flatuoso quasi circumagi omnia putant, & vertiginosi fiunt.

Quod ad motum voluntarium attinet, vapor melancholicus panniculos cerebri contingens, eos propter aciditatem & acrimoniam convellit, illosque constringendo motum excitat inordinatum: & proinde ea parte cranii, quae vertex appellatur, sensus quasi dolorificus manifestè deprehenditur.

Porro si iste vapor sit grassior & copiosior, & nervos occupet, propter vim astricticem, quam habet, spirituum animalium in ipsos irradiationem & transitum inhibet & obstruit, adeo ut nervi quasi calore ad movendum prohibeantur, nec actiones motus expedite exsequantur. Unde si nervos linguae imbuat, formicationem in illis excitat, obrigescent musculi linguae, & loquela impeditur, imò etiam gula simul constringitur videtur. Si verò thoracem moventes occupet nervos, eadem de causa respiratio fit difficilior, & praecordia atque thorax quasi convelluntur. Cæterorum verò nervorum paria deinceps invadens, convulsionem partium capitis & imprimis faciei talem excitat, ut frons labiis, & mentum buccis & naso conjungi & uniri velle videantur.

Insinuans autem sese nuchæ & nervorum principio: primum nervos, brachia & manus moventes, ad motum pigros & flaccidos reddit perinde ac si *παρελυτόντι* cum stupore, in illis à primo principio per longitudinem brachiorum usque in annularem & minimum digitos sese extendente, cum formicatione quadam, ac praeterea cum frigore sese exportante, illis accidat: idque praecipue, quando vapor ex utroque hypochondriorum latere sursum fertur & universum ferè cerebrum occupat. Si verò ex alterutro tantum hypochondrio vapor eructando exhalet, tunc etiam alterutrum brachium & manus stupefcunt, digitique duo, minimus &

& ei contiguus annularis, formicante perfrigerationis sensu pertentantur. Tandem ubi nervos circa os sacrum perreptat, crura, pedes, & horum digiti non minor (quàm in brachiis & digitis manuum accidit) sed major existit formicatio: sæpeque unà stupor cum tanta convulsione supervenit, ut crura sursùm quasi trahantur, tandemque patientes nec amplius stare, multò minùs ambulare possint, imò lecto decumbere cogantur.

Similiter hujusmodi vapor motum, quem natura ad conservationem individui ordinavit, impedit: dùm non solum nervos cordis obsidet: sed totam cordis substantiam replet, & acrimoniâ, aciditate atque convellit, & in tantas angustias adigit, ut motu violento palpitare, & articularum celerem & velocem, ad discussionem & expulsionem tam violentæ flatulentæ & infensæ qualitatis impulsus excitare cogatur. Quod, quando sit, patiens planè de vitâ desperat, & opem atque auxilium maximo labore & alto suspirio desiderat atque exposcit. Ex iisdem etiam fundamentis & causis jam recitatis, spiritus animales suâ caliditate & frigiditate, & cum his conjunctâ siccitate non solum perturbat: sed etiam roridam cerebri humiditatem absorbit, & somni causam proximam atque materiale exiccat, vigilias perpetuò molestas fovet, aut somnos perturbatos, metus, terrorum & phantasmatum plenos inducit, & ægrum perpetuis somnorum ludibriis vexat & exercet. Atque hæc indicia sunt hujus morbi, quæ à læsâ actione animali & vitali sumuntur. Quæ naturalem sequuntur, partim suprà recitata sunt: partim jam commemorabuntur, quando de excrementis sermonem instituam.

Suprà memini, mineram vaporis flatulenti, adusti & melancholici originem ducere à læsâ chylicatione, quæ in ventriculo absolvitur, & sanguificatione quæ ab epate in secundâ coctione perficitur. Nunc verò necesse est ostendere, quomodo excrementum sit opus procedens ab unaquâque coctione, & quomodo singulæ per certa signa, læsæ deprehendantur.

Ac primò, quotiescunque ventriculi facultas chylicatrix ab intemperie frigidâ & humidâ (nonnunquam etiam siccâ) est labefactata, non solum copiosiores cibos & potus, quàm coquendo sufficienter superare potest, appetit: verum etiam ingestos, propter humiditatem tam nativam, quam asscitiâ non arctè complectitur, multò minùs in cremorem secundum naturam perfectè alteratos convertit: sed in liquorem aqueum copiosum, nonnunquam acidum, interdum acerbum & ponticum, sæpè amarum & biliosum (cibis inæqualibus videlicet unâ vice ingestis & corruptis) transfert: necessariò ventriculi orificio superiori

F

non

non debite coarctato & clauso sequuntur ructus plurimi, interdum insipidi: interdum verò acidi, indorulenti & amari.

Deinde cum imbecillitatem coctricis imitetur conversio ingestorum non in cremorem substantificum, sed aqueum salivalemque, ut modo dixi, humiditatem (sicut videmus in carnib. ob ignem insufficientem juscula aquea non substantifica coqui) quæ propter obstructas venas utriusque hypochondrii, nec ab epate sufficienter attrahitur, nec deorsum descendere potest, sursum repit, & lignam multâ salivâ, aqueâ humiditate imbuit, & os aquâ ita replet, ut sine intermissione multam salivam cum paucâ pituitâ excernant, secundum aphorismum Hippocratis, cum dicit: Qui frequenter & multum exspuunt, hoc melancholicum est. Quo in loco notandum, quòd propriè de hac specie melancholiæ loquatur.

Porro cum ob calorem extraneum & quasi inflammatorium, qui ex epate & venis utriusque hypochondrii prodierit, ventriculo molestus est, non secundum naturam fiat coctio, sed potius alustio: fit, ut in tam violentâ coctione à calore igneo institutâ, vehemens sequatur aquosi chyli ebullitio, cum multis bullis, in flatus abeuntibus, qui non solum ventriculum: sed etiam hypochondria vehementer extendunt, & circa præcordia tantam angustiam producunt, ut ex lancinatione orificij ventriculi, ex nervis sexti paris, sensum exquisitum obtinentis, ægrotantibus sæpè anxietas cum lipothymia superveniat. Idque tum maximè accidere solet, quando crassiores partes chyli propter obstructas venas non possunt deorsum descendere & expelli, sed longius retinentur, & propter illam moram, conditionem veri chyli amittunt, naturamque excrementi induunt, & naturæ adversariam proprietatem assumunt. Tum sanè orificium ventriculi tantopere afficitur, ut tremere ventriculus sentiatur, & animi quasi deliquium propter dictos nervos comitetur. Quæ omnia non prius cessare solent, quàm natura id, quod grave & molestum est, duplici modo expellat: crassum enim vomitu extrudit: tenue aquosum acidum & ponticum, per cæca spiracula totius corporis ad superficiem cutis, propter acrimoniam & aciditatem cum horrore quasi febrili expellit, relinquendo tamen propter ponticitatem pororum cutis astrictionem extuberantem & elatam, quæ anserum deplumatorum cuti non est absimilis: quem horrorem vapores, ex sinistro hypochondrio instar impetuosius flatus, expirantes, maximâ ex parte & irritare & adjuvare solent. Cum enim humor melancholicus suâ naturâ flatibus commovendis sit idoneus, præter dictum horrorem in sinistro hypochondrio perpetuos rugitus (præsertim si aquea humiditas, quæ collecta acescere coepit, sit admista) & mormo

lyci

lycia procreare solet. Accedit his omnibus, oluum, ob quasi inflammatoriam caliditatem venarum in utroque latere, præsertim consentientibus utrisque visceribus, epatis scilicet & lienis, exiccati & obstrui, & ex hac obstructione flatus retineri, qui non modò hypochondria tendunt: sed & paroxysmum, non patente exitu, hypochondriacum irritant, & fecibus permisti, eas bubulorum stercorebus similia & levia reddant: adeò ut medicus diligens, præservaturus ægrum suum ab invasione paroxysmi, operam omnem eò dirigere debeat, ut enematis alvum fluidam reddentibus, unà cum istiusmodi stercorebus, flatus deorsum trahentibus, liberum & tutum reddat. Ob eandem caliditatem tam vitio primæ, quàm secundæ coctionis excrementa alvi acriora & biliosiora esse solent, adeò ut in excernendo acrimoniam maximam præ se ferant, & ægrotantes misere excrucient.

Unde urinæ etiam acriores propter admistionem materiæ adustæ redduntur, ita ut, dum excernuntur, nonnunquam non levem mordacitatem comitem habeant. Nec solùm acrimoniam molestant obtinent, sed ex adustione foetorem aciditatis & putredinis cujusdam, cum obscurâ rufedine, propter admistas partes interdum biliosas, interdum melancholicas obtinent. Quibus etiam accedente caliditate renum, partes sanguinis crassiores in saburram substantiæ arenosæ conversæ permiscentur, & sæpè obstructionem in renibus dolorosam excitant, & inde calculi metum ægris adferunt; excreti verò eodem vicissim eos liberant.

Quod si non modò hujusmodi arenosam urinam detineant: sed etiam alii humores pituitosi eas vias impediant: urina tenuis & alba atque aquea apparet: quæ simul etiam propter obstructiones, augmentum caloris & flatuum, atque consequenter paroxysmum instare pronunciant. Unde etiam præsertim si ægri largius bibant veteres cerevisias & vina, ichoribus unà cum sanguine in habitum venarum copiosè attractis, sudores ob dominium melancholici humoris, copiosi & foetidi, inprimis de nocte perfluunt, atque tum de atrocitate paroxysmi, nempe qui alvo non fluente plerunque ob flatus retentos frequentius ingruit & exacerbatur, vehementer querulantur.

Accedentibus etiam erroribus, à causis externis profectis, & calorem, quasi inflammatorium exasperantibus, ut magis igneam naturam assumat, colliquatio quædam humorum exurgit, & fluxum alvi excitat, nonnunquam biliosum, interdum multo excremento melancholico & nigro simul permistum, aut præcedente ob retentionem humoris melancholici in splene & venis mesaraicis collectione, attum & melancholicum.

Cumque in hac affectione ventriculus imbecillus, ut superius commemoratum est, plus appetat, quam sufficienter coquere potest: consequens est, imminutam coctionem, collectionem multæ pituitæ crudæ, aquosæ, albæ, partim acetosæ, partim subamaræ, nonnunquam propter internum calorem crassæ & viscosæ, atque etiam flatulentæ, cum melancholico humore permixtæ (præsertim in ijs, qui tenuem & multam salivam, cum paucâ pituitâ permixtam per os ejicere solent) comitari: quæ deinceps per alvum sponte proruit, vel enemate alvum irritante ad expulsionem promovetur.

Talis autem pituita qualiscunque sit, si diutius retineatur, à calore interno lentorem contrahit, & si tenuis, in excretionem spumosa apparet.

Hactenus, quæ ab excrementis signa petuntur, diligenter examinata & commemorata sunt: nunc quæ qualitates mutatæ, sive externæ affectiones hypochondriacis superveniant, commemorabo.

Ac primum, quoniam hic affectus quasi inflammatorius est, teste Galeno, solet ægrotantes circa hypochondria molestissimo ardore, fervore & æstu interno excruciare, nonnunquam in utroque, nonnunquam verò in alterutro. Unde aliquos reperias, hoc miserabili flagello conflictatos, qui de nocte vel utrumque vel alterutrum hypochondrium inter dormiendum denudent, habeantque hoc magni levaminis, ut scilicet quietius & suavius dormiant, loco.

Solet etiam iste calor internus ratione victus calidioris & aliarum causarum externarum ita exacerbari, ut universo corpori communicetur, & quasi febrem ephemeram lentam excitet: idque tum maximè, quando calidus & humidus vapor ex multo potu per universum corpus dispersitur. Imò etiam hujusmodi calidis & humidis vaporibus sursùm elatis, & partes faciei replentibus malæ, & sæpe tota facies præter solitum rubescere incipiunt.

Unde etiam iisdem vaporibus sive magis, sive minùs in caput exhalantibus & palatum, linguam & fauces calefacientibus & exiccantibus, oris siccitas cum leviusculâ siti, & linguæ scabrie molestâ comitantur.

Cum autem calor hypochondriorum sit præter naturam, & omnium coctionum, sive ea sit prima, sive secunda, sive tertia, corruptela & depravatio: fit, ut etiam excrementa à statu naturali propter calorem, latissimè recedant, & putrescant, suæque putredinis notam certissimam, id est, foetorem deterrimum consequantur.

Cæterum commemorata hactenus symptomata omnia, non in omnibus ægris simul comparent: sed modò hæc, modò alia, pro partium

vel viscerum, distinctè aut simul læsarum ratione, pauciora vel copiosiora sese in apertum proferunt. Alia enim symptomata & multò graviora comitantur in concursu utriusque visceris simul læsi, & venis utriusque partis obstructis. In quo casu omnia sunt graviora & plena metuenti terroris. Alia sequuntur uno tantum viscere læso, comitantibus tamen obstructionibus in venis utriusque hypochondrii: quæ satis etiam esse solent molesta, sed paulò mitiora. Alia animadvertuntur, neutro viscere læso: sed ex obstructione vel utriusque vel unius tantum lateris sive hypochondrii, prodeunt: quæ omnium sunt mitissima, morbiq; curationem vel faciliorem, vel difficiliorem pollicentur: vel ejus è medio tollendi spem aut exiguam, aut nullum faciunt.

Quod maximè incidere solet, quando melancholia hypochondriaca diù duravit, & gravissimis symptomatis afflixit, ita ut mentis alienatio supervenerit, quæ cum metu & tristitiâ, in iracundiam, animi commotionem & leviusculum furorem abierit.

Aliàs si diù duret, in melancholiam per *ιδιοπαθειαν* transit: in quâ si vapor melancholicus cerebrum occupet, sensus & motus depravantur & ablationem sui minantur. Si verò vapor caput petens, idque graviter affligens biliosus fuerit simul & melancholicus ex bile adustâ: transit in maniam & furorem.

Accedente verò magnâ ventriculi cruditate, in qua vapores crudi & crassi augentur, facessit in epilepsiam: ad extremum verò, cerebro diuturnitate admodum debilitato, & cruditate auctâ, in apoplexiam terminatur.

Accedente multo & copioso usu vini potentis, & victus melancholici, in atram bilem (quem morbum Hippocrates sic appellat) abit, quâ sæpe cum delirio leviusculo, & pulsu arteriarum in sinistro hypochondrio forti & valido: Sæpe cum furore, materiâ scilicet in ventriculos cerebri magnâ ex parte, & copiosè, & magno cum impetu impulsâ, in epilepsiam, quæ ad horas aliquot sese, sed repetentibus per intervalla paroxysmis, non usque adeò tamen terribilibus sese extendit, degenerat.

Quæ cum risu (Hipp. 6. aphor. 5.) fiunt desipientiæ hypochondriacæ securiores: quæ verò cum metu & tristitiâ, periculosiores sunt; nulla tamen desipientia propter læsum cerebrum, quæ pars principalis est, est tuta.

Si imaginatio tantum lædatur, mitior est: si verò ratio simul, gravior, & difficilius curationem admittit: quod illic solum anterior pars cerebri vapore tenebricoso: hic insuper & media pars repleatur.

Cum autem materia proxima, quæ mentem perturbat, sit vapor, facilius curationem admittit: difficilior tamen tantò, quanto vapor est copiosior, curatio: quantoque est vel crassior vel acrior, multò operosior.

Quotiescunque melancholia talis diù durat : nemo non facile intelligit , lienem copiosum colligere humorem crassum , melancholicum , qui & ob ejus imbecillitatem & obstructionem retinetur , & tandem per venas in totum habitum venarum transit , & universum corpus cacochymum reddit , & per consequens sanguine frigido replet & refrigerat. Unde cum spiritus vitales generentur frigidi & sicci , animales similiter frigidiores , sicciores , & ad agendum ineptos reddi , planum est.

Cum autem hætenus commemorata symptomata ægrotantem quotidie simul invadere (quamvis iis nunquam omninò careant) non soleant : sed nonnunquam per certa intervalla gravitatem & vehementiam suam , certo quodam paroxysmo , instar improvise turbinis & grandinosæ pluvie ostendant : eorum seriem justo & exquisito ordine commemorabo.

Ac primum quidem , quando à causâ aliquâ vel externâ , puta , improvisâ perterrefactione , irâ , mœrore , metu , usu flatulentorum & calidorum ciborum , vinorum aut potuum : Vel internâ : scilicet malorum , sive in dextro , sive in sinistro , vel utroque hypochondrio sedem habens , commovetur , vapor flatulentus ex sedibus mineræ in ventriculum irruens , multo comitante ructu eum distendit , & cum acris , acidus , subamarus & astringens sit , ejus orificium , propter nervos sexti paris ipsi implanatos lancinat , & per illud tanquam medium ad caput fertur : in nonnullis anxietatem lepothymicæ non abfimilem , circa præcordia (quæ tùm simul versus mammas sursùm ferri sentiuntur) excitat , mox per cæca spiracula altius ascendens difficilem respirationem inducit , & cordis palpitationem manifestam commovet : per gulam verò amplius perreptans & nervos linguæ pervadens , ipsam quasi manu constringit , & linguam rigentem , & veluti immobilem ad loquelam perficiendam reddit : pergens verò & cerebrum occupans spiritus perturbat , oculos caliginosâ & atrâ nebulâ suffundit : aures tinnitu percellit : mentem perturbat : nervosum verò genus invadens , convulsiones panniculorum cerebri introducit tales , ut opinetur patiens , sibi totam substantiam cerebri ex cranio evulsum iri : musculorum etiam capitis exteriores , & faciei atque labiorum ita tendi & lancinari , quasi frons genis & labiis conjungi videantur.

In quâ anxietate vapor nervis ex occipitio per spinam dorsi deorsùm secundum longitudinem tendentibus , sese porro insinuans , interdum dextro , interdum sinistro brachio , & in his maximè minimo & annulari digitis : nonnunquam pro copiâ aut crassitie materiæ utrisque simul , stuporem refrigerantem , & motum formicantem introducit : pergens verò & nervos ex osse sacro prodeuntes attingens , eos similiter stupore formicantem

micante lancinat, itaque immobiles reddit, ut quasi convelli & sursùm trahi videantur. Quod cum fit, & pavoris atque terroris plena sunt omnia, ne fortè ex improvìso proni in terram delabantur, locum quieti quærunt: intereà mente quasi privantur, & sudore frigido madescunt, paulò post calore cordis (qui superatâ palpitatione partes vitales vivificaturus præstò est) recollecto, vicissim rubore suffunduntur, & victoriam mali à calore, instar solis persentiunt.

Rarò hæc omnia ægotantes hoc ordine recensere possunt: quòd improvìsâ celeritate, instar Euripi supervenientis eos invadant, & quòd ratione & mente perturbatâ, singula memoriâ comprehendere nequeant. Dissipato autem tali vapore, omnia concidunt, nec quicquam patientes finito paroxysmo amplius persentiunt, præter metum gravioris morbi, puta vel epilepsiæ, vel apoplexiæ, vel subitæ mortis: à quâ cum abhorreant, tristitiam & animi abjectionem indefinenter foveant, & sese excruciant.

Hæc de paroxysmo breviter percensere libuit, ut patientes ex hoc quasi compendio, signorum seriem memoria comprehendere, fontem mali exquisitiùs rimari & ediscere possint, metumque & tristitiam contemnendi, præsidium firmum, medicis auxiliis obsequium majori spe præbendo, sanitatisque recuperandæ firmiùs solamen consequantur.

CURATIO.

QUicquid hætenùs de melancholia hypochondriaca, qua cum tua Magnifica Dignitas à longo tempore bellum gerit, à me differtum est, id saltem theoriam, id est essentiam, causas, signa & prognostica completum est. Nunc etiam practicè res tractanda est, ostendumque, quomodo tam diuturnum & calamitosum malum, remediis idoneis, secundum præcepta medica, vel prorsùs tolli, vel saltem ita mitigari possit, ut tua Magnifica Dignitas sine metu & tristitia vitam securiorem & hilariorem transigere possit. Etsi autem hic affectus sit diuturnus: non tamen tanta difficultate in curatione eget: quòd non nisi ex minera vaporis in utroque hypochondrio contenta, ortum ducat: deinde, quòd neque splenem unà affectum esse, corporis constitutio indicet: tertio, quòd etiam hic affectus eò usque mentem non occupaverit, ut habitu confirmatus esse deprehendatur: quarto, quòd constitutio tuæ Magnificæ Dignitatis, atque adeò universa temperies ejus, ab hac mentis perturbatione secundum naturam aliena est: sed quicquid labis possidet, ex causis externis, interioribus ansam præbentibus, originem traxerit: quinto, quòd

ætas & vitæ conditio huic hosti utrinque auxiliares manus opponantur & illi adversentur. Non enim hæc ætas Tuæ Magnificæ Dignitatis est, melancholiæ sine causa, quotidianum fomentum præbeat, tristitiæ & metui: nec vitæ conditio, quæ in quotidiana consistit conversatione, tractatione multorum negotiorum, ea est, ut metui & tristitiæ facile indulgendi ansum præbeat: Sextò, quod nullam partem corporis adeò affectam esse, deprehendam, ut non spem habeam, si idoneis remediis tractetur, & tua Magnifica Dignitas in remediis usurpandis adhibeat diligentiam, in statum pristinum, si non perfectè, ita tamen restitutum iri, ut manifestum futurum sit, non frustra nos operam medicationi impensuros.

Antequam autem curationem aggrediar: indicationes curationum ob oculos ponendæ sunt, ad quæ universus in curando labor, tanquam ad cynosuram dirigendus est. Est autem prima indicatio præservatio ad causam directæ. Cum enim imaginatrix functio depravetur, ob admixtionem vaporis obscuri & flatulenti, spiritibus animalibus in anteriori parte cerebri etiam secundum poros contenti: huic verò, cum facile attenuetur & evanescat, statimque paroxysmus finiatur, nulla medicatio fundamentalis fieri possit: ulterius progrediendo & resolvendo, tandem offertur materia sive minera in hypochondriis contenta, à quâ vapor commemoratus sursùm exhalat, & imaginatricem de novo perturbat. Hæc materia ultimum est, quod in resolutione invenitur: idcirco ab curationis initium sumendum est.

Prima igitur intentio est evacuatio seu sublatio materiæ seu mineræ in venis hypochondriorum contentæ. Secundò, cum ob caliditatem quasi inflammatoriam ista materia ferveat: necesse est usurpare medicamenta simul refrigerantia istum fervorem & caliditatem quasi inflammatoriam emendantia. Tertiò deprehenditur ista materia præter caliditatem crassam & siccam: quia est partim adusta & melancholica: quæ Quartò simul etiam plerumque admixtam habet materiam pituitosam, lentam & viscidam, cottidiè ob ventriculi imbecillitatem accedentem. Idcirco tertia & quarta intentio medicamentis incidentibus, attenuantibus, aperientibus, & citra celefactionem detergentibus complendæ erunt, ut venæ hypochondriis contentæ ab omni sorde & saburrâ humorum, obstructions foventium, eluantur, & extra corpus promoveantur. Tandem ut diversæ partes à vaporibus diversè afficiuntur, materiamque seu mineram multipliciter & variè generatam suscipiunt, & ab eâ alterantur. Quinta etiam inducatio erit eorum auxiliorum, quæ caput, ventriculus

lum, epar, splenem & cor ab his mudent, alterent & corroborando confirmant.

Dùm in his ritè administrandis operam suam consumit Medicus : à Tuâ Magnificâ Dignitate duo requiruntur ut quàm maximè. Unum, ut in medicamentis usurpandis sit obediens & obsequens. Alterum, ut animi affectiones, quæ variæ sunt, & curis, tristitiæ, metui atque sollicitudini causam præbere possunt, quoad ejus fieri potest, devitet atque declinet.

Cum autem materia seu minera peccans, solum in venis, in hypochondrijs sitis, sedem habeat, Medicus summâ diligentia cavere debet, nec purgantibus validis & è longinquo trahentibus, sed lenientibus, ut Medici appellant, rem aggrediatur. Secus enim faciens, materiam in toto habitu venarum perturbat & commovet, ægrumque materiâ debite noneductâ enervat, epatis & venarum calorem acriorem, & ventriculum debiliorem reddit, ejusque vires labefactat : imò plus nocet quàm juvat. Talia verò poterunt secundum hunc modum præscribi.

Recip. *Elect. lenitivi* ℥j.

Spet. Elect. Episcop. ℥ij

Ol. Anisi gt. j

Cum Sacch. fiat bolus, exhibendus aut manè post horam septimam, tribus videlicet horis ante prandium : aut vespèri horâ tertiâ, duabus horis ante coenam, & non tardiùs.

In hoc medicamento electuarius lenitivus temperatè refrigerat, & humorem melancholicum educit. At cum pertinaciter propter crassam & lentam pituitam admistam, venis adhæreat : admiscentur ea, quæ pituitam simul, sed potentiùs educunt.

Huic quis contradicens affirmare posset, me contrà facere ac suprà prohibueram, validè videlicet, & extra primam regionem educantibus purgantibus non esse utendum. Huic respondeo verum esse, quod objicit : sed id simul considerandum, exhiberi hoc medicamentum tribus aut duabus horis ante prandium, vel coenam : idque propterea, ut vis validioris medicamenti inhibeatur, ne efficacius ex partibus remotis attrahat : sed cibo deprimatur & impediatur, ut scilicet solum id, quod in vijs communibus, puta venis, inter epar, ventriculum & splenem sitis, contentum est, educat, nec ulteriùs operationem suam extendat. Quod ut salubriùs peragatur, & viscera quasi inflammatoria caliditate ferventia non magis exardescant, semilibram feri caprini, secundum descriptionem Dioscoridis paratam, mox ante cibum exhibeo : quæ ita hy-

pochondriorum caliditatem contemperat, ut mirum dictu sit, quàm se levare & juvari, ægri prædicent. Hoc medicamen tum præservatoriè per sesquimenssem semel, aut citius, aut serius, pro eo atque morbi gravitas exposcit, exhibere soleo.

Eductâ verò sic materia, ad secundam, tertiam & quartam intentionem complendam, per biduum serum caprinum, cum vel sine pillulis, de quibus infra copiosius agetur, matutinis horis exhibeo. Eo enim venæ mesenterij refrigerantur, & minera obstructionum eluitur. Quintam intentionem compleo deinceps, roborantia exhibendo: quæ ut summa cautione, propter diversitatem partium corporis læsarum, egent: etiam non sine discrimine, sed diligenti indagine, quomodo scilicet singula ægrotanti salubriter convenire possint, sunt præscribenda. Sed pergo. Huic purganti medicamento non absimile est sequens.

Recip. *Spet. Hieræ simpl.*

Agar. recens tr.

Rhabarb. opt. ā. ʒj

Cum aq. Card. ben. fiant pill. n. XXI.

Exhibeantur hæ tribus horis ante prandium, vel duabus ante coenam: immediatè ante cibum ebibendo poculum unciarum sex seri caprini: & operabuntur non solum sine molestia: verumetiam manifestam euphoriam patienti conciliabunt, inprimis si vel serum caprinum per biduum matutinis horis biberint: aut raphani decocto ex brodio pulli, sine sale facto, utantur. Addo etiam tertium.

Recip. *Mass. pill. de hierâ cum*

agarico

aggregativar.

Rhabarb. interior. & opt. ā ʒj

Cum aq. veronica fiant pill. n. XVII.

Hactenùs de lenientibus medicamentis per intervalla ad educendam mineram vaporum adustorum melancholicorum & flatulentorum per intervalla usurpandis,

Accedo nunc ad quintam intentionem, quæ roborantia complectitur, & talibus medicamentis lenientibus subjungi debent, ut per ea intervalla, quibus Tua Magnifica Dignitas à cæteris medicamentis feriat, interim natura semper aliquid habeat, quo caput & viscera paulatim ad nativam temperiem reducantur. Inter illa autem primum locum tenent rotulæ sequentes.

Recip. *Spet. Diambra*

Aromat. rosat. ā. ʒj

Mar.

Margaritar. præp. ℥ij

Ambra vera gr. iiij

Sach. albiss. soluti in aq. cinam. ℥ij s.

Ol. Caryophyll. gr. iij

F. Conf. in rotulis. S. Küchlein.

Ex his rotulis matutinis horis usurpantur quotidie sex, & vespertinis similiter sex, circa horam tertiam.

Non parum etiam confirmant ventriculum, caput, & reliqua viscera, Zinziber in China conditum, & myrobalanus Indicus conditus, quorum myrobalanorum unus matutinâ horâ septimâ manducatur: Zinziberis vero frustum pondo circiter drachmarum duarum editur. Atque hæc de præservatione hætenus: cui & hoc addendum est, quod in hac affectione semper opera danda sit, ut alvus sit fluida: quod quotiescunque hæc sistitur, flatus augeantur & exacerbentur, & deinceps paroxysmo manifesta causa præbeatur. Utilissimum igitur erit, si Tua Magnifica Dignitas bis aut minimum semel de septimanâ, si ita res postulare videatur, clysterem sequentem sibi subjici curaret.

Recip. Herb. Parietar. M. iiij

Flor. Chamamel.

Meliloti ā. M. j

Fol. Lauri M. s.

Coq. in s. q. aquæ pro lb.

In quâ dissolve:

Elect. Lenit. ℥ s.

Diacathol. ℥vj

Mell. anthosati ℥j s.

M. s. F. Enema.

Quod præterquam quod excrementa deorsum promovebit: etiam flatuum excernendorum ansam præbebit. Sed cum frequens usus enematum nonnullis non usque adeo sit acceptus: poterunt domestici clysteres præparari ex medicamentis, quæ ad manum sunt. Componi autem clyster potest ex brodio pulli, in quo folia lauri, aut radix Imperatoriæ, vel flores chamæmeli decocti fuerint, & deinceps cum melle rosato colato, vel melle anthosato conficitur. Quando autem peculiarem & perfectam hujus morbi curationem instituere Tua Magnifica Dignitas voluerit, commodissime id fecerit vel instante autumnno, vel futuro vere. Autumnno quidem, præmisso uno ex medicamentis lenientibus suprâ annotatis, per sequentem Syrupum evacuationem materiæ in hypochondriis contentæ instituet.

Recip. Rad. Cichor.

End.

Scorzonera.

Eryngij ā. ʒʒ.

Petroselin.

Fenic.

Apij ā. ʒiij

Cort. Rad. Cappar.

Thamaris.

Fraxini ā. ʒiij ʒ

Polypod. quer. ʒj

Glycyrrh. rasa ʒvj

Sem. Dauci.

Aquileg. ā. ʒʒ

Plantag. ʒiij

Carthami conquss. ʒj ʒ

Passular. ʒj ʒ

Fol. Sena ʒiij

Epith. Cret. ʒʒ

Herb. Cichor.

End.

Beton.

Ceterach.

Veronic.

Adianthi nigri.

Hyssopi.

Lingua cervina

Spicanti.

Card. ben. ā. M. j.

Cog. in ʒ. q. aque (adde, aceti squillitici ʒv.) pro ʒij : qua colem-
tur & dividantur in duas partes : uni parti colatura ad dimidias
incoque :

Cort. Rad. elleb. nig. Styr. prap. ʒiij

Caryophyll. ʒj ʒ

Expressum & colatum servetur.

Alteri parti colaturæ adde :

Myrobal. chebulor. } Ol. amygdal.

Indor. ā. ʒiij } dulc. prap.

Cog.

Coq. ut decet: postea in fine coctionis per noctem in nodulo infunde:

Agar. tr. ʒviij.

Rhab. opt. ʒij s.

Spica 3 s.

Manè affuso superiori colato & expresso, bulliant parùm & expri-
mantur validissimè. Colaturæ, quæ non superet lbj, adde:

Syr. Bizanthini.

de Scolopend. ā. ʒiij

Oxyracch. squillit. ʒij

Sacch. albiss. ʒiij

Coq. ad consistentiam Syrupi fluidioris.

s. Syrup.

Hujus Syrupi (præmisso tamen, ut paulo ante monui, bolo, vel unâ dosi ex pillulis suprâ præscriptis, quamcunque voluerit) singulis diebus mane ante horam 6. Tua Magnifica Dignitas ebibet uncias tres tepefactas, & mistas cum guttulis duabus olei vel cinam: vel caryophyllorum, vel anisi, & usque ad prandium, quod hora 10. instituendum est, nihil comedat.

Hic Syrupus sine molestiâ & absque violentiâ mineram morbi, quæ in hypochondriis collecta hæret, educet, & reliquas etiam partes corporis ab humorib. inutilib. expurgabit.

Idcirco istius usum continuabit ad dies aliquot: sed cum hac cautelâ: ut videlicet, si paulo largius evacuet, interdum diem interponat, & sequenti die pergat. Sin autem non quotidie quater ex usu ejus alvum exoneret: sit ei hæc lex, ut unum cochleare priori quantitati adjiciat, & deinceps cotidie, vel alternis diebus pergat, donec universus Syrupus sit epotus. Altera lex illi esto: ut quando ternis vicibus de isto Syrupo biberit, quarto die ab omnibus medicamentis ferietur, & isto die mediam venam sinistri brachii, hoc autumnali: dextri autem, veris tempore aperire, & uncias quatuor sanguinis, eventationis causâ, ex eâ fluere sinat: aut si hæmorrhoides fluere consueverunt, hirudines applicari curet. Sequenti die usum syrupi pro eo atque commemoratum est, continuat. Postmodum Syrupo in universum epoto, uno die interposito, sequenti vicissim unam dosin pilularum suprâ dictarum usurpet; ut quod in hypochondriis adhuc reliquum est, plenè educatur.

Purgantibus ita præmissis, ad alterationem viscerum & venarum in hypochondriis progrediendum est.

Sed cum illa non possit exactè decerni, quàm omnia, quæ hæc-
nùs per medicamenta effecta sunt, priùs diligenter in præsentì statu ex-
pendantur: existimo opus esse exquisito examine omnium circumstan-
tiarum, ut deinceps usus Seri caprini ex extractis succis cardui benedicti
veronicae & Ceterach factis, ad dies vel octo, vel decem decenter adornari
& institui, atque hujusmodi medicamento secundus, tertius & quartus
scopus seu intentiones, quæ refrigerantia, aperientia, incidentia, attenu-
antia & detergentia simul complectuntur, unâ vice expediri possint. Qui-
bus ad dies plures uti oportebit, ut non solum ex venis hypochondrio-
rum, obstruens minera perfectè eluatur: verum etiam frigiditate Seri ca-
prini habitualis ferè caliditas & siccitas emendetur, & venæ ad temperiem
nativam revertantur. Dixi autem ad aliquot dies usum Seri caprini con-
tinuandum esse.

Cum enim hoc malum adeo sit pertinax, ut non facilè cedat: imò
etiam adversitate luis Venereæ in difficultate curationis non inferius sit.
longiora tempora ad superandum imò etiam crebriores curationum cir-
cuitus & intervalla requirit, donec perfectè evincatur, & penitus evellatur.

His ita peractis, imbecillitati ventriculi, epatis, splenis, capitis &
reliquarum partium diligenti emendatione perinde ut suprà dictum est
subveniendum erit medicamentis tam intrà exhibitis, quàm extrà admotis.

Inter medicamenta interiora, præcipuum sunt medicamentum Ambra
& Moschus, quæ tantam vim possident cerebri temperiem confirmandi
præsertim si cum margaritis jungantur, ut aliis nullis cedant. Sec-
cùm hæc à plerisque ægrotantibus, propter idiosyncrasiam capitis commo-
dè ferri non possint: priùs cum Tuâ Magnificâ Dignitate de his sermo-
nem conferre oportebit. Non minus his præstant oleum carui, caryo-
phyllorum & cinamomi.

Ventriculo, ut faciliùs coctionem perficiat, non abs re foret, si se-
quens pulvis pepticus post cœnam & prandium, ad quantitatem dimi-
dii cochlearis exhibeatur. Calorem enim ventriculi exuscitat, flatus di-
scutit, & catarrhos dissipat ac frenat.

Recip. Sem. Coriand. præp. ʒvj

Anisi.

Fœnic. ā. ʒj

Carui } in aceto mace-

Cymini } rator. ā. ʒij

Cinam. interior. ʒij s.

Glycyrrh. rasa ʒj s.

Cort. Citri ℥ij s
Flor. Origani P. ij s.
Nuc. Mosch. ℥j
Sach. rosat. tabulati ℥ij 3ij
Mis. F. Tragea. S.
Magenpulver.

Præter hæc etiã cortices arantiorum & citri conditi, item citrum conditum, acorum conditum, & zinziber etiã, cujus supra quoque meminimus, in Chinâ conditum. De quibus frequentius aut rarius quotidiana usurpatio nos erudiet.

Externa medicamenta non minùs internis, viscera ad suam integritatem reducere & confirmare possint. Inter hæc sunt pomambræ odoratæ, & alia, quæ temperatâ qualitate & odoris fragrantia cerebri substantiam permulcere & firmare possunt. De quibus tamen etiã, quomodo fieri possint, priùs diligenter sciscitandum est: novi enim, quibus pomambræ erant molestiores & graviores. Quibus accedunt fumi, pulveres, & trochisci odorati.

Externis medicamentis accedunt etiã unguenta ventriculo admovenda, quale est sequens:

Recip. Ol. de absynth.
Nardini ā. 3vj
Nuc. Moschat. express. ℥iij s.
Mastichini destillati gr. XV. Mis.

Hoc calefacto ventriculi regio illinatur superponendo pannum lineum triplicem calefactum. Idque fiat horis tribus ante coenam. Quando ventriculus videtur paulo infirmior, quàm hoc oleo ei sufficienter subveniri possit, Tua Magnifica Dignitas sequens scutum stomachale manè postquam surrexit, applicare poterit.

Recip. Fol. Beton.
Mentha.
Calaminth. ā. M. s.
Rosar. rub. siccar. P. j
Rad. Cal. arom.
Galanga ā. 3j
Cinam.
Caryophyll.
Ligni aloës ān. ℥j
Cort. Citri ℥j

Ol. Ma-

Ol. Mastichini.

Nardini ā. ʒj

Nuc. Moschat. express. ʒiiij

Mastichini.

Cera.

Terebinth. ā q. s.

F. Cerotum pro Stomacho. S.

Magenschildt.

Tale scutum singulis coenis & prandiis removendum, & non nisi post horas duas & dimidiam iterum apponendum.

Regio etiam epatis & renum, si eorum caliditas actualiter tanta deprehenderetur, similiter alterantibus emendari posset: sicuti, si splen paulo durior, & ad tactum renitens esset, eodem modo externis remediis tractandus & attenuandus esset.

Haftenus de medicamentis tam internis quam externis: nunc ad dieteticam pergo, de qua haec cautio superstitiosè observetur: Frustra nempe omnia medicamenta usurpari, nisi diligens victus ratio accesserit. Est enim neglecta victus ratione medicamentis, uti, perinde, ac si quis dextrâ manu ædificet, & sinistrâ vicissim destruat. Certè enim victus ratio non diligenter instituta, valetudinem neque firmiorem, neque tutiorem reddit, imò nec levat.

Sunt igitur boni succi & facilis concoctionis cibi, inter quos recensentur ova tremula, juscula ex capis, pullis domesticis, & carnibus bubulis juvenibus.

C A R N E S.

Sint vitulina, agnina, bubula dimidii aut unius anni, vervecina juvenes. Inter ferinas leporum juniorum, cuniculorum. Ex avium genere attagena, palumbi, alauda, perdices, merula & montana aves omnis generis, in dumetis & vepribus degentes: ut sunt, turdi, turtures & columba sylvestres.

Legumina sint hordeum probè coctum, avenatum, pipere aromatizata. Radices etiam asparagorum, petroselin, pastinaca, fiserum cichorium etiam sativum, quod albedinem contraxit.

Pisces sint saxatiles, ut lupi, funduli, perca, & qui non in stagnis, sed aquis saxatilibus degunt.

Olera conveniunt cucurbita, melones, endivia, pepones, persica, cerasa, pyra, pruna & mala exiccata, iterumque cocta.

Carnes elixentur, aut ita assentur, ut succulentæ maneant, non exiccantur, ita, ut planè indurescant & adurantur. Quod fieri solet, quoties sub initium assationis maturius sale condiuntur.

Pisces cocti sine jusculis pinguibus, præter lupum salitum, qui in lineis pannis conservatur, & cum jure pingui optimi est saporis, & salubrior.

Carnes omnes crassæ substantiæ salso & fumo induratæ, sicut & pisces indurati, & fumo exiccati, vitentur (ut cum Poëtâ loquar)

———— *cane pejus & angue:*

Sicut & capita, lactes, viscera & pedes animalium, simili diligentia à mense removeri debent; ova etiam frixa & dura: placentæ item ex his factæ: pulmenta quoque, quæ ex pisces & leguminibus fiunt, fugienda, præter ea, quæ ex pane, ovis, & farinâ, cum lacte amygdalino, aut jusculo pullorum & similiter præparantur.

Caseus crassi est alimenti, & facile obstructions movet: mensæ secundæ absint præter passulas & amygdalas. Poterunt tamen semina coriandri, foeniculi, anisi, simpliciter Saccharo incrustata, aut succus cydoniorum Saccharo inspissatus mensis secundis interesse.

Panis sit albus, dulcis, non minùs sale & fermento paratus.

Vinum sit album, diureticum, & si haberi poterit Neccarinum. Exulet autem malvaticum, & alia potentia, rubra & crassa.

Cerevisia sit Servestensis benè defecata, nequaquam autem vetus & subacida. Generat enim multas aquositates & sudores graviter olentes.

Ut verò omnes cibi longo ordine prohibiti: ita etiam cæteri, qui facili sunt concoctionis & boni succi, justo tempore, ordine, modo & quantitate sunt assumendi.

Nam liquidiores, ut sunt ova sorbilia, & juscula atque pulmenta sub initium mensæ sunt apponendi.

Pisces nunquam post carnes, sed ante carnes edantur: post carnibus uti convenit. Atque ut uno verbo dicam, Tuam Magnificam Dignitatem in victus ratione sibiipso medicum esse optimum & diligenter observare oportet, quos cibos salubriores experiatur. Quantitate sibi nullam molestiam accersat, nec alios assumat priùs, quàm priores coctos probè, & in ventrem inferiorem promotos sentiat, & priùs omnes diligenter mastiget. Nam multo faciliùs proba masticatione præcedente, ventriculus chylicationem perficit: multos cibos promiscuè uno prandio aut cœnâ non ingerat: nam simplex convivium & appetitus neglectus saluberrimus est.

Post prandium hilarioribus & jucundioribus colloquiis tempus conterat, nec dormiat. Post coenam non nisi præteritis horis duabus, somnum capiat, decumbendo primum in sinistro, post in dextro latere.

Manè à somno diligens studium adhibendum, ut excrementa per urinam & alvum sufficienter excernantur, imò sputa non retineantur, & capite decenter pexo, facies aquâ frigidâ lavetur. Post vel unctione vel equitatione exerceatur, donec corpus ferè sudare incipiat. Fiat autem in aëre temperato & sicciore, non in loco palustri aut concamerato.

Atque hæc breviter pro firmioris valetudinis adeptione & conservatione in gratiam Tuæ Magnificæ Dignitatis annotare volui: toto pectore æternum & misericordem Deum (qui solus omnes languores sanat) orans, ut diligenti medicamentorum usui clementer benedicat. Amen.

CONSILIUM VIII. IN MELANCHOLIA HYPOCHONDRIACA.

Reverende & Generose Domine Comes, Domine submisſe collende, de symptomatis nuper mihi commemoratis diligenter cogitans, deprehendi Reverendam & Generosam clementiam tuam laborare ex Melancholia hypochondriaca flatulenta, tantoque magis flatulenta, quanto à nativa temperie ventriculus longius in frigiditatem dilapsus, cruditarum copiosiorum est faber & opifex.

Orta autem est talis intemperies & inde consecuta mala omnia ob errorem externum, nempe in victu & animi affectibus. Quotiescunque enim ventriculus vel copia vel qualitate ciborum obruitur & accedunt etiam aliæ externæ causæ, calorem ejus nativum dissipantes & atterentes, sequitur labefactatio facultatis coctrice, & hujus soboles cruditas, ubi verò cruditas est, ibi ex imbecillo calore inchoante quidem, sed non perficiente concoctionem, generantur plurimi flatus, quibus cum longo nunc tempore R. & G. V. C. conflictatur, eò præcipuè tempore, quo chylicatio facta est, & reliquæ crudi & pituitosi chyli in ventriculo à calore imbecillo incipiunt attenuari & concoqui.

Cum autem R. & G. V. C. naturâ sit ventriculo paulò frigidior, epate verò, corde & renibus calidioribus, non modò faciliè, ob extremos

errores supra commemoratos in morbum ex intemperie frigida ventriculi incidit, verum etiam subsecuti sunt alii morbi, primum in via nempe obstructio in venis mesaraicis, deinde intemperie calida & sicca, & quasi inflammatoria, ut Galenus ex sententia Dioclis affirmat in iisdem venis & partibus ad illas attinentibus. Etenim postquam chylus imperfectus & crudus ad Epar transiturus in itinere propter cruditatem & crassitiem in venis mesaraicis substitit, factum est, ut moram trahens in sese quasi flammam concipiens incalesceret, & vasa dicta, atque partes vicinas, nempe epar & renes, adeoque cor ipsum in maiorem caliditatem transferret, hoc facto chylus in venis mesaraicis assari, & humor melancholicus in venis iisdem retineri, nec perfecte ad splenem mitti capit. Unde etiam omnium symptomatum congeries primam originem consecuta est, nam ex imbecillo ventriculi calore flatus tanquam ex officina prodeuntes non modo cotidianis doloribus ventriculum & vicina intestina affligunt, sed etiam hypochondria distendunt & inflant: qui quanto copiosiores sunt, tanto maiore impetu orificium ventriculi afficiunt, nauseam, vomendicupiditatem & anxietatem excitant, sursumque tendentes gulam constringunt, linguam sæpè quasi immobilem faciunt, pectus replent, & sursum ad cerebrum prorumpunt, spiritus animales agitando perturbant, & nonnunquam vertiginem exuscitant.

Quando verò tales flatus ex perpetua materierum in hypochondriis contentarum assatione & affirmatione augentur, maligniores fiunt, præsertim à vaporibus adustis & melancholicis, sua natura acerbis, acidis atque ex assatione calidis & tenebricosis, obscuris atque putridis, itaque quidem, ut propter qualitatem talem non solum spiritus cordis perpetuò obscurent & alterent, eosque tenebricosos & melancholicos reddant, sed etiam præter motum violentum, quo cerebro & visui vertiginosam molestiam afferunt, spiritus animales sua natura lucidos & cœlestes, nebulosos & tenebricosos reddendo, actionem insuper imaginatricis ita lædunt, ut metus & tristitia, & hinc fuga conversationis, studium verò solitudinis, & melancholicæ imaginationes oriantur.

Ex quo in cerebrum impetu sequuntur etiam pigritia ad motum, nervis videlicet tali flatu melancholico repletis, & propter caliditatem & siccitatem, exiccatio oris & faucium, atque æstus circa præcordia talis, ut magis potum quam cibum appetat, magisque frigidis quam calidis V. C. delectetur.

Præterea quando obstructions vehementes sunt, calorque major & intensior, alvus arida & sicca redditur, flatus cohibiti furiant effrenatius, atque

atque tunc urina etiam tenuis & alba apparet referatis verò obstructionibus, crassiores fiunt & subruffæ cum sabulo multo ac copioso, ut quis opinari posset, calculo potius quam alio affectu V. C. laborare. Quæ cum tales apparent securitatem & inducias morbi prænunciant, quando verò tenues, exasperationem commemoratorum symptomatum fore prædicunt. Accidit etiam nonnunquam ut alvus sponte sua, vel clystere leviusculè irritata largissimè exundet, quod sanè planè alienum à morbi istius natura esse videri posset, nisi constaret, quod ventriculo in tali morbo debiliori & magis humido plures cruditates & humores tenues copiosiores colligerentur, stasisque interdum vicibus natura insurgente, vel clystere commovente, in alvi profluvium inundarent. Hæc breviter de morbis, eorum causis & inde consequentibus moribus & signis propterea præfari volui, ut de faciundis facilius esset dijudicatio, & quid de curatione certæ spei firmiter haurire possemus.

Quia verò morbi sunt duo potissimum, Intemperies ventriculi frigida & sicca, venarum contra melsaraicarum & epatis, ex obstructione orta caliditas & siccitas, apparet quidem propter contrarias intentiones difficilimum fore, ut hujusmodi contrarietatem in visceribus prædictis tollamus præsertim si *ὑπερλον τι*, quod innominatam qualitatem in talibus affectionibus ex errore externo profectum, quod suspicor subfit, tamen si ad rei naturam diligentius mentem advertamus, spero facilius quicquid est mali esse superaturos.

Erunt autem intentiones seu scopi faciendorum præcipuè hi: Primum ventriculus calefaciendus & flatus temperatè discutiendi sunt, deinde obstructiones temperatè refrigerantibus tollendæ, & materia obstructionum pertinaciter adhærens detergenda, humores verò adusti, melancholici & putridi educendi erunt. Tandem si quid latentis qualitatis superest, per medicamenta appropriata & symbolum, atque proportionem mali habentia, qualia Bezoartica ab Arabibus vocantur, tollendum est, sed ita ut ea inter se tali commodatione contemperentur, ne dum uni prodesse volumus, alteri noxam singularem conciliemus. Quoniam verò neque ventriculi, neque epatis & venarum melsaraicarum intemperies tolli, neque etiam qualitas prava universali medicamento ad omnes corporis partes directo, emendari potest, nisi ea, quæ talem actionem impediunt removeantur, necesse est, ut ad sublationem talium remorarum primum nostrum laborem convertamus, Is erit ut obstructiones tollantur & materia eas pariens debitâ evacuatione educatur. Quo factò cætera omnia erunt leviora & nihil facile intercider, quod feliciter coeptam medicationem impedire possit.

Ut id

Ut id commodè fieri possit, præscripsi primum pilulas A. sumendas hora matutina septima, & prandium ad horam decimam differendum, talibus viæ communes ab illuvie humorum crudorum expediuntur.

De hinc proderit aperiendis reliquiis obstructionum, & detergendis materiebus contrariis, & flatibus discutiendis, item humoribus melancholicis & adustis educendis Syrupus B. de quo sequenti mane paulò post horam 5. capi poterunt cochlearia usualia quatuor, (quæ circiter uncias tres æquant) & super dormiendum per dimidiam horam aut amplius, sed eâ lege, ne sudetur: prandium verò ad horam 10. differendum, si per triduum tali syrupo ejus clementia est usa, quarto die fieri potest mediæ Venæ sectio in dextro cubito, sic enim & epar eventaretur, & medicamenta rectius officium suum essent factura.

Præter venæ sectionem aliis auxiliis Cheirurgicis opus esse non putarim, nisi fortè post purgationem remanentibus aliquibus reliquiis humorum melancholicorum, hæmorrhoides aperiendæ viderentur.

Post venæ sectionem sequenti die posset Syrupi usus continuari, ita quidem ut quotidie vel quatuor pro quantitate scilicet & numero dejectionum, quas vires facillè tolerant.

Posset etiam interdum usui hujus Syrupi dies quietis interponi. Epoto hoc Syrupo, si quid superesse videretur die interjecto, reliquias humorum medicamento electivè purgante aggrederer, quale sub litera C descripsi: idque manè deglutiendum propinarem horam circiter mediam 6.

Hic fortè mirum videri posset, cur corpore prædictis purgantibus satis frequenter sollicitato, electiva subductione illud amplius onerandum putem. Ad id respondeo, exquisitâ evacuatione ante usum bezoarticorum medicamentorum præservatoriâ opus esse, quod eâ neglectâ humores inutiles & residui ex talibus remediis plerunque agitentur, & furere incipiant, symptomataque nonnunquam talia commoveant, ut acutorum morborum mores, naturamque, cum antea longi essent, cum magnâ & ægrotantium & nonnunquam etiam medicorum consternatione planè induant. Corpore ad dictum modum purgato, & impedimentis sufficienter remotis, reliquos scopos, auxilio, omnes, intemperies simul corrigendi vim, & naturam simul Bezoarticam seu alexiteriam habente, expleri posse putarem. Tale verò esset lignum Indicum, quod non solum ventriculum calefacit, & obstructiones (modò debite cum Sassa parillâ contemperatur) sine calefactione aperit, sed & flatus discutit, ventriculum roborat, viscera & omnia membra totius corporis pristino statui restituit, præsertim si portiuncula Sassafras & alia corrigentia eâ proportionē

admiscerentur, ut naturæ morborum & temperamentorum totius quam partium, rectè accommodentur, qualem descriptionem sub litera D. proposui. Possent autem cotidie manè exhiberi ℥vj circiter horam 4. matutinam, sed eâ lege ut prius immediatè sumeret ʒj mithridatici. Quod quantam vim habeat roborandi omnia viscera, non est, ut meminerim, ejusque usum octavo quoque die repeteret, pridie tamen corpore denuò, ut paulò post monebo, evacuato, Exhausto decocto dormiat pro placito & sudet ad hor. 7. usque qua sudores detergat & comedat pro immutandâ intemperie ventriculi & viscerum rotulas sex, quas litera E. complectitur. Hora 8. cibum capiat. A prandio ante hor. 3. denuò propinare sex uncias, sudorem præcipiendo usque ad hor. 5. sub eâ cautela, ut qualitatem sudoris viribus accommodaret, non enim largior is esse debet, quam Natura commodè & leniter ferre potest. Post sudorem denuò sex rotulæ sumantur, & differatur coena ad horam 6. continuetur verò usus hujusmodi medicationis ad dies triginta.

Interim si alvus non fluat, clystere emolliente & leniter carminante sollicitanda est, præsertim primo quatrinduo, solet enim istis diebus alvus ficcari, quod propterea subjicio, ne elementia ejus sub initium talibus fulminibus torminum terreatur, sed maturè clysteris usu displodi curet.

Dum sic pergimus, & Natura paulatim consequendo nativam temperiem, sit fortior, & omne grave ac molestum concoquit & expellit, quare ut id expeditius facere possit, eam juvemus.

Fit autem si octavo quoque die medicamentum, quod vias communes expurgat exhibeamus, Quale est vel electuarium lenitivum, vel catholicum, cum confectioe Hamech, & Diaphœnicon, vel aliud quod præsentis temporis conditio expostulare videbitur. Sequenti die, ut supra sub primum haustum decocti bibendi innuebam, denuò drachma una mithridatici immediatè ante usum decocti deglutienda est.

Epatis etiam & renum regiones unguentis refrigerantibus, qualia sunt santalinum, rosatum Mesue, & infrigidans Galeni, inungendæ, absterfo sudore, tam manè quàm vespere.

Victus ratio sit sub initium largior, postea septimo die præterito minuatur, sed ita ut natura juvetur, non gravetur. Exhibeantur autem cibi facilis concoctionis, nec fercula excedant numerum ternarium, ne pluritas horum, humorum diversitatem producendo, malum denuò potius foveat, quam unâ cum medicamentis oppugnet.

Potus sit aqua decocta sub litera F. quæ si ventriculo incipiat esse molesta, haustu vini aut micâ panis ex vino sumto, mitigari posse videtur.

letur. Ne autem motus alicujus symptomatis ex vini usu insurgat, so-
eo ventriculo confirmando, concoctionique adjuvandæ pulverem pepti-
cum sub litera G. consignatum, & ad naturam morbi atque symptoma-
um de quibus G. V. C. queritur, post cibum sumtum, conclusionis
oco exhibere, ad quantitatem drachmarum duarum, aut amplius non-
nunquam. Pro mensis secundis etiam non incommode possent concedi
pineæ, amygdalæ, præcipuè verò pistacia, quæ Avicenna epatis The-
riacam vocat, Item Passulæ corinthiæ elotæ, & nonnunquam panis
bis coctus cum seminibus carui, anisi aut fœniculi paratus.

Hæc breviter in generosæ ipsius clementiæ gratiam conscribere volui,
Medici præsentis judicio omnia subjiciens, Deumque orans, ut instituen-
dæ executioni clementer benedicat.

Recip. *Maß. pill. de biera cum agar.*

aggregat.

Rhabarb. inser. & opt.

ā. ʒi.

Cum aq. Veron. f. pill. n. XXI.

S. Pilula A.

Rad. Cichor.

Endivia.

Scorzonera.

Eryngij ā. ʒß.

Petrosel.

Fœnic. ā. ʒiij.

Cort. Thamarisß.

Fraxin. ā. ʒiij.

Polypod. Querc. ʒvj.

Glycyrrhiza rasa ʒv.

Sem. Dauci.

Aquileg.

Anisi ā. ʒß.

Garthami conquisß. ʒj.

Passular. Corinth. ʒj s.

Fol. Sennæ ʒiij.

Epithym. Gret. ʒj s.

Herb. Cichor.

Ceterach.

Endivia.

Veronica.

Adiantum nigri ā. Mj

Spicanthi.

Lingua Cerv.

Card. bened. ā. Mß

Coq. in s. q. aqua (adde aceti squillitici ℥iij) pro ℔ ij : quæ colentur & dividantur in duas partes : uni parti colaturæ ad dimidias incoque :

Cort. Rad. elleb. nig. Styr. præp. ℥iij

Caryophyll. 3j

Expressum & colatum servetur :

Alteri parti collaturæ adde :

Myrobalan. Cheb.

Indor. ā. ℥iij

Ol. amygd. præp.

Coq. ut decet : postea in fine coctionis per noctem in nodulo infunde :

Agar. trocis. ℥vi

Rhabarb. opt. ℥iij

Spica ʒß

Manè affuso superiori colato & expresso bulliant parùm & exprimantur validissimè, Colaturæ, quæ non superet ℔j adde :

Syr. Byzanthini.

de Scolopend. ā. ℥iij

Oxysach. squillit.

Syr. Violar. ā. ʒj s.

Sach. alb. ʒij.

Coq. ad consistentiam Syrupi fluidioris.

S. Syrupus B.

Recip. Elect. Lentivi ʒij

Conf. Hamech ʒj

Spec. Elefscop. ʒij

Ol. Caryophyll. gut. j

Cum Sacharo f. Bolus.

S. Bolus C.

Recip. Rad. Salse parill.

Ligni Sancti ā. ʒj

Lign

Ligni Sassafras ʒiij

Cort. Ligni Sancti ʒij s.

Vis. quer. ʒj s.

Fassular. ʒj.

Rad. Scorzoner. ʒiij

Cinamomi ʒj s.

Coq. in aq. Cichor. ℥ij s.

Borrag. ℥j. s.

Fumar. ℥ij

Ad medietatem, prius per hor. 24. infusa in aquis istis ferventissimis.

S. decoctum Ligni D.

Recip. Spet. Diarhod. Abbas.

Diambre.

Aromat. ros.

Nuc. mosch. ā. ʒij

Ol. Caryophyll.

Anisi.

Cinamomi ā. gut. ij

Sach. alb. sol. in aq. Card. bened. ʒiij

F. Confect. in rotul.

S. Rotula E.

Recip. Cort. Ligni guaiaci ʒss

Rad. Sals. parill. ʒvj

Lig. Sassafras ʒj

Passular. ʒj

Coq. in aq. simpl. ℥viij ad tertias.

S. Aqua F.

Recip. Sem. Coriand. præp. ʒvj

Anisi.

Fenic. ā. ʒij

Carui ʒss.

Cinamomi ʒiij

Rad. Glyzirrhez. ʒij

Cort. citri ʒj

Sacch. Ros. tab. ʒij

Mis. F. Tragaa. G.

CONSILIUM IX. IN MELANCHOLIA HYPO- CHONDRIACA.



Sed morbus ullus terrore plenus & moerore certè hic, quem hypochondriorum melancholiam vocant, plenissimus. Non tamen id ex ipsius morbi fit essentia, cum toto genere lethalis non sit: sed quod chronicus sit & diuturnus, hominemque quem tenet, alias fortissimum, vel ipso Lyfandro timidiorum reddat. Accedunt insuper varia & multiplicia symptomata, quæ hominem à salutis portu ad desperationem quasi adigunt & abigunt. Eodem malo & tu ipse, vir optime, modò conflictaris.

Licet autem hætenus multis usus fueris medicinis, funditus tamen id malum hætenus non exstirpari potuit. Rebelle quippe fuit nimis nimisque contumax. At verò & nos mascule ei ipsi nosmet opponemus. Succus ergò ut hinc ordiar, plus nimis melancholicus in tuo colligitur liene. Hic quod crassus sit & viscidus, intestina & mesenterion obstruit.

Hinc uberrimus excrementorum in corpore proventus: hinc regurgitatio noxij humoris in ventriculum: hinc dolor capitis, hinc tinnitus aurium, ructus acidi, expuitiones crebræ, catarrhi tandem suffocationem quasi minitantes & anginae spuria.

Flatus quoque magna copia in infima generantur cavitate. Autores ij sunt torminum in intestinis, punctorum & suffocationum in diaphragmate, tumorum epatis & lienis, undationum in arterijs. Horribilia hæc sunt sed audiemus magis horribilia. Spasmi quandoque & convulsiones sentiuntur in artubus, emaciatur universum corpus, somnia adsunt terribilia, disputatur acerrimè de prædestinatione, meditantur quandoque ægri ut fiant *αὐτὸχθονες*. Ægros, si quærat Medicus, modo hic, modo illic se dolore, affirmare audias. Incurabilem esse hunc, quo premuntur, morbo; irritas futuras omnes medicinas. Hæc & similia plenis buccis ij effutiunt. Postquam verò à solerti & industrio instituuntur Medico, quæ natura sit morbi, qui non lethalis sit, sed chronicus tantum: ibi verò lætiores spirant spiritus, medicinis utuntur, commodamque victus tenent rationem. Variantur autem hæc symptomata pro conditione temperamenti & ratione victus. Consultissimum verò faciunt ægri, si temporius eruditum consulant Medicum. Fixam enim si habuerit affectus iste sedem, rarò discedit à corpore, priusquam vestigia & characteres quosdam in debiles impresserit.

In occipitium tuum, vir amplissime, materiam phlegmaticam deposuit natura, uti audio. Quaecunque insuper in genere hic fuere à me recensita, ea tu in specie tibi dicta noveris. Progressum faciam maturius ad curationem. Complexio tua calida est & sicca, & ob caliditatem epatis, ad generationem humoris melancholici parata.

Confirmata fuit nuper ea dispositio usu vini ferventioris, & peregrinatione ad loca æstuantia. Ventriculus insuper imbecillus quod sit, succos crassos & incoctos producit, quos & eodem modo ad lienem transmittit, ut & ad venas mesaraicas. Absolvenda curatio quinque, quæ sequuntur capitibus.

PRIMUM ET SECUNDUM.

SUCCUS Melancholicus expurgandus, & reserandi venarum obstructus, universaliter quidem, quolibet vere & autumno: in specie, quomensibus & quot septimanis. Vere sumantur pilulæ C. horis binis ante prandium.

Recip. Specier. Hieræ S.

Agarici trocif.

Rhabarb. opt. ā. ℥j

Cum Syr. ros. solut. f. pill. n. XXVII.

S. Pillen. C.

Postridie capiatur portio D.

Recip. Rad. Cichorii,

Endivia,

Borrag ā 3j

Asparagi 3ij s.

Cort. Rad. Cappar. 3j s.

Polypodij 3ij

Pulpa Tamarind.

Passular. ℥iiij

Hordei mundi P. iij

Sem. Melon.

Anisi ā. 3j

Herb. Cichor.

Endivia ā. P. iij

Fumaria, lupuli ā. P. j

Card. bened.

Ceterach.

Veron. ā. P. j. ſ.

Betonica P. j

Fol. Senna Alex. ʒvj

Rad. Elleb. nig. Styriaci ʒij

Epithymi Cret. ʒiij

*Coq. in ſ. q. aquar. Borrage & Cichor. pro ʒviij in quibus infunde
per noctem*

Rhabarbari opt. ʒiij

Schænanthos ʒj

Manè fortis fiat expreffio, & relinquatur colatura pro lib. Sem. cui adde:

Manne ʒvj

Syr. ros. ſolut. ʒij

Mif. S. Träncklein D. in 2. Theil zu theilen.

*Notandum : in hac potione, ſi vere ſumatur, pro ʒiij
Rhabarb. ſubſtituenda ʒj Rhabarb. & ʒj agarici. In autumnno u-
ſurpetur, paretur ſecundum literam. Potionis hujus ſemiſſis ca-
piatur manè poſt hor. V. cum jejuniſmo ad hor. uſque X. Sequenti die
ceſſandum à medicamentorum uſu, & ſecunda epatica dextri brachii, in
autumnno epatica ſiniſtri, ad emiſſionem ſanguinis tanti, quantum binæ
teſtæ ovi continent. Poſtridie abſumatur pars reſidua potionis D. Po-
ſtidea bibatur ſerum caprinum, in vere. Poſt uſum ſeri ſingulis diebus
manè & veſperi ſequentis medicamenti H. ſumatur portio, quantitate nu-
cis juglandis.*

R. Conſer. Borrage Bugloß. ā. ʒvj

Violar. roſar. ā. ʒv.

Spet. Diarhod. Abbat.

Diatrion. ſantal. ā. ʒij

Margarit. præp. ʒiſſ.

Ligni aloës ʒj

Moſchi opt. gr. j

Fol. auri n. iij

Cum Syrupo de pomis ſ. conditum.

S. Stärckung H.

Inſigniter hoc conditum internas roborabit partes.

TERTIUM ET QUARTUM.

CAlida intemperies epatis & renum corrigenda, lienisque auferenda
obſtructio. Eum ad finem Epar manè & veſperi inungatur linimen-
to E. Lumborum regio linimento G. lien demum unguento F.

Recip.

Recip. Unguenti Santalini ℥j

Succi Citrhorij

Enndivia ā. 3v.

Ol. Rosati ℥ij

Ros. rub. pulv. ℥ij

Cera alba q. s. f. lintment.

S. Galbe E.

Recip. Unguenti splenetici mei ℥ss

S. Galbe F.

Recip. Ung. Rosat. Mes. ℥iij

Populei ℥j s.

Mis. S. Galbe G.

Quotiescunque etiam observâris, iterum obstipari alvum, toties particula Electuarii A sumenda hor. 2. ante prand. quantitate castaneæ plus minus pro modo fortis vel imbecillis operationis. Vel si electuarium id displicet, loco ejus portio B. vel pilulæ C. hor. 2. ante prandium adhiberi debent.

Recip. Cassiæ recens extracta secundum decoctionem ferventem glycyrrhizæ

& anisi ℥j s.

Electuar. lenitivi ℥j

Elect. de succo Rosar. in tab. 3vj

Confect. Hamech. ℥ss

Cum Syrupo ros. solut. multipl. infus.

F. Mixtura.

S. Catwerge A.

Recip. Syr. ros. solut. ℥j s.

Decocti senna cum epithymo ℥ij s.

Syr. Diasereos ℥ss

Mis. F. Haustus

S. Träncklein B.

Continuabitur horum usus per dies 14. Si fortè accidat, ut quotidianus iste purgantium usus sordescat, loco eorum sequens injiciatur Enema I. horis 2. vel ante prandium vel ante coenam.

Recip. Herb. Beta

Mercurialis

Malva

Bismalva ā. *M.* j
Absynth. *M.* j
Pulegii *M.* j
Flor. Chamomel. *P.* j
Sem. Fœnugraci
Lini ā. ʒiij
Carthami
Polypod. quer. ā. ʒß
Coq. pro ʒx. In quibus dissol.
Electuar. Lenit. ʒvj
Diacathol ʒß
Ol. Chamomel. ʒj f.
Rosacei ʒj
Mell. rosar. colat. ʒj f
Mis. F. Enema.
S. Clystier. I.

Q U I N T U M.

Corroborandus ventriculus.
 Sumantur manè, sed permutatim.

Conditum Rad. Cichorii,
Cortices arantiorum conditi,
mirabolani chebuli conditi.
Conserva rosarum, cui species a-
romat. rosar. immixtae sint.

Quod si successu temporis usus flagitavit, scutum stomachale itidem parari volo.

Recip. *Galanga* ʒj f
Calam. aromat. ʒj
Nuc. Moschat. ʒß
Cinamomi Elect.
Macis ā. ʒij
Xilocaloes
Caryophyll. ā. ʒi
Sem. Anisi
Fœnic.
Cumini ā. ʒij
Mastich. ʒiij

*Pulv. subtil. & cum Ol. ros. & absynthii ā ʒi subigan-
tur, deinde addit. pice resina & cera f. cerotum
Stomachale.*

S. Magenschilbt.

D I A E T A.

A Er vitetur obscurus, ater, nebulosus.

De cibis dictum alibi. Embammata acria & nimis calida, qualia
raphanina sunt & sinapia, vitari volo. Brodium raparum tostarum, ante
prandium sumtum, plurimum prodest in hoc morbo.

Pomum Obst, obest plurimum.

Lactuca ex brassica capitata, endivia, cichorio hyemali, rapis coctis
orbiculatim concisis & cum oleo olivæ & aceto paratis nasturtio, & flo-
ribus borraginis probantur.

Potus sit Cerevisia Servestana, Goslebiensis, Vinum Rhenanum,
per hyemem: per æstatem Cerevisia Einbeccensis, Torgensis vehementer ob-
est capiti. Vinum Neecarinum. Vita sit sobria.

Somnus moderatus. Studia non tractentur: manum de libris.

Repletio vitetur, flatus enim generat.

Sævos animi vitato morsus.

De reliquis dictum alibi. DEus Deorum benedicat.

CONSILIVM X.

IN MELANCHOLIA HYPO- CHONDRIACA.

Litteras Tuas Vir Nobilissime, 5. Mens. Decemb. d. Anni elap-
si exaratas accepi: atque gratas tibi meas fuisse, te quo-
que tam prolixè rursus polliceri, magna cum volupta-
te intellexi.

Minus autem jucundum accidit, quod T. P. Hypochondriaca flatu-
entia (quam Hermetici sive Spagyrici morbum Mercurii solaris præcipi-
ati vocant) laborare cognoverim: (hanc enim omnia ostendunt sym-
ptomata in literis relata) cum morbus diuturnus, non quidem unius men-
s, vel anni esse soleat. Cujus sanè cum auxilia nonnulla T. P. à me re-
quirat; ut secundum methodum progrediar: essentia omnino illius in in-
temperie.

temperie consistit sicca mesenterii, pancreatis, & quorundam ramorum venæ portæ, cum quadam caliditate & obstructione à sanguine crassiore.

Quæ à causis suis efficientibus primum pendere solet, ventriculo nimirum frigidior (sive per se sive aliam quampiam ob causam) quemadmodum ex imminuta coctione & copiosis flatibus constat: Epate verò & venis calidioribus quemadmodum cum T. P. hic esset conjicere id facile fuit. Materiali deinde, sanguine fæculento, adusto, humoribus crassis, viscidis, quales nimirum ab ejusmodi intemperiebus progigni solent.

Præsente inprimis subjecto apto mesaræo, pancreate, liene, quæ cum aliàs sentina statuantur excrementorum totius ferè corporis, hoc loco ob intemperiem dictam aptiora omnino ad illa suscipienda existunt. Externis tandem quibusdam accidentibus, vigiliis scilicet & laboribus, tam animi quam corporis (de diæta enim nihil mihi constat) quod non solum cruditate, sed & spirituum (qui per dicta consumuntur) paucitate, calor innatus affligi soleat. His igitur de causis fit, ut consumatur potius & resolvatur calor nativus, quam excitetur: unde debilitas facultatum naturalium; crudorum humorum proventus, aut certè nulla istorum proportio; & ea symptomata, quorum T. P. facit mentionem.

Epate enim existente calidior, sive jam omenti pinguedinem, quæ aliàs ventriculum fovebat, ut ne calor tam facile expiraret, impediabat, consumat, ac aliàs pinguedinis concoctionem prohibebat: sive caliditate suâ excedente ventriculi minorem conficiat; sive etiam cibum nondum perfectè coctum justo citius distribui faciat: coctio certè ventriculi (aliàs per se frigidi) vitatur; sic cruditates in eo colliguntur. Quo & illud accedit, quod ichores melancholici, in ventriculo, ut Galenus monet, confluere soleant, atque nativo calore quasi jugulato, actiones illius depravare aut imminuere.

Cruditates verò dictæ, quemadmodum & ipse per se cibus nondum planè coctus, ad venas, ratione caloris, citius raptæ, vel aliàs ibi collectæ, neque tempestivè expurgatæ, assantur quasi & obstructiones postmodum pariunt vel augent. Hinc tormina & flatus: præsentem nimirum materia apta, pituitosa scilicet & melancholica: calore verò ventriculi & partium ad illum attrinentium imbecilliore, qui materiam illam quasi per elixationem quandam rarefacit: atqui in flatus ità conversam digerere aut discutere ob imbecillitatem nequit: flatus hi intra spacia, quibus viscera ad invicem determinantur, collecti, distendunt illa & membranas ipsorum: unde consequuntur dolores.

Post primum autem somnum potissimum illâ omnia vigent, scilicet ob finem primæ coctionis & initium secundæ: dum nimirum prima coctione cum labore quodam & imbecilliter (ob calorem imminutum) finita, nova succedit secundæ coctionis in pravum illum chylum actio. Neque mirum vigilias succedere, cum siccorum & pravorum (utpote crudorum) vaporum portio ad cerebrum quoque feratur: benigniores autem fumos, somni materiam esse notum sit. Quæ sanè symptomata sunt à T. P. relata: quibus alia esse adjuncta non dubito: cum fumi illius exhalantes & cor & cerebrum petere, sic eorum demactiones lædere soleant. De quibus T. P. monere me poterit: singula enim jam prosequi nimis longum foret. Hoc porro malum licet non admodum facilè tolli soleat, propter causarum quendam introductum habitum, fucci contumaciam, intemperiei viscerum & curandi intentiones contrarias: attamen constitutio corporis, facultates non abolitæ, sed depravatæ saltem, ac quodammodo imminutæ sperare omninò jubent, affectum hunc, si non prorsus tolli, multum tamen imminui posse.

Curandi igitur intentiones quod attinet, ex ante dictis facilè patet, obstructions inprimis referendas esse, materiam visceribus & vasis hærentem incidendam, ac educendam, intemperies viscerum corrigendas, ipsaque postmodum roboranda.

Quas sanè intentiones aggrediundo, secundum triplicia medicorum instrumenta & auxiliâ: Diætam quod attinet, exactissima illius, quoad licet, habenda ratio, quod secundum Galenum hæc potissimum tollantur morbi diuturni.

Hinc quo ad omnes sex res non naturales diligenter illa observanda 1. Ut aër sit temperatus tam in activis quam in passivis qualitatibus: inprimis verò hypocaustorum intensior vitandus, ac aliàs non per flatus vel conclusus, quo non caput oneratur tantum, sed humores quoque colliquantur. Possent quoque tales Troisci. A. tempore hyemali parari, atque iis fumus in cubili vel vaporario excitari. Cibi facilis sint digestionis, quos nemo non novit: fugiendi autem potissimum, crassum ac viscidum succum gignentes, quales sunt frigidi sua natura, pisces & carnes crassioris substantiæ, lacticia, caseus in primis (si modo ille T. P. vescatur) vetustior. Fugiantur quoque sale vel aromatis nimirum condita, fumo exiccata, frixa, acida, caput petentia, qualia cæpe sunt, porrum, sinapi. Assis satius utendum quam elixis. Cæteris partibus, quod hæc fluctuent in ventriculo: varietas inprimis ciborum fugienda, cum simplex licet paulo deterior, tantum non noceat, quantum multiplex, licet
K
melior,

melior, ob inæqualitatem succi & coctionis. A cibo uti T. P. poterit Tragæa B. vel pyro vel cotoneo cocto, cum confectione anisi, coriandri aut fœniculi: quemadmodum & dictas confectiones solas assumere licet.

Potus magna habenda ratio, cum citò & multum nutriat, neque eo carere possimus. Cerevisia itaque sit clara, limpida, vetustior parumper, non feculenta: vina generosa fugienda & omnia alia in nimia quantitate: utendum verò albo, tenui, oligophoro, quale Rhenanum est tenuius, vel Neccaricum. Non statim à cæna dormiendum, sed ad minimum per horam unam aut alteram deambulandum moderatè, aut tempus qualitercunque fallendum. Diuturnus verò somnus omnino improbatur, quod excitet quidem & elevet vapores, sed non discutiat: aggrediatur concoctionem sed non perficiat, nisi assueverit T. P. vel nocturnus brevior fuerit, tum enim sedendo illi indulgere poterit. Exercitium sit moderatum, jejuno stomacho & excrementis rejectis, ac quamprimum sentitur ex anhelitus mutatione calorem nativum excitatum, ab eo cessandum. Excreta quotidie deponenda vel sponte vel arte, scilicet passulis hujusmodi purgantibus C. quarum dosis cochlear unum vel duo, vel tria etiam statim ante cibum. Vel etiam enemate tali:

R. Brodij carnis vel gallinae q. s. pro clystere (flatibus autem urgentibus malvatici aliquid addi potest scil. ℥ij vel ℥iiij) mellis ros. ℥j s. Olei com. ℥j Vitell. o vj n. i. Mis. pro clystere, quo utendum duabus horis ante cibum. Caput (vacuato corpore) manè pectendum ad sua discutienda excreta, mox frusto agarici crudi primum, post panno asperiore fricandum.

Balneo si T. P. uti voluerit, ventriculus prius inungendus oleo mastichino, vel nucis muscatæ. Animi tandem affectus sint moderati, potissimum ira, tristitia, vel animi mœror, qui aliis sunt vehementiores: & à cibo meditationes dum vel ferventiores reddunt sanguinem, vel interius calorem cogunt, vel spiritus exhauriunt.

Chirurgiam quod spectat, licet nauseantem & debilem ventriculum obtinentem phlebotomia minimè uti debere, vulgò statuatur: attamen cum morbus hic possit fieri magnus, consentientibus viribus & ætate ratione scilicet epatis calidioris & obstructione) vena in vere vel autumnio secari poterit; semper tamen illud attendendo, quod Galenus diligenter monet, calorem & substantiam effluentis sanguinis observandam esse, ita nimirum, ut ater & crassus liberius paulò mittatur, tenuis verò & clarus contra. Hæmorrhoides quoque si aliquando fluxerint apertioni earundem rursus studendum, per hirudines vel usum pilularum aloeticarum. Et cucurbitulæ

curbitulæ quandoque affigendæ natibus, ad materiæ derivationem. Neque frictiones omittendæ partium inferiorum deorsum versus: itemque lotiones pedum ex decocto hyssopi, absynthii, ruthæ, salviæ, abrotani, pullegii chamomel. & id genus aliis. De fonticulo ambigo, an T.P. illum sit admissura: quemadmodum etiam dubitatur, an in malo hoc contumaciori, & obstructionibus præsentibus commodus sit futurus.

Medicamenta quod attinet, humores illi crassi & visceri obstructio-num causæ incidendi & detergendi, simul quoque evacuandi per tale apozema D. cujus dosis cochlearia v. vel vi. vel vii. hor. 4. vel 5. ante prandium calidè: neque enim fortioribus utendum videtur, ne subtiliores partes evacuentur, relictis crassioribus: vel etiam humor ille melancholicus rebellis efferatur.

Vacuatis ità vel continuis aliquot vicibus, vel per intervalla quoque humoribus peccantibus, viscera corrigenda vel roboranda: verbi gratia tali conditio E. itemque confectioe hac in rotulis vel morsulis F. Conditum quidem quantitatem magnitudinis castanæ, morsulorum unum, alternis vicibus assumendo mane & vesperi hor. 2. ante cibum. Quemadmodum & mithridatium valde confert, si vacuato corpore semel in septimana, scil. ʒj vel ʒß mithridatii cum ʒij conser. rosar. permiscendo, horâ 4. matutina usurpetur: eo autem die ab aliis medicamentis omnibus abstinere oportet. Ad emendandos quoque viscerum intemperies, & obstructiones auferendas, usus Sassafras valde commodus videtur ut nimirum lignum G. addatur gallinæ, vel frusto carnis bubulæ, atque cum iis more solito coquatur: colaturæ autem seu jusculi haustus hor. 2. vel 3. ante prandium assumatur: quemadmodum memini præceptores meos in Italia caponem exenteratum hisce verbis H. refertum in s. q. aq. solitos coquere, ac de brodio haustum quoque sive ʒ v. vel vj. horis itidem aliquot ante prandium porrigere.

Urgentibus flatibus & ventrem perturbantib. Enema hoc parari posset I. Rotulis quoque tunc utendum, confectis ex oleo carui cum Sacharo: itemque pulvis hic K. ex vino calido sumi potest: quemadmodum & alii oleum macis, sive per destillat sive express factum vino albo calido: alii olei anisi vel fœniculi guttas aliquot cerevisiæ permiscent, & potandum exhibent. Posset verò & tale Elixir L. parari atque singulis diebus aliquid ejusdem assumi: & aliàs per aliquot dierum intervalla, post usum inprimis jusculorum, pilulis hisce M. utendum hor. 2. ante prandium. Extrinsecus super ventriculum hoc scutum gestandum N. vel idem hoc unguento O. inungendus.

Vigiliæ tandem cum molestæ sint : ad fumos illos crudos contempe-
randos pillulæ P. valde commendantur, si hora decubitus 2. vel 3. deglu-
tiantur. Ac alias crura quoque & brachia, vel alterutra lavari possunt,
statim ante somnum, decocto foliorum salicis, lactucæ, vitium, nym-
pheæ &c. additis capitibus papaveris albi n. 3. vel 4. Fortiora enim
omitto.

Atque hæc quidem, quo ad essentiam mali, & symptomatum cau-
sas, omniumque istorum curationem (ut vulgò loquar) in hac temporis
angustia consignare licuit : pluribus quidem ascriptis remediorum for-
mulis, ut seligere T. P. ex illis, quæ arriserint, possint. Quod si latius
T. P. de toto morbo & causis illius, inprimis symptomatis actionum læ-
sarum (non tantum naturalium, sed & animalium & vitalium) & excre-
mentorum mutatorum ad me perscripserit, minutius quoque ad singula
respondebo. Interea fortunari hæc à præpotenti DEO precor : & si vires
forſan defuerint, animum tamen & voluntatem obsequendi, ut spectes
summopere rogo. Vale.

Recip. *Ligni aloës* ℥ij

Rosæ ʒij

Thur. Mascul. succini ā. ʒj

Styrac. Calamint. ℥ij

Caryophyll.

Benioin. ā. ʒß

F. Pul. & cum Styrac. liquid. f.

Trocisci. S. Röchlein zum räuchern. A.

Recip. *Nuc. mosc. Mastic. alb.* ā. ʒj

Sandarac.

Arab.

Cort. arant. ā. ʒß

Carab. alb.

Galangæ mut.

Calam. arom. ā. ℥j

Spet. Diagalang.

Aromat. ros. ā. ʒß

Diacodon. cum Spet. ʒß

Sachari ros. tabul. ad pond. dimid.

F. l. a. Tragæa.

S. Pulver nach den Essen. B.

Recip.

Recip. Fol. Senna S. stip. ʒj ss.

Agarici opt. ʒiij

Zinzib. ʒj

Galang. minor. ʒß

Caryophyll. Cort. arant. ā. ʒß

Inf. simul in s. q. aq. per hor. 24. bulliant
deinde s. a. ad dimid. colet. fortiterque
exprim. Colat. add. Passular. mundat. ʒiij

Bulliant rursus una atque altera ebullitione,
reponantur in fictile addendo Manna ʒj

S. Purgier-Rosinen, C.

Recip. Rad. Polypod. q. ʒj

Filic. mar.

Petrosel.

Asparag. ā. ʒß

Cort. Rad. Cappar.

Thamaris. ā. ʒiij

Fol. Scolopend.

Cuscuta.

Ceterach.

Agrimon.

Chamed.

Capill. Ven. ā. M. j

Sem. Anisi, Fœniculi ā. ʒiij

Viticis ʒj ss

Melon. ʒß

Carthami conquis. ʒvj

Flor. Sambuci, genista,

Cichor. ā. P. j

Amygdal. amar.

Passular mund. ā. ʒiij

Glycyrrhiz. rasa ʒiij

Coq. in s. q. aq. pro ʒijs in col. infund. s. a.

Rhabarb. opt. ʒjs

Spica, squinanth. ā. ʒß

Fol. Senna ʒys.

Epithym. cret. ʒvj

Agar. troc. ʒs

Canella ʒiij

K 3

Galanga

Galangæ min. Zinzib. ā. ʒj

Nuc. mosc. ʒj

Stent per aliquot hor. infus. post rursus bulli-
ant leviter s. a. & col. Colat. add. Man-
na elect.

Syr. ros. solut. Diasereos c. Rhab. ā. q. s.
ad mediocrem dulcorationem s. s. a. Syrupus.

S. Purgiersafft D.

Recip. Conser. Rosar.

Incarnat.

Anthos.

Melis.

Bugloss.

Rad. Scorzonæ. cond. ā. ʒss

Cort. citri extr. condit.

Nuc. Ind. cond.

Zinzib. Ind. Cond.

Rad. Cichor. cond. ā. ʒij

Spet. Diambra

Arom. Rosat. ā. ʒss

Cinamom. el.

Caryophyll. ā. ʒj

Macis in aceto præp. Ligni aloës, Santal. Ci-
trin. ā. ʒs

Troc. de Eupator. absynth. ā. gr. v.

Cum Syr. Zinzib. s. q. & gut. 40

Ol. Cinamomi.

F. Mixtura.

S. Sterckung E.

Recip. Cort. Citri cond.

Arant.

Nuc. Ind. ā. ʒij

Cinamom. El.

Nuc. Mosc.

Caryophyll. ā. ʒj

Macis, lig. aloes.

Santal. citr.

Carab. alb. ā. ʒss

Spet. Diambra,
Diarhod. Abbat. ā. ʒj
Diacurcum.

Troc. de Eupator.

Absynth. ā. ʒß

Cons. anthos ʒß

Sach. alb. in aq. ros. & Cinam. dissol.

F. Cons. in Morsulis add.

Ol. Caryophyll. gut. ij

S. Morsellen F.

Recip. Ligni Sassafras ʒvj

Cort. Ligni Sancti ʒiij

Rad. China ʒj s. Dentur incisa.

S. Holk G.

Recip. Fol. Capill. Ven.

Scolopend.

Cuscut.

Agrimon.

Cichor.

Endiv. ā. P. j

Rad. Pentaphyll.

Ilicis.

Fenic.

Asparag. ā. ʒß

Sem. Coriand. præp. ʒvj

Incisa dentur

S. Specerey zum Capaunen. H.

Recip. Summit. Aneth.

Parietar.

Absynth. ā. M. j

Cusc. Ceterach. ā. Mß

Sem. Anisi

Fenic. ā. ʒiij

Lini, Fen. grac. ā. ʒj s.

Flor. Chamomel.

Genista ā. P. j

Furfur. P. ij

Fol. Senna ʒiij

Coq. omnia in s. q. aq. pro 3x
Incolat dissol.

Elect. de hiera c. agar. 3vj

Diaphæn. 3iij

Olei Aneth.

Cheirin.

Mell. anthos. ā. 3j

Mis. pro clystere.

S. Clystier l.

Recip. Spet. Diagalanga ʒj

Dianisi,

Diazin. ā. ʒß

Sachari candi gra. v.

Mis. S. Pulver zum Wein R.

Recip. Galangæ,

Cort. arant.

Citri,

Nuc. Mosc. ā. ʒj

Macis

Garyophyll.

Cubeb.

Lig. aloes ā. ʒß

Santal. ʒij

Coriand. ʒß.

Ros. rub.

Anthos ā. ʒj

Lig. Sassafras ʒij

Cinamom. ʒj f.

Zinzib. ʒij

Pulveris. crassiusculè mater in S. V. ʒj f. &
stent in loco cal. per dies 20. ac singulis
diebus 2. vel 3. agitentur. Quinto die
non moveantur, sed ut residerent pul-
veres, colentur. Colat. add.

Syr. de Cort. citri ʒij

Mis. S. Elixir L.

Recip

Recip. Aloes ros. ʒj
 Rhab. Ell. aq.
 Cinam. aspersi ʒß
 Troc. de absynth. gut. v.
 Sal. gemma gr. j
 Cum aq. absynth. f. pill. n. XXI.
 S. Pillen M.

Recip. Ladani, cera ā. p. aq. cum Ol. de
 absynth. f. sup. alut. scutum Sto-
 machale.
 S. Magenpflaster. N.

Recip. Ol. Mastich.
 de Absynth. ā. ʒvi
 Cydon. ʒiij
 Vini Od. ʒj f.
 Cumin.
 Absynth.
 Galang.
 Nuc. mosc. ā. ʒß
 Macis pul.
 Caryophyll.
 Ros. rub. ā. ʒj
 Mastich. ʒß

Bulliant ad consumm. Vini. & col. fortiss.
 colat. ad.

Ol. Anisi,
 Fœnic. ā. gut. v.
 Cera q. s. f. linim.
 S. Magen-Salbleim O.

Recip. Spet. Diambre ʒij
 Diamosch. d. ʒf.
 Succini alb. ʒj
 Ambra gryf. gr. iij
 Cum Syr. de Cort. Citri f. pill. n. XXIII.
 S. Pillen auf den Abend. P.

CONSILIUM XI.
IN MELANCHOLIA HYPO-
CHONDRIACA, ATRA BILE HYPOCRA-
TIS ET TUMORE SPLENIS.



Conqueritur Nobilis & Generosus Dominus N. N. quod ante annos ferè tredecim integrum quadriennium lecto affixus decubuerit, impotens in sessione, & meditationibus. Etiam si verò dolores tunc non adeò ingentes perceperit, uti nec ponderosâ immobilitate artuum laborarit, quandoquidem omnes actiones tam vitales quam naturales suis fungerentur officiis: nihilominus tamen plerisque matutinis, postquam surrexit, uti & horâ tertia pomeridianâ, dum jejunos ferè fuerit, exarandisque literis vel aliis rebus occupatus fuerit, vertiginoso impetu circumactus est, ut non parum sibi ab apoplexia metuerit. Persensit verò exquisitè, vertiginem hunc ex infernis corporis partibus suam traxisse originem, cum primis verò è sinistro hypochondrio (ubi dolores gravativos, punctiones & tumores Schirrososprehenderit) ascendisse sursum, primumque ventriculum & præcordia anxietorsisse, ibidem etiam vomendi, irritum tamen, conatum excitasse. Hæc ita sursum ferri, dum sensit, cardiogmum in simul percepit incredibilem, ut & difficilem respiratum & quasi abnegatam inspirandi potentiam. Sensit ulterius, hæc ipsâ de causa linguam sibi reddi difficilem ad motum: Postmodum totum caput gravedine & vertigine occupatum fuit penitissimè. Fuerunt hæc symptomata interdum dolore capitis socio stipata, interdum minimè. Hæc dum ita gesta fuerunt, visum fuit ipsi caput tendi & introrsum versus contrahi. Secuta fuit caligo oculorum, varique colores iisdem obfusi. In cervice verò & spina dorsi, usque ad plantam pedis descendendo morsiones quasi & incessus subreptitios formicarum persensit, adeò ut ad stationem impotens, sedere coactus fuerit. Erupit postea sudor frigidus cum animi conjunctus deliquio. Frigore etiam sinistrum brachium molestatum fuit, & quasi stupidum redditum: maximè verò hoc malum percepit in duobus minimis sinistrae manus digitis. Dextro in brachio ea percepit omnia, sed longè mitigatiora & clementiora. Urina quoque interdum fuit suppressa, interdum tenuissima & serosa tantum extitit, quandoque tincta, turbida & crassa tanquam animalium,

non sine ardore, dolore ingenti & arenularum egestionem. Alvus rarissime debitum exolvit officium: egestionem ejusdem semper conjunctos habuere ardores quosdam, tenesmos, diarrhoeas, obstipationes. Hæc verò symptomata tantum in auroram vel horam 3. pomeridianam, vel etiam, rarius tamen, in mediam incidere noctem. Ad hæc, quæ retuli, diversissima morbi symptomata, diversimodè diversi respexerunt Medici. Alii calculo hunc ægrotum laborare, asserunt: alii splenicum eum pronunciarunt. Ventriculo alii adscribere causam, alii capiti, alii pectori & capiti insimul. Singuli verò horundem Medici hæc in praxi respectantes omnes à fundamento aberrarunt, tandemque ægrum ut deploratum turpiter reliquerunt. Posteaquam verò hæc omnia ad amissim sollicitis ego computarem articulis, symptomataque tam varia, tamque contraria & ἀντιδινεμένα considerarem, hæcque ipsa ad suum morbum reducerem, & è quo fonte omnes scaturirent, quoque pacto invicem omnia catenâ quasi quâdam unita essent, perpenderem,prehendi affectum ejus esse trinum, melancholiam hypochondriacam, Atram bilem Hippocratis, Lienisque tumorem. Hæc enim affectuum morbidorum triga adeò arctissimo vinculo unita & sociata ac complicata erat, ut symptomata ejusce quotidiana, quæ pro qualitate & ordine ciborum aliam ostendebant faciem, quemlibet ferè & perspicacissimum non nisi fefellerint, inque retros præcipitaverint errores. Causa hujus Trigæ morbidæ antecedens fuit vita Nobilis Domini solitaria & sollicita, cum summa ingenii intentione & lassitudine, curis, lucubrationibus continuis, vinique tandem Ketzschbergensis, recreationis, (sed putativæ) ergò largiter ebibiti conjuncta. Quia enim Ketzbergense id vinum, in iis, qui calido laborant epate, atram bilem facili generet negotio, si præsertim avariter id bibatur, plenis faucibus, inter cantus, tripudia, aliasque corporis motiones: proin & lienem facile, ut extuberet, facit, à quo demum constipationes torsionesque & punctorii dolores consequuntur. Cum præterea atræ illius bilis à vno illo largiter poto, magnus existat proventus, fit inde, ut unâ cum liene, de quo dictum, & in venas mesaraicas totumque mesenterium ab Epate magna illius bilis pars propellatur, ibidemque vel ob motum corporis nimium, vel cibos calefactivos supervenientes, adhuc magis incalescat, fermentetur & exæstuat. Inde ἀνοψία sequitur ventriculi, & generantur flatibus: Hi si fursum ascendere nequeant, molestias creant præcordiis & hypochondriis.

Horum sanè ignoratio multos defraudavit Medicos, qui ventriculum anquam solitarium subiectum & πρῶτον δέντινον, unoque saltem & saltim

oculo considerarunt. Illâ atrabilariâ ita effervescente & bullas quasi generante, os quoque exiccatur & gingivæ redduntur asperæ, unde & ægroti isti longè magis haustum frigidiorē, quam tepidum aliquod jusculum exposcunt. Sed nec adhuc finis tantorum malorum. Jungit enim se atrabilis chylo, hunc increffat: increffatus semetipso fit calidior, putrescit quasi, acescit effervesce, præsertim coctione peracta & ventriculo inani. Quod si interdum massa illa atrabilaria motu corporis nimio incalescat, vel etiam & liene, ut notum, pro excitando appetitu in ventriculum restagnet, tunc totum commovet ventriculum hunc inflat cum tragicis animi deliquiis & angustia distorquet, præsentibus præsertim flatibus, nec ulla salus, priusquam totum evomatur. Quod si flatus ii sub diaphragmate collecti fuerint, diaphragma in altum quasi extollunt, difficilemque respirationem producant. Si verò præter flatus eosce, adsint & ejusmodi vapores, tunc hi sanè superiora petunt: sit via vi: ad superna delati, arteriam asperam constipant, cum vim habeant adstrictoriam ab atrabile: Trachæam eam contrahunt quasi & jugulant. Delati ad cordis capsulam vel etiam ad cor, ipsum copiâ sua obruunt, ut id nolens volens ad expulsionem contrarii mali exurgat. Hinc illa cordis palpitatio hinc deliquium. Consimiles injurias reliquæ partes experiuntur. Linguam quippe rigidam reddunt & immobilem quasi.

In cerebro si duram piamque contingant matrem vel etiam nervos, convulsiones producant, spasmos, motusque convulsivos mandibularum nasi, frontis, totiusque faciei.

Cum autem iidem vapores insimul nigricantes sint & quasi piceati, inde tenebras obfundunt visivis organis. Cum etiam crassi sint, nequaquam verò nimîâ subtilitate omninò præditi, inde oppillant partes nervosas, indeque dolor fit, incessui formicarum reptitio non absimilis. Hic dolor totum occupat dorsum, utrumque brachium: gravius verò affligit sinistrum latus, quod ibidem Lien protuberet, & ita plures dolores in eo latere deprehendantur, in tantum ut & brachium & pes sinister quasi refrigerentur.

Hoc animadvertentes quidam Medici, Epilepsiam id esse statuerunt: alii asthma; morbum spleneticum alii: Cum insuper tantum malum à sanguine dependeat atro, crasso, fœculento & adusto, contingit, ut is ipse sanguis tum per urinas, tum verò & per alvum egeratur.

Per alvum si egeritur, non sine ardore & tenesmo id fieri poterit: si per lotium, non sine ardore urinæ, dysuria, arenulis: calore rubro egestum quicquid egestum. Atque hoc ipsum fuit, quod Medicorum quibusdam suavit, in opinionem de calculo eundi pedibus.

Hæc ergò sunt symptomata, quæ te, Nobilis & generose Domine N.N. hæc-

hactenus affligrere, & quidem semper & continuo. Cum enim alterum ab altero dependeat, unumque manus auxiliares præbeat alteri, fieri non potuit, quin nunquam expers dolorum esset & aliquorum symptomatum.

Copiosus fui hactenus in recensendis generibus & causis hujus mali. Nam verò in pauca verba conferam, quâ ratione is à me in integram sanitatem restitutus fuerit.

In curatione itaque adhibita fuere lenientia, Syrupi & decocta purgantia alterantia. Alterantia decoquebantur in decocto raparum siccatarum, quando præsertim gravamina circa thoracem, aut retentio arenularum in ureteribus & renibus contingebat. Factâ universali purgatione per dies decem mane ʒss pilularum de extracto Cardui bened. cum Sero aprino sumsit, & ne ventriculus læderetur, simul Trageæ Stomachales fuerunt adhibitæ. Lien cum intumesceret, fomentabatur & inungebatur. Ventriculi roborandi ergò adhibebamus varia, condita, morsulos pulve- res, aquas vitæ, decoctum Sassafras: olea item & unguenta.

Cum Semina quædam vertiginis (ob consistentem adhuc caco- chymiam) gliscere velle arbitrabamur, dabamus ipsi balsamos ex extracto ru- bæ, calamo aromatico &c. ut iis faucibus, palatum naresque inungeret.

Eò etiam respiciebam potissimum, quo humor atrabilarius & melan- cholicus ex hypochondriis & splene educeretur. Ea verò omnia in sero- tis vel decocto raparum siccatarum obtuli, uti ea ipsa potus loco esse- solui. Enematum sæpius usurpatorum usus plurimum profuit; idque tum in evacuando, tum revellendo. Victus ratio prohibebat cibos fla- ventos caput petentes, obstruentes: ordinabat verò *ἐνχύμια* paucos, mo- deratos, fluidos. Et tantum de his.

CONSILIVM XII.

IN VERTIGINE ET SPASMO.

Hæc duo Symptomata, quæ te magnopere excruciant, à bi- nis excitantur causis: nempe quod ventriculus sit langui- dus, & Mesaraicæ obstructæ: dein quod caput debile mi- nis, alimenta suppeditata non perfectè concoquat, sed in- flatus resolvat. Flatibus hisce in cerebro ortis, de loco in locum lanci- ant, & si oculos versus feruntur, vertiginem subfundunt. Quod si ve- ro alimenta illa imperfectè cocta in cerebro in flatus non resolvantur, sed humorum more decidant ad genus nervosum, ibidem & illa in flatus re- solvun-

solvuntur. Hi flatus impellunt musculos, ut ad expulsionem exurgant & se contrahant. Contractis musculis contrahuntur & nervi. Quo facto, dolor sentitur ingens, quem spasmus nominant. Quapropter unicè suadeo, ut in Curatione ventriculus cum mesaraicis venis & capite probè perpurgetur, caputque roboretur, tandemque, quod hæc partes ad unam omnes ad pristinum statum reducat, usurpetur. Primum quod attinet, dominus Pilulis A. mane circa septimam utatur, & ad decimam usque jejuset, quæ non tantum ventriculum expurgabunt, sed & reliquis medicamentis viam prosternent.

Cum nodulo B. agat, ut moris est, superfundat Vini Rhenani ℥iij, altero dein die bibat de ipso bonum haustum, continuando usum ejusdem ad aliquot dies: ita mesaræ patefient paulatim, tandemque obstructio tolletur. Purgabit de die ter vel quater sine omni molestia. Tercio tamen die postquam de nodulo biberit, cesset ab omni medicamento: & mittat ex mediana dextri brachii quatuor uncias sanguinis.

Pergat die sequenti usque ad consumptionem noduli. Dein diem unum quiescat, & altero die circâ horam 6. pilulas C. deglutiat omnes, domi se contineat & jejuset ad decimam: purgabunt peculiariter caput, & fluidam materiam per alvum educent.

Jam roboratione opus erit. Comedat ergò singulis auroris, laxato priùs alvo & evacuata vesicâ, Morsulum unum D. notatum, ferat jejunium usque ad prandium. Interdum etiam hora 3. pomeridiana unum capiat & jejuset ad coenam.

Præcipuè tamen capiti roborando & fluxioni sistendæ conducit pulvis E. de quo, quantum tribus digitis capitur, super frustulum panis triticei tosti & vino madefacti spargat & hora 7. comedat, jejunando ad decimam. Utatur hoc pulvere bis vel ter in hebdomate, omittendo usum morsulorum hæc diebus.

Nodulus G. secum circumgestatus & naribus sæpè admotus summo-pere conducit ad vertiginem depellendam & cerebrum roborandum. Vertigine repentè ingruente sumat unam rotularum F. quam in ore detineat, & ita paulatim manducet. Similiter nunquam domo egrediatur, quin secum habeat balsamum succini, caryophyllorum, apoplecticum & similes, quos pro avertendâ vertigine naribus admoveere poterit. Spiritus cerasorum valde quoque laudatur in similibus affectionibus, quem Halâ mittam.

Usurpet cibos coctu faciles, bibat modicè vina Bohemica, & Cerevisias caput petentes, vitet cibos sinapi, cepis, allio & croco conditos, caput defendat à frigido humido & ventoso aëre, præsertim verè & autumno.

immo. Denique iram & terrorem, qui affectus in hoc casu sunt instar
estiar venenatar, quantum possibile vitet ac fugiat.

Recip. *Maß. pill. Cochiar.* ʒß
de biera c. agar. ʒß
aggregat. ʒj
Diacrid. gr. j
Cum aq. beton. f. pill. n. XXI.
S. Pilula A.

R. Rad. Pæon.
Pentaplyll. ā. ʒß
Calam. aromat.
Fenic.
Vincetox.
Asparagi ā. ʒv
Sem. Siler. mont.
Pæon. excort. ā. ʒij
Aquileg. ʒjs
Herb. Beton.
Origan.
Salvia
Rosmarin. ā. M. j.
Soldanella M. j
Flor. Stæchad. Arab. Mß
Fol. Agrimon.
Ceterach.
Flor. Sambuc. ā. Mß
Fol. Senna ʒjs
Rad. Mechoacan. ʒß
Rhabarb. opt. ʒij
Spica ʒij
Agar. troisc. ʒiij
Pulverisata subtiliter ligentur in sacco
facto & syndone duplici. S. Nodulus P.
Recip. Mass. pill. Cochiar. ʒß
Assaiereth ʒj
Aggregat. ʒß
Troc. Alhant. gr. j

Cum aq. beton. f. pill. n. XXI.

S. Pillule C.

R. Flor. Rorismar. ʒʒ

Lavend. ʒj

Cubeb. opt. ʒj

Cal. arom. cond. ʒiij

Cort. citri cond. ʒij

Margarit. præp. ʒʒ

Rad. Pæon.

Sem. ejusdem excort. ā. ʒij

Macis incis. ʒj

Extr. Pæon. ʒj

Ol. Nuc. mosch. destil. ʒʒ

Macis gr. v.

Sacch. albiß. solut. in aq. Lavend.

q. s. F. Conf. in Morsulis.

S. Morsuli D.

Recip. Galang.

Tormentill.

Zinzib. albi.

Visci quer.

Sem. Pæon.

Coriand. præp.

Cubeb. ar.

Nuc. mosch. ā. ʒij

Piperis longi.

Rorismar. sicc. ā. ʒj

Conf. ex Ol. Anisi ʒj

Conf. ex Ol. Caryophyll. ʒʒ

Sach. candi ʒiij

F. Pulvis subtilis E.

R. Extr. Calam. arom.

Ruthæ ʒʒ

Pæon. ʒj

Margarit. præp. ʒj


Corall. rub. ʒij

Ol. Nuc. mosch. ʒʒ

Ol. Nuc. mosc. destill. ℥j
Fenic. gt. vj
Spet. Diambra ʒß
Ambra grysea gr. v.
Sacch. albiß. sol. in aq. Salvia f.
Conf. in Rotulis F.
Recip. Sem. Nigellæ in aceto infus.
& exiccati ʒj
Ol. Carui gr. X.
Irroretur pulvis ex nigella factus
& ligetur in Syndone duplici
pro nodulo.
S. Nodulus G.

CONSILIVM XIII.

IN EPILEPSIA PER CONSENSUM.


 Effectum hunc præter naturam, Epilepsiam esse, & consequenter cerebrum quoque affici, dum nimirum ejus facultas expultrix irritata ad expulsionem rei noxiæ, convulsivum inducit motum, hæc symptomata indicant, quæ huic affectui propria sunt, & pathognomonica,

1. Ipsa convulsio.
2. Dentium arcta commissio.
3. Linguae Morfus.
4. Urinæ involuntaria emissio.

Interim per consensum potius, quam essentiam cerebrum affici, facile constat.

1. Ex causa antecedente, crurum scil. sinistri potissimum, ad tactum dolore.
2. Generationis modo, dum paulatim vapor quidam per crus ascendens ad cerebrum delatus, effectum illum inducit.
3. Ipso sensu, dum vaporem illum sensim sursum ferri percipit.
4. Symptomatis remissioribus, dum facultas animalis non prorsus aboletur, sed depravata saltem illius functiones depræhendantur, cum nonnulla quæ aguntur audiat & percipiat, illorum quoque, finito paroxysmo optimè recordetur, & audita aliis exactè referat.

Et quidem à vapore potius , quam materia humoralis :

1. Quod subito accessio fiat & remittat.
2. Vaporis ascensus manifestè percipiatur.
3. Paroxysmus absque ulla excretionis humoris alicujus finiatur.
4. Solvatur quandoque cum sternutatione.

Qui sanè vapor ex qua minera suscitetur ac elevetur , & num secum conjunctam habeat malignitatem ac virulentiam aliquam an verò secus , licet difficile sit aliquid certi hic determinare , attamen illum omni prorsus malignitate haut carere , & à simili quoque fomite excitari , non obscurè inde cognoscere licet.

1. Quod celeriter moveatur , ut etiam ligaturas antevertat.
2. Quod dolorem tam ingentem in crure excitet.
3. Quod cerebrum tantopere vellicet : qui effectus : vix ulli evidentium qualitatum competere , vel ei adscribi potest.
4. Quod sensim alius colligatur , dum per intervalla prior ex loco affecto fuit expulsus. Mora autem illa peculiarem quandam alterationem præsupponit.

Ut omnino diligenter sit attendendum , ne si copiosior ille vapor colligatur , aut paroxysmi frequentius invadant : ex δευτεροπαθεία, δευτεροπαθεία , ex συμπαθεία ιδιοπάθεια oriatur.

Curam itaque quod attinet , descripta illa partim est à Galeno in historia pueri , cui aura frigida à pede ascendebat : partim κατ' ἀναλογίαν haberi potest ex illorum tractatione , qui à viperis vel alijs animalibus venenatis fuere demorfi.

Ac præservationem quidem quod spectat , extra paroxysmum , Intentio.

1. Est materiæ proportionalis , ut vocant , quoadlicet , vacuatio.

Quæ sanè in hoc subjecto , per nodulum rursus (cum alia horreat medicamenta) institui posset : Parando illum ex

Rhabarbari ʒjss

Fol. Senna ʒß

Agar. troc. ʒij

Zinzib. Galang. minor.

Cinam elect. ā. ʒß.

Hinc infundendo illum in vino , & more consueto liquorem usurpando.

2. Ejusdem materiæ eradicatio.
1. Per frictiones loci affecti crebriores , ut materia dissipetur.
2. Itemque sinapismos leviores v.g. hoc loco mel anacardinum , ut materia extrahatur.

3. Vel etiam vesicatorium : si necessitas postularit.

Recip. *Cantharid. absciss.*

Capit. alis & pedibus ʒj

Rad. Flamula,

Sem. Ruthæ agrest. ʒ. ʒß

Fermenti veteris & acris ʒij

Cum aceto vini acerrimo f. Massa.

Apertæ postmodum vesicæ imponendo mithridat. vel theriacam.

4. Cucurbitulas tandem cum levi scarificatione, affricando quoque di-
ctam theriacam & mithridatium.

3. Cerebri roboratio, ne tam facile vel etiam violentar à vapore illo affi-
ciatur, quod potissimum facit pulvis sequens:

R. *Rad. Pentaphyll.*

Pæon.

Angel. ʒ. ʒij

Eryng.

Gentian. ʒ. ʒß

Vis. quer.

Fol. Pentaphyll.

Beton.

Herb. Paralyf. ʒ. ʒj

Flor. Lil. Convall.

Sem. Coriand. præp.

Sesileos ʒ. ʒß

Pæon. excort. ʒj

Cor. Cervi præp. ʒij

Ung. alciæ, asini,

Corall. rub. præp.

Margarit. præp.

Vngv. med. ped. lepor.

Coag. leporis veri.

Sem. Palma Christi veri ʒ. ʒj

Rasur. Cran.

Hum. in parte anter ʒjss

Sacchari candi ʒj

Mis. f. Pulv. s.

2. Itemque myrobal. chebuli conditi.

1. Nux indica condita : cum alia horreat medicamenta.

4. Alias pulvis præscriptus in forma rotularum vel morsellorum exhiberi quoque posset : Dissoluto Sacharo in aq. flor. thiliæ, lil. conval' vel Pœon. additis gr. ij. vel iij. extracti ruthæ vel levistici.
 5. Aut usurpari diacorum per se absque aliorum permixtione.
 6. Aut ejusmodi conditum parari :

Recip. Diacori ʒvj
 Conf. Flor. Pœon.
 Stæchad. ā. ʒiij
 Cort. myrobal.
 Cheb. condit.
 Nuc. Ind. cond. ā. ʒss
 Cornu cervi præp.
 Ungula alcis ā. ʒj
 Raser. Cran. Hum.
 Margarit. Corall. præp. a. ʒp
 Cum Syr. flor. Pœon.
 E. Mixtura.

7. Lotio quoque capitis non incommoda foret, injiciendo in lixivium nodulum hunc,

Recip. Fol. Majoran.
 Beton.
 Salvia,
 Puleg. ā. Mss
 Flor. Chamomel. Rom.
 Stæch.
 Ros. rub. ā. P. j
 Incisa indantur panno lineo mundo s.
 s. a. nodulus.

Quin etiam sapo peculiaris parari posset,

Recip. Sapon. Venet. ʒjss.
 Dissol.
 Cum aq. Beton. & add. Santal. citrini
 odor. ʒj
 Majoran. salvia ā. ʒj
 Ambra gr. ij s. s. a. duo globuli.

4. Diætæ exquisitioris præscriptio.
 Qualis quidem nota est, vitando potissimum :

1. Excessum qualitatis aëris quemcunque,
2. Cibos caput petentes.
3. Somnum meridianum.
4. Exercitium vel meditationes à cibo.
5. Astrictionem alvi.
6. Animi affectus vehementiores ; iram præsertim.

IN PAROXYSMO VERO INTENTIO.

1. Est vaporis revulsio : id quod fit per frictiones manuum & linteorum calidorum.
2. Ejusdem vaporis interceptio : id quod fit per vincula seu fascias latas : quæ & ipsa in præcautione locum potissimum obtinerent : deligatione autem expressivâ utendum fascia , primum ascendendo , mox descendendo , ac rursus ut nonnulli faciunt ascendendo.
3. Symptomatum correctio :
4. Epilepsia per antea præscripta.
5. Post Morsus linguæ per mel rosatum.

CONSILIVM XIV.

IN QUO EGREGIE DE LOCO
AFFECTO EPILEPSIÆ DISQUIRITUR.

DE morbo ipso , nimirum quod sit Epilepsia , & quod fiat cerebro affecto & irritato ad expulsionem rei infestantis cum sui contractione , non est quod dubitemus. Sed in hoc casu præsentis nunc quæritur , utrum cerebrum ad hanc expulsionem vehementem , irritetur ab aliquo affectu , in ipso per essentiam , id est ab intemperie aliqua insita , aut in aliquo , ut ab obstructione , aut communi ut à soluta unione vel simili. An verò ab aliqua externa & adventitia causa , ut ab humore pituitoso , aut melancholico vitioso , aut qualitate aliqua manifesta , aut maligna aliqua putredine vel corruptione alia , corrupto sive à vapore , halitu , fumo , flatu , similiter malignitate aliqua ut venenositate infecto eodemque aut in ipso cerebro genito , aut ab aliis partibus , cruribus , brachiis , utero , intestinis præsertim infestatis à vermibus , ventriculo ab acribus aut venenosis humoribus admorso , in cerebrum misso delatoque. Denique in quo cardo potissimum hujus deliberatio-

nis vertitur utrum ab affectu proprio & per se, an per consensum aliunde existat.

Ex symptomatis autem quæ nos partim spectavimus, partim ex astantium relatu cognovimus, non possumusprehendere, quod sit epilepsia per essentiam in cerebro. Nam invasionem præcedit sensus doloris acerrimi in sinistro crure frequentius, rarius in dextro cum hoc orditur, & hoc cessante desinit. Fit subito & inter clamandum propter dolorem, & convulsionem dentium commissorum cum læsione admorsæ linguæ, cum convulsione levi manus extremæ & digitorum in manibus: interdum quod rarius est, cum emissionem urinæ involuntaria. Intellectus autem sibi constat perpetuò ante & post, & in ipso paroxysmo. Nam & sentit & audit omnia & meminit omnium.

Nec diu perseverat, sed subito solvitur paroxysmus, interdum cum sternutatione, interdum sine illa, cum aliqua excretionem manifesta nunquam. Ista certò arguunt causam primariè ac per se non posse existere ab affectu cerebri, aut à materia seu humoralis seu flatulenta ibidem genita, sed quod irrepit aliunde, & quidem quod ascensu efferatur sursum ab alterutro vel utroque crure, maximè verò à sinistro.

Accedere autem ac misceri aliquid posse ab utero consentaneum est, quod ipsum probarunt etiam adhibita remedia.

De affectu itaque ipso, & de causis in cerebro proximis, aliud nunc quidem statuere possumus. Sed quæ sit illa causa forinsecus illata in cerebrum decernere difficilior est. A cruribus quod eveniat evidens est ex sensu & ascensu.

Sed humor qualis sit & quâ corruptione infestus à quo manat & effumat halitus, & quæ sit malignitas & venenositas, & unde ea sit, conjectari nobis, causis procataceticis nullis obviis, adhuc minus facile est.

Coacervatum humorem aliquem putredine in parte aliqua corrumpi, aut partem veneni contactu aut contagii impressione, aut ab admorsu araneorum canum rabidorum, scorpionum concipere posse, minimè dubium est. In hoc verò præsentis casu cum de tali procatacetica causa nihil certi constet, ideo neque qualis sit, definire possumus: quod sit tamen dolor ingens ad quem exclamat, demonstrat & convincit.

Et si autem in curatione ad cerebrum non minus respiciendum erit, quam ad partem communicantem cum cerebro. Nam præmuniri oportet cerebrum diligenter, ne ex recursum frequenti fiat impressio malignitatis in cerebri substantia, & ex morbo per consensum, ne fiat morbus per se & per essentiam, tamen præcipua erit danda opera, ut fons & origo mali
in cru-

cruribus removeatur, quod qua ratione & quibus remediis effici debeat ac possit, etiam describemus.

Quod ad curationem hanc exemplo ductuque rationis & experientiae κατ' ἀναλογίαν pervenire possumus minimum dubium est, & testimoniis exemplisque similium curationum sæpè comprobatum.

Velimus tamen explorandi affectus causa Cels. V. crura ipsa prius in ea parte, qua dolor, cum adest, maximè viget, diligenter contemplari, utrum in ea vel tumor aliquis emineat, vel percipiatur durities, vel cicatrix aliqua, aut quodcunque læsionis, vulneris, punctiōnis vestigium appareat. Potuit enim infantulæ aut adolescentulæ contingere aliquid, cuius ipsa non meminit. Potest enim & solet etiam tale malum diu sese continere ac latere, priusquam se commoveat & exerceat.

Ad hoc postulatum ex aula illustrissima talis responsio data, conce-
ta à Medico domestico : Illustrissima Domina sub finem utriusque su-
æ inprimis verò sinistræ cruris, in parte domestica, & quidem in pro-
fundo sub musculis, ubi nimirum fines eorum capitibus aliorum inse-
untur, dolorem patitur ad tactum subacutum : sed ita ut in superficie,
cutis & carnes subjectæ sint molles & naturaliter undiquaque constitu-
æ appareant, in profundo verò, nervosæ musculorum partes ad con-
tractationem paulò fortiolem duritiem cum dolore, quasi convulsæ &
rigentes præ se ferant : Talis autem dolor matutinis ferè horis, circa
tertiam coctionem, hora quarta vel quinta per intervalla (primum men-
sum, nunc dierum) intenditur : atque tum subito aliquid ab isto loco
ascendere percipitur. Quo (statim atque ad cerebrum defertur) oculi
distorquentur, convulsorii motus artuum oboriuntur, dentes arctissimè
committuntur, cumque ob dolorem clamare affectet, lingua intercipi-
tur & mordetur, urina quandoque involuntariè excernitur, neque eo-
rum, quæ in paroxysmo ab astantibus aguntur, recordatur. Perdu-
rant hæc, quandoque dimidiæ, nonnunquam integræ (sæpè etiam pau-
lo ulterius) quadrantis horæ spacio, finiuntur verò quandoque cum
ternuatione : nunquam autem cum humoris alicujus excretionem, quan-
doque etiam nulla spuma circa os apparet. Quod si sub doloris perce-
ptionem vincula cruribus secundum locum affectum versus genua in-
iciantur, & ligaturæ fiant fortes, frictiones quoque instituantur par-
tium inferiorum sub eodem loco affecto, insaltus paroxysmi intercipi-
tur, vel certè vis illius paululum imminuitur. Junguntur quoque hi-
c symptomatis, vel excitantur potius ab illis, quandoque etiam pecu-
liariter invadunt (exactè enim ex symptomatis discerni possunt) præ-
focatio-

„focationes uteri : quantum ex uteri versus utrumque inguē per intervalla motu , uterinis quoque deliquis , actorum reminiscētia : nec „non curatione (dum ea , quæ strangulatis ab utero aliàs profunt , hoc „quoque loco conferant) constat : paroxysmo ità modò diutius , modo „brevius perdurante. Haftenus verba Medici domestici.

Epilepsiam ergò potiore[m] illum affectum esse statuimus , ex symptomatis pathognomonicis relatis , oculorum distorsione , motu convulsorio , dentium arcta commissiōe , cum morſu linguæ , urinæ involuntaria excretionē , & omnium quæ aguntur ignorantia.

Interim per consensum potius quam essentiam in cerebro malum hujusmodi oriri colligimus : (licet eo antehac quoque tentatam S. C. suspicemur) cum causa antecēdens sit manifesta , dolor nunc sub sura (qui in principio in pollice pedis finistri deprāhendebatur ; quanquam etiam utrobique percipitur) sensus ipse de generatiōis modo , & invasiōe testetur , auram aliquam sursum ferri : ac præservatio paroxysmi per vincula idem ostendat ; nequē ante vel post paroxysmum caput gravetur , aut actiō aliqua facultatis animalis labefactetur aut depravetur. Et quidem ab aura potius quam materia humoralī excitari conjicimus , quod subito accessio fiat , & paulò post remittat : auræ ascensus manifestò percipiatur : paroxysmus absque ulla humoris alicujus excretionē finiatur. Quæ sanè aura qualem fomitem obtineat , pituitamne aut alterutram bilem , cujus etiam sit qualitatē simplicisne alicujus an malignæ , licet exactè à nobis assignari non possit , cum neque de procatacētica aliqua constet , neque præter dolorem & tensionem atque rigorem convulsivum partium nervosarum in mutua insertiōe & conjunctiōe finium & caputū musculorum , vel in venis vel in muscūlis , vel cute mutatum aliquod deprāhendatur.

Ex effectū tamen malignitatem illum (cum auræ ascendētis neque calor nequē frigidus sentiatur) obtinere , quæ nervosis ibi musculorum partibus communicetur , ac ratione spāsmi non proportionati ad materiam , dolorem primum excitet , mox sursum vehatur , arbitramur. Præsertim cum tam celeriter moveatur , ut ligaturas quandoque præveniat : cerebrum statim quasi proprietate quadam petat , idque tantopere vellicet : nulla qualitas actīva percipiatur , per intervalla quoque maligna ista aura colligatur , ut aliqua portione expulsā , nova subinde & pededentim generetur : mora autem illa non vulgarem , sed peculiarem quandam alterationem præsupponat. Idcirco quid de affectu hoc præter naturam aliquo & excellentes quidem Medici sentiant ; quid item jam præcautio-

nis (ne in ἰδιονάθας vel ἐργωάθειαν tandem vergat) quam curationis gratia agendum putent, quæritur.

Supposito causa & essentia mali secundum signa & causas constituta: cura illius descripta partim est à Galeno in historia pueri, cui aura frigida à pede ascendebat, nec non illorum tractatione, qui à viperis vel alijs animalibus venenatis fuere demorsi. Partim κατ' ἀναλογίαν ex 5. aphor. 7. haberi potest, quo epilepticos si quartana corripit, bonum pronunciat. Materię enim epilepticę cum duplex sit sanatio, excretio & coctio: excretio per rigorem quartanarium, coctio verò caloris febrilis ratione peragitur. Ut ergò omninò sicuti quartana totum corpus & simul nervos, à vitiosis humoribus liberat & expurgat, ipsumque purius & siccius reddit: Ita quoque hoc loco, expurgationi ejusmodi appropriatę totius & partium, per quęvis auxiliorum remedia, sit studendum, cum præsertim lienis tumor quidam & dolor percipiatur: unde & suspicio fomitis in sinistro crure.

Ac præcautionem quidem quod spectat contra paroxysmum, prima intentio est materię proportionalis, ut vocant, quoadlicet vacuatio: vias in initio communes per eccoprotica dicta evacuando: v. g. clysterem hætenus usitatum vel etiam pilulas aggregativas, hieræ c. agar. an. ℥j diacryd. gr. iij. cum aq. flor. Tiliæ, mox apozema purgans tale præscribendo:

Recip. Rad. Polypod. quer.

Palma Christi vera.

Pentaphylli ā. ℥j

Pæon.

Angel. domest.

Scorzoner. lili. ā. ℥ss

Cort. Rad. Cappar.

Thamaris

Visi querc.

Coryl. ā. ℥ij

Fol. Millefol.

Primula veris, Beton.

Ceterach.

Cuscuta, Cardui ā. M. j

Sem. Coriand. præp.

Pæon. excort. ā. ℥ij

Carthamiconquaß. ℥vj

Flor. Thiæ, Lil. Convall.

Sambuci, genista ā. P. j

Passular. mundat. ℥ss

Calam. aromat. ℥ij

Helleb. nig. Syrr. præp. ℥ij

Caryophyll. ℥ij

Turbitib. el. ℥ijs

Zinzib.

Galanga minor. ā. ℥iiij

Coq. omnia in s. q. aq. pro ℥ijs.

In colat. cal. infunde s. a.

Rhabarb. elect. ℥iiij

Fol. Senna ℥ij,

Agar. trocis. ℥ss

Cinam. elect. ℥j

Spica, Schœnanth. Salis gemma ā. ℥ss

Stent per aliquot horas in infus. post ebulliant rursus leviter s. a. & colentur, Colat. add.

Syr. flor. Pæon. de Cithor. c. Rhabarb.

Vel de corticib. citri (cum vapor malignitatem quandam obtineat)

Manna Calab. q. s. ad mediocrem dulcorationem. s. s. a. Syrupus mediocris consistentia.

Dentur pro dosi cochlearia quatuor, plura vel pauciora pro Euphoria: cui sanè decocto utiliter quoque Syr. de pomis cum senna addi, vel etiam per se usurpari posset.

Quod si delicatior formam expetat, ad imitationem Erasii clarum ejusmodi parari posset:

Recip. Rad. Pæon.

Seminis ejusdem extort. ā. ℥ijs

Cinamom.

Macis,

Galanga,

Zinzib.

Caryophyll. ā. ℥j

Fol. Senna ℥j

Rhabarb. elect. ℥iiij

Agar. trocis. ℥iiij

Turbitib. el. ℥ij

Sach. ℥ij, Vini albi Rhen. ℥ij

Aqua

Aqua ℥iij ad vinum, quod nervis & nervosis paritibus ac morbis inimicum, diluendum. Macerentur per XIII. hor. & per filterum sepius colentur, donec clarum evadat.

Quibus sanè si semel vel bis viæ vacuatæ fuerint: venæ sectio instituenda: primum in cubito dextro sc. pro repulsione & derivatione simul, secando basilicam vel medianam ad ℥iij vel ℥ij. Mox circa talum dextri quoque cruris, pro derivatione tantum: aut si vacuationem malimus quoque localem ex talo sinistro: sanguinem effluere permittendo, donec aqua satis colorata fuerit. Hinc residuo purgantium utendum.

Quod si solidior forma arrideat, massa hæc pilular. Montani, morbo huic peculiaris parari posset.

Recip. Castor. Rad. Pæon. Dictam. Cretens.

Siler. mont. ā ℥j

Corn. cervi præp. Ras. cran. hum. ā. ℥ij

Sem. citri ℥ijs

Pulv. omnia per se, postea add. agar. Rhabarb. Elect. aloes ā. ℥ij.

Caryophyll. Ciam. Zinzib. ā. ℥j

Cum Syr. de cortic. citri f. Magdaleon, ex quo fermentur pill. majores vel minores, in majori vel minori dosi., v. g.

Recip. Mass. præscrip. ℥ij

Di. cryd gr. iij

Sal. gemma gr. j

Cum aq. flor. thilia f. pill. instar aloephang. inaurantur & dentur.

2. Intentio est ejusdem materiæ eradicatio,

1. Per frictiones loci affecti crebriores (ut nimirum materia dissipetur) & quidem vel linteorum calidorum tantum, vel etiam ex aq. vitæ cui aliquantum quædam infusa fuerint: v. gratia.

Recip. Fol. Salvia,

Rosmar.

Thymi Satureia,

Lavendula ā. P. j.

Zinzib.

Caryophyll. ā. ℥j.

Inf. in ℥ss aq. vitæ stent per diem naturalem, post linteis in eo madefactis frictiones loci affecti instituantur.

2. Itemq. sinapismos (ut materia vel fomes extrahatur) primum leviores v. g. mel anacard. post fortiores v. g.

Recip. *Sinapi contusi partem unam, ficuum vel panis in aqua per diem naturalem (vel si fortius adhuc velimus) in aceto macerati partes duas. Mis. & impone*

3. Vel etiam Vesicatorium, quale hoc potest esse:

Recip. *Cantharid. absciss. alis & pedib. ʒij*

Sem Ruthæ agrest. Sinapi ā. ʒj

Fermenti veter. & acr. ʒiiij

Cum aceto vini acerrimo f. massa.

Circa illud hoc observando, ut per ij, iij vel iiij septimanas locus apertus servetur: Itemque vesicis illis apertis, quandoque aliquid mithridat. vel theriac. inungatur, ut nimirum si quid venenositatis hæreat, consumatur. Quod si dolor subsequatur molestus, butyrum majale dictum, quod insulsum soli expositum mense Majo fuit: vel ol. amygd. dul recentiss. expressum illinendum.

4. Vel emplastrum tale si præsertim necessitas id urgeat, malo scil. mitioribus non cedente.

Recip. *Sinapi, pyrethri, Sem. nasturt. ā. ʒij*

Euphorb. ʒiiij

Nitri, alum. scissil. ā. ʒj

Sagapeni, Galbani ā. ʒss

Sal. ammoniaci ʒiiij

Pic. naval. ʒj

Ol. de castor. & euphorbio ā. ʒjs, gumm. dissol. in aceto squillitico & pulverisatis pulverisandis cum oleis & resinis misceantur, & addita cera f. s. a. Cerotum.

Quod loco dicto applicandum, & singulis quatuor diebus removendum, tumque locus cum scilla fricandus (si ita videbitur) & rursus emplastrum apponendum.

5. Vel tandem cucurbitulas cum levi scarificatione, affricando quoque dictam theriacam vel mithridatium.

Tertia intentio est cerebri roboratio, ne scil. tam facile vel etiam violenter à vapore illo afficiatur, vel certè noxam promptius repellat. Quo variæ faciunt medicamentorum formæ & ex simplicibus quidem *Myrobal. Cheb. cond. Nux Ind. cond. Cort. citr. cond.* (qui in hoc casu imprimis prodesse propter venenositatem, cui illi tantopere resistunt) *Diacorum, Rad. Pæon. instar Rad. Cichor. cond.* vel etiam talis mixtura parari potest.

Recip.

Recip. Diacor. ʒvj

Cons. Flor. Pæon. Stæchad. ā. ʒiij

Cort. Myrobal. Chebul. cond.

Nuc. mosch. cond. Cort. citri cond. ā ʒß

Cor. cervi præp. Ungul. alcis ā. ʒj

Ras. Cran. hum. Margarit.

Corall. rub. Smaragd. præp. ā. ʒß

Cum Syr. flor. Pæon. vel de Cortic. citri fiat mixtura: Quod si uti posset mithridatico vel iheriaca ʒj. illius vel ʒiiij. commodissime addi possent. Cujus dosis nota est.

Ex compositis verò innumeris quæ habeantur, aqua est hirundinum Rondeletij, itemque aqua picarum, cujus descriptio apud auctores habetur, quarum dosis cochlear ʒj sive ʒß per se simpl. vel cum Syr. flor. Pæon. : vel aliquo pulverum, v. g.

R. Rad. Pentaphyll.

Pæon. angel. ā. ʒj

Eryng. gentian. ā. ʒß

Vis. quer.

Fol. Pentaphyll. beton.

Herb. Paralyf. ā. ʒj

Flor. Thilia, Li. convall.

Sem. Coriand. præp. Seseleos ā. ʒß

Pæon. excort. ʒj

Cornu cervi præp. ʒij.

Ung. alcis, asini.

Corall. rub.

Margarit. præp.

Ung. med. interped. leporis,

Coag. lepor.

Sem. Palme Christi veri ā. ʒj

Rasur. cranei humani in parte anter. ʒjs.

Sach. candi ʒj s. s. a. pulvis.

Cujus quidem aliàs ea quantitas, quæ aureo nummo capi potest, horis circiter duabus ante & post singulas quadrantes Lunæ vel simpl. vel cum aquis dictis, vel cum brodio gallinæ non salito vel pingui sumi solet. Quod si rotulas potius aut morsulos expeteret.

Recip. Pul. hujus præscripti ʒj

Spet. Diambre s. mosch. ʒj

N₃

Ciner.

Ciner. involucrorum test. Castorei hirund. ā. ℥ss
Extr. ruthe, angel. ostrutrij ā. gr. v.

Sach. dissol. in aq. flor. Thilia & lilior. convall. vel etiam Pæon. au.
si fortiores velimus in aq. hirund. vel picar. q. s. f. Conf. in rotulis.

Quemadmodum si morsulorum forma arrideret, pulverum dosis au-
 geri & conditorum aliquid admisceri posset.

Utrique verò intentioni, tam eradicationi materiæ morbificæ, quam
 roborationi cerebri, valde conferret lignum pro sudore. Cum præsertim
 materia ista seu tomes in crure seu habitu corporis hæreat: quemadmo-
 dum & furunculorum, hyatidum terminthorum, & aliorum tumorum
 præter naturam minorum materia in extremitatibus istis colligi sæpè non
 solet. Et in hoc quidem subjecto destillatum potius quam decoctum
 præscribi posset. v. g.

Recip. Scob. ligni ℥iij Cort. ejusdem ℥is

Rad. China, Sassafras:

Rad. Pentaph. visci quer. ā. 3vj

Rad. Scorzoner, Pæon. ā. ℥iij

Fol. Euphras. Beton. prim. ver.

Salvia, millesol.

Cardui, Capill. Vener. ā. Mss

Sem. Coriand. præp.

Pæon. excori. ā. ℥iij

Scfel. ℥ij

Fl. Stæchad. Arab. Thilia,

Lil. convall. Pæon. ā. P. j

Cinam. elect.

Nuc. mosch. ā. ℥ij

Macis, 3j Passul. mund. minut. incis. ℥iij. Contusis illis & conquassatis
affunde aq. simpl. ferv. ℔ix. vel aq. flor. ilia, Pæon. Lil. convall. ā. ℔iij
vel potius millesol. Cardui ā. ℔iij.

Flor. Violar. (propter melanchol. succum) Cichor. ā. ℔js. Sten-
per diem naturalem in loco calido post bulliant leviter ad casum par-
is quarta & add. Mithridat. elect. ℥iij. Cor. cervi præp. ℥ij destillen-
tur omnia secundum artem, cujus dosis prius corpore purgato ℥ij vel
circiter manè & sudetur.

Eundem usum sequens præstabit Spiritus:

Recip

Recip. Antidoti Matthioli ℥v

Spir. Vini correcti lib. j

Camphor. ℥ij

Mis. & inde in vitro bene lutato.

Postea calore balnei tepidissimo ita ut nunquam capitellum superius repe-
cat, sed semper frigidum permaneat, destilletur, tam diu, donec tertiam
partem Spir. Vini exceperis. Reaffunde facibus & destilla denuo, ut
prius, idque quaternis vicibus. Dosis cochlear i.

Vacuationi item cerebri locali studendum per masticatoria ex Nuc.
moschatæ & pauxillo piperis, si forsan masticichen horreat. Hoc casu ve-
nementer commendatur pulvis lapidis in vesica tauri repertus, vel per
se, vel cum succo rutæ attractus.

Extrinsècus quoque lotio capitis non incommoda foret, injiciendo
in lixivium nodulum hunc, nisi tamen capillorum tincturam vereatur:

R. Fol. Majoran. Beton. Salvia, Pulegii ā. Mss

Flor. Chamom. Rom. Stæchad. Arab. Ros. rub. ā. Pj.

Agar. opt. ℥ij

Incisa grosso modo in dantur panno lineo mundo, f. s. a. nodulus.

Quin etiam sapo peculiaris parari posset.

Recip. Sapon. Venet. ℥ij. sol. c. aq. Beton. & Major. add. Santal.

Citr. odor. ℥ij. Rad. Ireos ℥j

Salvia, Puleg. ā. ℥ss Ambra gr. ij. f. s. a. Duo globuli.

Quarta, tandem præservandi intentio est, diætæ exquisitioris præscri-
ptio. Cujus quidem magna ratio habenda est, quod absque illa reliqua
medicamenta nihil possint: & secundum Gal. illâ unicâ ferè diuturni cu-
rantur morbi, subtracto scil. fomite, vel etiam cruditate.

1. Aër igitur eligendus temperatus tam in activis, quam passivis quali-
tibus. Inprimis verò vitandus frigidus & humidus: itemque mutatio-
nes aëris subitæ v. g. à frigido ad valde calidum & contrà. Quin etiam
per frigidus & humidus alterari posset fumo trochiscorum ex ligno roseo,
benjoin, thure succino, caryophyll. lg. aloes &c. in vaporario excitato.

2. In cibo observanda & qualitas & quantitas. Quantitas quidem
ut ad satietatem nimiam illè nunquam assumatur: præterea ut cœna quan-
toque sit parcior, quandoque etiam nulla. Qualitas verò ut sit attenu-
ans, neque varius (ob inæqualitatem succi & coctionis) sed quoadlicet
simplicissimus. Ac noti quidem sunt cibi laudabiles, inprimis verò facilis
coctionis, Caro v. g. vervecina, bovina tenera, vitulina adultior, gallina-
rum, caponum, avicularum montanarum &c.

Pisces

Pisces saxatiles, peræ, lucii minores, smarii, funduli. Ac condiri cibi possunt serpillio, pulegio, salvia majorana. Fugendi verò crassum ac viscidum succum gignentis, quales sunt frigidi sua naturâ, pisces & carnes, crassioris substantiæ: aves in locis palustribus degentes. Fugienda verò fercula pingua sale vel aromatis nimium condita, fumo exiccata, frixa, acida: caput petentia, qualia cape, porrum, sinapi. Ex fructibus potissimum conveniunt cappares. Ac assis communiter potius quam elixis (cæteris paribus) utendum, quod hæc fluctuent in ventriculo.

Ordo quoque in cibis servandus, scilicet ut liquidiores præcedant, solidiores sequantur: & inter hos primum elixi deinde assi. Justum quoque oportet esse spacium inter prandium & coenam, ut scilicet prioribus prius digeratur, quam alius ingeratur. A cibo assumenda quæ evaporationem prohibeant, v. g. pyra vel cydonia cocta: per se vel cum Conf. Anisi, Coriandri, Foeniculi, quibus etiam solis aut cum pul. diacydon. uti liceret. Quin & talis pulvis pepticus parari posset.

Recip. *Panis albi tosti* ℥iij

Coriand. præp. ℥j

Cinamomi El ℥ij

Galang. ℥j

Mastic. ʒß

Sach. albiss. ad pondus omnium f.

Tragæa.

Quemadmodum & usitatam tragæam repetere posset. Pani quoque quæ vescitur semen carui vel coriandri præp. vel Fœnic. utiliter misceretur. Potus magna habenda ratio. Cum cito & multum nutriat, neque eo carere possimus. Cerevisia itaque sit clara, limpida, vetustior parumper, non fœculenta. Vina generosa & omnia fumantia fugienda: utendum vero albo tenui, olygophoro scil. Rhenano tenuiori vel Neccarino, ex quo etiam medicatum cum foliis cardui parari posset. Hydromel itidem ex usu esset, modo palato arrideret.

Recip. *Aq. puriss.* ℥ij

Meli. opt. ℥ij

Cinam. El. ʒj

Sem. Anisi ʒß

Fol. Beton. P. j

Salvia ʒß

Coq. ad despumationem, colatura detur.

3. A coena non statim dormiendum, sed ad minimum per hor. 1. aut alteram deambulandum moderatè aut tempus qualitercunque fallendum. Nihil tamen serii tractandum, cum secundum Celsum: Quibus caput affligitur, iis ne cogitatio quidem à coena tuta sit. In dorso quoque non dormiendum neque jacendum aut cubandum: Ac diurnus somnus prorsus fugiendus, nisi assueverit, vel nocturnus brevior fuerit: tum enim sedendo, illi indulgendum.

4. Exercitium sit moderatum, deambulando jejuno stomacho & excrementis rejectis.

5. Excrementa quotidie deponenda, vel sponte vel arte, passulis scil. purgantibus, prunis cum manna paratis. Enematis vel aliis assuetis. Caput quoque manè pectendum, ad sua discutienda excrementa. Balneo si utatur Ol. mastichino vel Nuc. mosch. inungendus ventriculus.

6. Animi tandem affectus, iram præsertim moderatam esse oportet, tanquam vehementius humores commoventem, & in diversa loca cum quodam impetu deferentem.

II. Curationem verò in paroxysmo quod spectat: Prima intentio est, vaporem illum revellere: id quod fit per frictiones manuum, linteorum calidorum, vel etiam intinctorum aqua una superius præscripta: & quidem fortiores.

Secunda, ejusdem vaporis interceptio: id quod fit per vincula seu fascias latas. Quæ & ipsæ in præcautione potissimum locum obtinerent. Deligatione autem seu fascia expressivâ utendum: dictâ fascia primum descendendo (deorsum enim exprimere volumus) mox ascendendo ac rursus descendendo.

Tertia, symptomatum correctio. Et primò quidem motus convulsorii seu epileptici: vel jam jam imminentis, ut ex dolore & molestia cruris potissimum, capitis quoque quandoque gravitate haberi potest. Eo sanè casu, rotulæ ex oleo succini paratæ in promptu semper haberi possunt.

Recip. Ol. Succini gt. iij

Pul. Succini albi ℥ss

Sach. in aq. beton. dissol. ℥iij

F. Conf. in rotulis. Vel

Recip. Ol. Sem. Carui destill. gt. iij

Ambra gris. gr. iij

Sach. albiss. in aq. Lavend. dissol. ℥iij

F. Confectio in rotulis.

Formas illas variando, substituendo scil. pro oleo carui ol. anisi, Quem admodum si ambram vel oleum Nuc. mosch. ferre possit, ejusmodi Confectiones parandæ essent.

Recip. *Ambra electæ* ℥ss

Sach. dissoluti in aq. Tilia ℥iij

F. Conf. in rot. Vel tandem

Recip. *Pul. Nuc. mosch. Macis* ā. ℥j

Ol. Nuc. mosch. express. gt. Xl.

Ol. Macis destill. gt. X.

Cum Sach. dissol. in aq. flor. Pæon.

F. Conf. in rotulis, quarum quedam assumenda.

Circumgestanda quoque simul nux moschata in quatuor partes divisa, ac parum perustulata, ac una illius particula sub lingua continenda. Itemque Oleo nuc. mosc. expr. canthi oculorum majores, itemque nares tum inungendæ.

1. Vel potius subito invadentis, ac paroxysmum ipsum constituentis, tumque luci magis quam tenebris circa lectum ægri studendum: quoniam materia paroxysmum inducens foras evocetur. Quo casu movent nonnulli, diducendas esse palpebras, & candelam majorem oculis accensam objiciendam.

2. Dentes commissi, spatula extracto ruthæ vel levistici inuncta, diducendi & aperiendi.

3. Caput alius paulo tenendum, ne scil. vapores ascendentes replere illud tam facile queant.

4. Membra rigida leniter extendenda: convulsa leviter continenda: ne nimium commoveantur: interim tamen non violenter continenda ne materia dissipari à natura prohibeatur.

5. Crura infra suras tum quoque liganda pro resolutione & derivatione: itemque linteis calidis deorsum fricanda.

6. Eadem crura supra suram, pro interceptione alius materiæ adhuc forsan sursum repentis liganda.

7. Palatum mithridatico inungendum.

Osi injicienda: aq. hirund. aut picarum cochl. j. vel etiam ii, ita simpliciter vel cum pulvere præscripto: vel cum pulvere epatis ranarum, quod gnopere conferre usus & experientia docuit. Itemque cum Syr. flor. Pæon. aut hic liquor rutaceus.

Recip. *Ruthæ* ℥j

Syr. Vini ℥iij aut tantum ut supereminet tribus digitis.

Fiat infusio donec satis colorentur viridi, et potius saporem illius adipiscatur. In liquore dissol. Syr. flor. Pæon. ℥j. Mis. vel liquor castorei.

Recip.

Recip. Castorei ℥j. Spir. Vini ℥iij s. infusio donec probè colore-
tur, vel etiam saporem adipiscatur, in liquore dissolve Syr. Nuc.
mosch. Descriptio hac est:

Recip. Nuc. mosch. ℥vj, macerentur in Vini generosi ℔ss. Expr.
cum Sach. ℥iijss. Coq. ad consistentiam Syrupi, addendo Spica Indica.
Aut Oleum succini, scil.

Recip. Ol. Succini gt. ij. aq. flor. Tbilie ℥j. Mis. quemadmo-
dum etiam extr. rutha itemque levistici gr. v. vel vi in dictis aquis
dissolvi, & eundem in modum exhiberi possent.

9. Patienti olfacienda admovenda castoreum, assa foetida, galbanum.

10. Itemque nares inungendæ five succo ruthæ recentissimè expresso,
per se ita simpliciter, five cum pauco Mithridat. permixto. Sive etiam
hoc:

Recip. Extr. Ruthæ liquidioris, seu Spir. Vini rutacei ℥j. Ol. Nuc.
mosch. per express. fasti ℥ss extract. Calam. arom. ℥j Ol. Fœnic. ℥ss. f. li-
nimentum naribus inungendum.

11. Capiti circa futuram coronalem, utiliter quidem alias imponitur
sacculus, ex Spet. Diambra, Pluris Sarcot. Diamosch. Dul. aromat.
s. moscho ā. ℥ij in syndone ligatis secundum longum & interpassatis.
Quia verò odorata facile ferre hæc nostra non videtur: tale potius cero-
tum parandum.

Recip. Succini albi,

Thuris

Nuc. mosch. ā. ℥ij

Corall. rub. prap.

Sandarac. Arab. ā. ℥j

Flor. Stœchad. Arab.

Salvia

Lavendula ā. ℥ss

Excipiantur s. q. Laudani s. s. a. cum Ol. Nuc. mosch. massa, qua
inducatur aluta pro bregmate: affricetur Oleum Caryophyll. Fœnic.
ā. gr. j, obducatur syndone, interbassetur. Aut inungendus idem lo-
cus Ol. rutaceo, vel etiam succo, aut liquore, aut extracto ejus-
dem ruthæ vel tandem gutta una vel altera Ol. Caryophyllorum.

12. Nonnulli Olei Salviæ gt. ij vel iij miscent, aquæ vel liquori ru-
thæ & immittunt auribus.

13. Crato cervicem inungit Oleo ex ligno Juniperino.

14. Umbilicum autem pinguedine cati sylvestris.

15. Inprimis verò re urgente, paroxysmo scilicet fortiori præsente, clyster ante præscriptus injiciendus: ac dum ille paratur, supposito rium subdendum.

16. Tandem reliquis nihil proficientibus, vesicatorium in cervice excitandum, ex massa antea præscripta.

17. Vel etiam cucurbitulæ siccae occipitio apponendæ.

Post paroxysmum autem roborantium supra adductorum aliquod exhibendum: præterea spina inungenda oleo vulpino, lumbric. terrest. aut unguento resumptivo.

2. Morsum linguæ quod attinet, corrigi potest per mel rosatum, vel etiam rob. nucum & diamoron, pauxillo illis injecto mastiches vel etiam thuris pulverisati.

3. Cumque spasmus quasi crurum, in poplitibus relinqui quandoque soleat: dictæ partes oleo itidem vulpino, lumbricorum, nec non adipe humano inungendæ.

CONSILIUM XV.

IN EPILEPSIA AB UTERO.



Uamvis post tot Clarissimorum virorum exacta de hoc Illustrissimæ Principissæ morbo judicia; meum frustra interponi vel addi, non immeritò multi suspicari possent: tamen quia hoc ab Illustrissimo Principe clementissimè petitur, meam qualemcunque oppellam ut adderem, officio meo humilimè deesse nolui.

Cum autem iste affectus à Clariss. D. Doctoribus adeò dextrè, manifestè & eruditè sit explicatus & conscriptus: ut plenior instructione aut descriptione nemo indigere possit: ideò de eo agam quàm paucissimis, magis ad causam & deinde curativam intentionem, quam ad reliqua respiciendo.

Porro ipsius morbi definitionem aut descriptionem quod attinet, manifestissimè ex symptomatis & signis pathognomonicis patet eum partim epilepticæ partim hystericæ affectionis idæam ac speciem, repræsentare: An verò ratione essentia seu potius ratione sympathiæ hic morbus profiscatur, etiam facile perspicitur, cum causa antecedens sit manifesta, dolorque & sensus ipse de generationis modo & invasione, denique præservatio per vincula, quæ auram malignam illam ascendentem intercipiunt testetur:

stetur : quæ omnia certè hunc morbum magis per consensum quam per essentiam fieri, sufficienter demonstrant. Præcipuè autem hoc ex eo conjiciendum, quod neque ante neque post paroxysmum Illustrissima Principissa vel capitis gravedinem vel aliquam facultatum animalium læsionem sentiat aut experiatur, quod certè si per essentiam in cerebro iste morbus sui ortus primordia duceret, fieri non posset.

Hoc unum imprimis in disputationem vocari potest, cum per consensum hoc malum oriri constet, quânam in parte aut sede corporis hujus mali fomes & scaturigo sit inquirenda; an principaliter in pede ubi doloris & symptomatum initium persentitur & percipitur: an verò alio in loco.

Ego ut ingenuè fatear, quænam hic mea sit sententia (salvo tamen melius & doctius sentiendum judicio) non puto causam latenti hujus mali in pedibus principaliter esse inquirendam aut indagandam: sed potius in utero. Movent me ad hanc persuasionem antecedentia symptomata uterina, cum Illustrissima Principissa uterum gestaret, quæ certè talia fuerunt, ut non possint sine maligni & pravi alicujus vel humoris vel vaporis aut spirituosæ & quasi venenatæ substantiæ in utero latentis suspitione considerari. Nam planè verisimile est, illo toto tempore gestationis uteri vel foetus, sanguine menstruo eoque copioso tam diu retento in Illustrissima persona, ex parte in corruptionem transiisse, pravis aliis humoribus simul retentis, qui alias cum fluxu menstruo exclusi fuissent: ex quo concursu quanta pravitas & malignitas post generari potuerit, omnibus medicis satis notum est, qui uterinorum symptomatum causas & insultus perscrutati & experti sunt. Confirmat hoc omnium maximè & validissimè, primus hujus mali insultus, qui accidit in primis annis, quibus menstrua prima inceperunt fluere. Tum enim & antea nunquam (ut ex literis Illustrissimi Principis percepi) hujusmodi paroxysmos perpeffa est. Ecquid tum hæc eadem symptomata excitavit; cum neque in sura, aut pollice pedis sinistri, vel etiam toto utroque pede aliquid doloris tum temporis persentisceret.

Concludo itaque hunc affectum præternaturalem & formidolosum, locum & sedem suam in utero habere, ibique radices suas fixisse. Quamvis autem initia & primordia hujus mali sub finem utriusque suræ in crure, multis potius latere videri possent: quia ibi doloris initium & hujus mali prima præsensio: tamen considerandum est, hoc non minus vitio uteri contingere posse, quam si in ipsis pedibus causam mali hæere putemus. Nam cum certum sit ex antedictis symptomatibus hystericis uterum malignis & pravis humoribus, sanguineque partim propter diutinam

retentionem corrupto, esse gravatum; facile fieri potest, ut facultas uterina per causam morbificam irritata & stimolata per motum symptomaticum vel convulsivum retrò, per venas & arterias hypogastricas & spermaticas, malignam & venenatam auram excludere conetur, ubi validior vis caloris nativi & reliquorum viscerum principalium, ei obvians interdum illam malignam & virulentam auram per venæ cavæ truncum, & reliquos meatus; rectà in pedes dejicit & detorquet, quo in loco cum calor nativus, tanquam in loco remoto, sit imbecillior, ipsique pori & cutis spiracula magis occlusa, convolvitur, multiplicatur & conglomeratur ille vapor per continuam successionem succedentis vaporis maligni, eò à validioris naturæ vi detrusi, tandemque vires acquirens, quasi per antiperistasin revolvitur ibique virulentiam suam nervis aliisque meatibus remeando inferens cerebro communicatur: unde verè epileptica symptomata consequuntur. Hanc ego pro tenui meo iudicio, potissimam causam huius affectus maligni & formidolosi esse arbitror.

3. Accedit ad hoc incongruentia & ineptitudo istius loci in crure scilicet ad tale, quid & tam virulentum progenerandum, cum neque vasa, neque capacitas tanta isthic locorum sit, ubi tale quid produci facile possit, sicut in utero & aliis visceribus fieri solet. Contestatur & hoc ipsum genus morbi, quod frequentior experientia ex ejusmodi affectibus uterinis sanguine menstruo recenti aut corrupto, excitari annotavit.

Nunc de intentione curativa agendum, in qua ad illam ipsam causam principalem omnium maximè est respiciendum. Præmissis itaque universalibus, suaderem medicamenta uterum & in eo contentam virulentam sentinam respicientia adhiberi: quod omnium optimè fieret mensium promotione, sic enim illuvies illa & radicalis causa extirparetur. Remota hac causâ tandem ad uteri, cerebri & cordis corroborationem per specifica progrediendum. Mensium autem illa promotio non debet esse simplex, sed necessarium est omnino ut habeat respectum ad materiam in utero contentam, quæ cum sit virulenta, & auram quasi venenatam emitat, antidotis specificis simul in expulsione illi est occurrendum. Et hoc observandum esse puto tam in externis quàm internis medicamentis. Quoad interna, maximi facio spiritum ex antidoto Matthioli & Camphora confectum, deinde cum Sacharo & Pauxillo spiritus Vitrioli guttisque aliquot tincturæ Corallorum administratum, secundum formam in appositâ schedula descriptam. Aut si placet hanc aquâ uti, quam mitto, præstantissimam ad huiusmodi affectus & tutam. Sed non omnium est, chymica in usum medicum admittere, præsertim metallica; cum illis aut præparationes aut materiæ ipsæ sint suspectæ.

Ad causæ istius morbificæ ablationem non parum etiam proderunt
terna remedia quæ sanguinem & vitiosos humores deorsum, ex pro-
prietate specifica trahant, & menstrua validè eliciant, cujusmodi proba-
m remedium ex Paracello ad pedum lotiones descripsi. Poterunt his
quandiu usurpatis, incisiones venæ malleolorum aut Saphenæ succede-
re. Ut omni ex parte materia ad exclusionem dirigatur. Quin si vesica-
ria circa suram applicari placeret, non contemnerem vel etiam adversarer.
Restat ut expulsâ noxâ materiâ & humoribus ad corroborationem
um principalium viscerum, nempe uteri, cordis & cerebri transcamis,
æ cum in antedictis medicamentis ferè contineantur, eaque cuivis Me-
so nota sint, non est opus de iis longius differere. Hoc tantum attin-
re volui me magnam spem in Spiritu ex antidoto Mathioli cum Cam-
phora, item tinctura Corallorum, perlisque resolutis, item auro Diapho-
ico ponere. Facit & aqua quam mitto suum etiam officium; sed quid
o aquas in Albim & Rhenum importo, qui hæc non scripsi, quasi alii
eâ instructione indigeant: Sed tanquam officii mei admonitus, humili-
e subjectionis ergò, non quod forsan debui, sed quod potui feci. Æter-
nus DEUS ita omnia nostra consilia regat, & benedicat, ut ad Illustris-
si Principis consolationem & læticiam, Illustrissimæque Dominae sanita-
tem perducantur & promoveantur.

Pro lotione pedum è Paracello.

Recip. *Strobilos abjetum virides, recentes & succi
plenos, manipulos duos. Artemisia ℞. ss.
Sarmenta vel germina borna Juniperi.*

Cortic. fagi ā. Mj.

Chelidonia, fol. alni ā. ℞ß

Uniceroxici, aristolochia rot. ā. ʒv.

*Cog. in s. q. aq. pro pedilavio, in quo lauet manè per
horam dimidiam. Si menses tamen fortiter prorum-
pat, eo cessandum ab his tempore.*

Descriptio Spiritus ex antidoto Mathioli.

Recip. *Antidot. Mathioli. ʒv.*

Spir. Vini correcti ℞j

Camphora ʒij.

*℞. & inde in vitro benè lutato, putrificentur in fimo equino 5. aut 6.
s. Post calore balnei tepidissimo, ita ut nunquam capitellum tepescat,
semper frigidum permaneat, destilletur tam diu, donec tertiam par-
tem*

tem Spiritus Vini exceperis. Reaffunde fecibus denuò destillando, ut antea, idque trinis facias vicibus. Sumat æger de hoc spiritu, manè uti & vespèri in cochleari uno vel duobus ad gut. 4. 6. 8. addito tamen Sacharo Spir. Vitrioli gt. iiii. & Tinctur. Corall. gut. vj, vij. Quod si & diurno tempore quædam ingruitura appareant symptomata occurritur iisce solo huius spiritus usu, sine additione. Addantur insuper manè si calor adsit aq. lilior. alb. ℥ij, si calor absit, aq. pulegii unciz totidem.

Permutatim usurpetur hic Spiritus cum Aqua mea quam mitto, in nominata, ita ut hodiè Spiritus, cras aqua in usu fiet.

CONSILIUM XVI. IN EPILEPSIA. HÆREDITARIA.



Quoniam Vir optime, difficile sit, ita absentibus consulere, ut pleraque aut omnia ex sententia cadant, quod multa intercurandum incidant, quæ intentionem Medici varient, & quotidiana observatio moneat, quid facto maximè ex usu ægrotantis sit. Non potui tamen affini tuo denegare, consilium in hoc tuo affectu petenti. Scribam itaque breviter quod sentiam; faxit DEUS optimus maximus, ut tuæ valetudini conferat.

Adfectus tuus Epilepticus malum est hæreditarium, cum & frater tuus eodem corripiatur, parensque tuus eodem laborarit. Provenire autem ex ipsa cerebri *ιδιοπαθεια* sive primaria adfectione, signum est, quod post paroxysmum ut intelligo caput doleat, oculi obscurentur & caligent, & maximè quod inter dormiendum corripiatur. Benè facit, quod hoc tempore morbum oppugnet. Secundum Hippocratem enim in aphor. Vere magis hic morbus irruit, & eodem tempore magis periculosus, plures enim jugulat.

Quoniam autem integrè ab hoc malo liberari non possit: eodem enim Hipp. 5. aph. 7. teste, Comitialis morbus qui post xxv. annum durat, difficilimè curatur, & ut plurimum commoriuntur. Attamen hoc non effecturos spero, ut rarius occurrat, & levior ipse paroxysmus evadat. Eligendus igitur tibi aër moderatè calidus & siccus, vitando ex adverso illum in contrariam qualitatem degenerantem.

Utere prætereà corporis exercitio moderato, caputque jejunos calidi linteolis confricare & pectine poros aperire curato.

Moderatus usus Veneris juvat, immodicus contra plurimum nocet.

Quod ad victus rationem attinet, Is secundum Gal. in lib. de attenuante victus ratione sit extenuans & incidens. Ita enim inquit: Epilepsias parvas, & nunc incipientes, attenuans victus penitus sanat, consummatas verò non mediocriter juvat. Condiuntur itaque alimenta cinamomo, maci, zinzibere, Sem. carui, Coriandri, Fol. majoranæ & Rad. Petroselin. Carnes conveniunt avicularum montanarum, gallinarum, Caroturdorum & passerum commesta, specifica proprietate adversatur Epilepsiæ. Vitabis pisces, carnem suillam, anserinam & omnia fumo indurata, & simul universa leguminum genera, cæpas item, sinapi, allium. Capparum usus plurimum prodest. Fuge item vini meracioris usum, & flatuosarum cerevisiarum potum.

Bibes hydromel ex aqua, in qua decocta sunt cinamomum & coriandri semen præparatum. Somnum diurnum ut pestem fugias, sitque nocte mediocris. Sollicitudines, timores aliaquæ animi perturbationes maximè vitentur.

Cavendum quoque sedulò, ne alvus sit obstructa, id si contingat, statim supposita glande, vel communi clystere leniatur.

Quod ad curationem spectat, tertio à paroxysmo die utere hoc decocto A. ex quo sume manè haustulum unum ℥iij & hor. 3. à prandio, quo exhausto utitor hisce pilulis B. quas omnes uno tempore deglutias, superforbendo Cochlearia 5. juris pulli. Postridie à purgatione (dejectâ prius alvo) vena secetur cephalica dextri brachij. Altero à purgatione, reliquæ humorum per palatum sequenti gargarismate C. subtrahantur. Sequentibus diebus sume ex hoc Electuario D. semijuglandis quantitate.

Et quamvis videas te menstruo spacio horum auxiliorum administratione, parum aut nihil profecisse, non ob id tamen abjicias animum, aut desperes, sed firma spe valetudinis concepta, altero vel etiam tertio si opus fuerit mense usum dictorum remediorum exceptâ phlebotomiâ continuare alacriter pergas, minimè dubitans, ejusmodi constanti repetitione, perniciosi hujus affectus materiam, si non penitus profligandam ac superandam, magna tamen ex parte mitigandam imminuendamque fore, idque eò magis, si nunquam non diligens & exacta victus habeatur ratio.

Transmitto etiam descriptionem aliquam Aquæ Cephalicæ vel vitæ E. quam tibi parari curato. Nollem tamen ipsam in multorum manus venire, est enim una ex iis, quæ animo meo gratæ sunt, quam etiam tibi ut amico communico. Quomodo, quo tempore & quantitate hanc aquâ utendum, proximè ad te scribam. His valde, & si quid præterea incidit, quod ad hujus mali cutationem facere videatur, si literis, id significaveris,

aut per affinem tuum me certiore feceris, non committam ut vel in minimis, studium meum ac operam jure desiderare possis.

Recip. Samsuchi, Stæchad.

Arab. Rorismar.

Hyssopi, Beton. Meliss.

Salvia, Centaur. min.

Cardui bened. ā. Mß

Rad. Pæon. Cichor. ā. ʒß

Sem. Pæon. Cubebar. Cardam.

Agar ā. ʒj

Sem. Carthami conq. ʒvj

Fol. Senna sine stipit. ʒß

Concisis concidendis, & contusis contundendis in cantharo stanneo bene fermento oblinito Coq. in tñij per duas horas, ne quid exhalet coletur, postea ubi refraxeris,colato & add.

Syr. de Stæchade, de Cich. c. Rhab. de betonica ā. ʒiij. f. potio. A.

R. Mass. pill. Cochiar.

Arabicar.

Troc. de agar. ā. ʒj

Ex his simul mixtis formentur pill. n. xv. cum aq. majorana. S. Pilula B.

Recip. Pyrethri ʒß Sem. eruce ʒvj

Majoran. Hyssopi ā. Mß

Concisa & contusa coq. in aq. & aceti ā. tñj f. gargarismus C.

Recip. Conser. Beton. Salvia ā. ʒj

Rorismarin. ʒß

Rad. Cichor. cond.

Corr. citri cond. ā. ʒß

Spet. Diamosch. d.

Diambra ā. ʒjs

Pul. visci q. ciner, cuculi avis, Cranei homin.

Corall. rub. prap. ā. ʒj

Sem. Pæon. ʒjs

O. Cinamomi ʒß

Cum f. q. Syr. de Cichor. f. Electuarium D.

Recip.

Recip. *Aq. stillaticia Junip. ℥iij*
Flor. Lil. convall. ex stipit. d. cerptor. Mij
Salviae M. j.


Macerentur in sole aut post fornacem diebus 14. deinde fortiter exprimantur ac colentur. Colato liquori rursus indantur.

Confer. Rosimar. Lavendula ā. ℥ij
Sper. Di. mosch. dul. Diambra ā. ℥ij
Sach. cand. in aq. Lavend. s. ℥ij

Omnia sic mixta macerentur per mensem, ac tandem destillentur Chymicā arte vitro in arenam collocato.
S. Aq. Cephalica E.

CONSILIVM XVII.

IN EPILEPSIÆ CURATIONE.



Um tota morbi natura sit explorata, & qualis sit, jam constet liquidò: nihil aliud jam nobis faciundum, quam ut medicamentis propriis, & morbo huic profligando accommodatis, curationem aggrediamur, quam præsens tamen Medicus, pro circumstantiarum ratione, semper moderari poterit. Actionem autem hanc curativam à corporis præparatione auspicari oportet, quæ probè administretur, dum primò meatus, per quos humores transmittuntur & attrahuntur, à medicamentis purgatoriam vim sortitis, aperiuntur & referantur, ne humores attracti alicubi subsistentes, purgationes efficiant difficiles & laboriosas.

Primò igitur Bolum capiet ex Electuario lenitivo, notatum A. tribus horis ante prandium. Hoc medicamento ubi primæ corporis viæ excrementorum copiâ fuerint liberatæ, deinde humores pravi præparandi veniunt, & præparati educendi. Hoc efficietur, si quarta vel media pars Syrupi de Palmâ Christi B. conficiatur. Hujus ℥js cum tribus uncis decocti Sennæ cum Epithym. descriptionis Mesuæ, exhibeatur tribus quatuorve horis ante prandium, & ejus usum continuet per 6. vel 7. dies. Singulas hujus Syrupi doses exhauriat calidas, & per hor. unam in lecto quiescat, donec medicamentum caloris vi in sui ipsius opus deductum, vires suas exerere incipiat. Tunc verò in conclavi calidiusculo lentè obambulet, quo in

tam antiquo & pertinaci morbo, cum humores pravi unâ atque alterâ vice educi nequeant. Interpositis aliquot diebus, & viribus parumpér reffectis, non solum utile est, sed omninò necessarium, alteram evacuationem totius corporis instituere, ut remotis omnibus impedimentis, humores radicitus extirpentur, antequam ad destillatum deveniatur. Id enim requirit corpus exquisitè mundum. Quapropter conficiatur Syrupus litera F. & ebibat ejus cochlearia quatuor aut quinque calida, hor. 5. matutinâ, & similiter se gerat, ut antea præceptum, donec totus sit absumtus. Si ab assiduo ejus usu vacuationes nimium successerint, integrum esto diem interponere, & ejus loco sumere morsulum literæ P. & sequenti die ad Syrupum redire, donec totus exhauriatur. Dein verò item uno die interposito, pillulæ Nitro G. sumi repetique possunt, modo, quo dictum, nempe cum succo eam ad rem præscripto, nempe H. Sumantur hæc manè hora 7. peracta purgatione cicerum rubeorum jus sorbeat. Sequenti verò die antidotum literæ I. assumat. His medicamentis usurpatis, applicandus erit animus ad usum Aquæ L. sudoriferæ, quæ se in latentes corporis partes altissimè insinuat, idque tam diu, usque dum vi pharmaci purgatio absolvatur.

His ita factis, consequens erit, uti medicamento, quod ex alto & è radice ipsa excrementa extrahat. Hoc facient pillulæ Alexandri lib. 1. cap. 12. de Nitro vero, literæ C. quæ in frigidis capitis affectibus, & morbis potissimum comitialibus sanandis maximâ vi pollent. His cum Oxymelite Scyllitico literæ D. in aurora septem horis ante prandium deglutitis, ad quietem & somnum se componere convenit, ita tamen ne fudet: sic n. felicius opus consequetur. At cum jam operari inceperint, somno abstinuissè præstiterint, ne medicamenti opus impediatur.

Curandum quoque est, ne aëre frigidiorè admissò, noxa aliqua corpori inferatur. Purgatione perfectâ & ad finem perductâ, paulò ante prandium sorbitio danda è Cicerum rubeorum decocto, cum Sachari rubri momento, ut si quid pharmaci in ventris aut intestinorum anfractibus substitisset, eluatur ac detergatur. Et quia fieri plerunque solet, ut viscerum robur purgantium usu debilitetur, æquum est imposterum diem ab assumpto pharmaco, antidotum, quæ notata est litera E. vel I. dare, post mediam noctem, ut partes evacuata roborentur & confirmentur. Hæc enim antidotus, ignis instar, quicquid mali relictum, absumit, & in auram dissipat. Sed quia metuendum, ne particulae aliquæ purgantium, in intestinorum rugis & plicis relictæ sint, quæ tenesimum aut tormina pun-
ctione sua inferant, clystere detergente intestina abluenda sunt, literæ K.
vesperi

vesperi, antequam manè sequenti die prima istius aquæ destillatæ sudoriferæ dosis assumatur. Exhaustat verò istius liquoris destillati manè in lecto quinque aut sex horis ante prandium, tres aut quatuor uncias, pro virium tolerantia, componat se iterum, ut sudare possit. Magnæ virtutis est hæc aqua, suâ enim tenuitate humores attenuat, poros refferat, sudores cit, & arcanâ ac clanculariâ facultate morbo huic adversatur. Hoc liquore dum utitur, cubiculo non egrediatur, nisi à prandio, & coelo sudore serenoque, & aëre calido. Victu utatur boni succi, qui citò coquatur, nihilque vel parum recrementi relinquat. Vinum bibat oligophorum, non crassum. Cum alvus durior est, emolliatur Electuario litera M. cujus juglandis magnitudine portiunculam devoret, & eò die ab aqua sudorifera abstineat: Postea ad eam redeat, quousque tota Aqua sit exhausta. Nec incommodum etiam erit, simul pilulas de nitro interdum exhibere. Corpore jam ab excretis liberato, consequens est, ut medicamentis utamur, quæ suâ vi absconditâ affectionem cerebri, unde symptomata hæc procedunt, removeant, & prorsus deleant. Igitur circa mediam noctem, cum expectatus fuerit, capiat bis in septimana de Electuario N. Castaneæ magnitudine, & iterum dormiat. Obstacula enim obstructionum cum jam sint remota, promptè hæc medicamenta ad cerebrum transire poterunt, & in altum penetrando suas facultates exerere, ità ut nos voti nostri fiamus compotes. Et ne nimium uni assuescat remedio Natura, manè quandoque, cum nocte illâ nihil Electuarii N. assumerit, Morsulum P. tum devorare poterit. Et si nonnunquam aliquid adversitatis ægrum adoriri contingeret, & ut ità dicam, imperum hostis præsentiret, quod fieri conuevit, dum Luna facies mutat suas, dum nocte aut vesperi capere debet naustum illum ex succo Rutæ litera O. quò nihil est in avertendis & interceptiendis paroxysmis epilepticis efficacius. Ut etiam mala illa cerebri dispositio deleatur & oblitteretur, ex re erit, usurpare nonnunquam Electuarium ex cineribus cuculi & hirundinum, literâ Q.

Atque hæc remedium genera in tam gravi & pertinaci morbo afferre volumus: quæ cum efficacissima sint & huic affectui curando accommodata, confidimus, juvante Deo, illum his iri profligatum & deletum.

Recip. Electuar. lenitivi

Diacarth. ā. ʒij

Spet. Hieræ J. ʒij

Cum Sach. fiat Bolus A.

Syrupus de Palma Christi.

P 3

Recip.

Recip. Rad. Palmae Christi

Pæon. ā. ℥iiij

Pyrethri ℥j

Fœnic. Pentaphyll. Elleb. nig. præp. ā. ℥vj

Caryophyllor. ℥ij

Stæchad. Arab. ℥ij

Epithym. Cret. ℥j

Origani, hyssopi. Beton. Ruta ā. M. ij

Chamaepith. Pentaphyll. ā. M. j

Lig. aloes. Sem. citri ā. ℥iiij

Siler. Montan. Cardamom. ā. ℥ijs

Zinzib. Spica, Visci quer. ā. ℥ss

Turpeschi ℥vj

Rorismar. M. j. ss

Nucista ℥iiij

Bulliant in f. q. aq. ad mediet. Colat. adde

Succi Palmae Christi,

Pæon. depurat. ā. ℥iiij

Oxymelit. Scyllit. Sacchari opt. ā. ℥bj

Fiat Syrupus mediocriter coctus.

Recip. Huius Syrupi ℥jss.

decocti Sennæ cum epithymo ℥ij

Mis. f. haustus. Repetatur septem
vicibus.

R. Maß. Pilular. Alexand. de nitro ℥ij

Mastichin. ℥ss

Cum aq. Cinamomi forment. Pill. ix. vel ix

S. Pilula C.

Recip. Mellis Scyllit. ℥ij

Oxymel. Scyllit. tantundem

Mis. S. Succus pro usu pillularum D.

R. Mithridat. Elect. ℥ij

Theriaca Andromach. vetustiss. ℥ss

Conser. Flor. Stæchad. Borag. ā. ℥jss

Mis. S. Mixture Saccharata E.

Recip. Flor. Stæchad. utriusque anthos,

Lavend. Pæon.

Palmae Christi ā. P. j

Borrag. Bugloß. ā. ℞.js

Epithym. Cres. M. j

Rad. Pæon. Filipend.

Vici querc. ā. ℞.vj

Fœnic. Petrosel.

Asparagi, brusci in vino maceat.

Rad. Borrag.

Bugloß.

Glycyrrhiza ā. ℞.j

Sem. Carthami ℞.ij

Citri ℞.j

Anisi ℞.s

Fœnic. Cymini, Carni,

Palm. Chr. Pæon. ā. ℞.iij

Dauci, sileris Montani ā. ℞.ij

Cori. Microbal.

Chab. Beller. Indor. Oleo

Amygd. dul. fricat. ā. ℞.ss

Helleb. nig. præp. ℞.ss

Caryoph. ℞.ij

Turpethi albi & gummosi ℞.iijss

Herb. Beton. Origani

Pentaphyll.

Chamadri.

Chamapit.

Calamenth. Mont. Salvia

Filipend. mentha,

Satureia, Ruta ā. Mss

Capillor. omn.

Melissophyll.

Cichor.

Endivia

Borrag.

Bugloß. ā. M. j

Flor. Senna ℞.ij

Agar. trociscat. ℞.j

Zinzib. ℞.ij

Coq. lege & ordine artis pro ℞.xv. Colatura adde Syrupi Stæchad.
mell. anthos. Oxym. scyll. ā. ℞.js

Succi ruta de pur. ℥j. Sachari opt. ℥ ix.
Fiat Syrupus mediocriter coctus aromatizetur cum

Spet. Diamosch. dul. ℥ij

Diambre, nucista, Cubebar. ā. ℥j

Aq. Cinamomi ℥js

S. Syrupus F.

Recip. Maß. pill. Alex. de nitro vero 3ß

Aloephang. ℥ij

Cum succo ruta f. pill. n. 9. vel. 11

S. Pil. G.

Recip. Mell. Scyllit.

Oxymel. Scyllit. ā. ℥iij

Mis. S. Succus H.

Recip. Mithridat. Electi ℥ij

Theriaca ver. 3ß.

Mis. S. l.

Recip. Flor. Stæchad.

Centaur. min. ā. Maß

Chamomel.

Beton.

Mercurial.

Parietar.

Acanth. malva, alth.

Violar. ā. M. j

Furfur. lig. in petia P. iij

Sem. Lini, Pæon. ā. 3vj

Carui 3iij

Rad. Pæon. Vis. q. 3ß

Coq. l. a. pro ℔j. Celat. addas

Hiera Logad. 3ß

Hiera picra 3vj

Elect. lenit. 3j

Mell. anthos. ℥js

Ol. Nuc. Chamomell. ā 3js

Salis 3ij

Vitell. ovor. n. j.

Mis. pro Enemate K.

Recip. Lig. Guaiac. ℔j. Cort. ejusdem 3iij

Rad. Pal. Chr. & Sem. ejusdem ā. ℥iij

Rad. Pæon. & Sem. ejusdem ā. ℥js

Pyret. ℥j

Visci querc. ℥js

Fol. Lauri Mß

Bacc. lauri ℥ß

Flor. Stæchad. Mß

Borrag. M. j

Vini albi opt.

Aq. Salvie, Meliß.

Chamomill.

Rutæ, Borag. ā. ℔ iiij

Beton.

Pentaphyll. ā. ℔v.

Infund. in vitro luto chymico obducto

per hor. xij. postea adde:

Passul. min. ℔j

Epithym. Cret.

Polypod.

Ceterach. ā. ℔s

Conser. eleny, Beton.

Acori, Anthos.

Pentaphyll.

Stæchad.

Scichor.

Borrag.

Melissæ. ā. iiij

Succi Rutæ & Pal. Chr. ā. ℥iij

Mithrid. & Theriac. ā. ℥j

Spec. Diamb.

Diacym. ā. ℥ij

Destillentur summa diligentia sine fumo & favillis: destillatum
transmittatur per manicam Hippoc. Super Cinamom. Pul. ℥j.

Ligni aloes ℥js.

S. Destillatum L.

Recip. Conser. Stæchad.

Anthos.

Beton. ā. ℥ß

Spet. Diatrion piper. 3vj
Cort. citri condit. 3j

Spet. Diacym. 3j
Diamosch. dul.
Diamb. ā. 3ß.

Ol. Anisi 3j
Succini albi gr. vij.

Spet. Elect. Diaphœnic.
Noviter dispensat. 3vj.

Cum Syr. de corticibus citri f. Elect. solidiusculum.
S. Electuar. leniens M.

Recip. Mithridat. El.
Diamosch. dul. ā. 3j
Pieris Archont. 3vj
Diamb. 3ß
Nucisß. 3j
Conf. Anacard. 3jß

Cum Syr. de Stæchad f. Elect.
S. Electuarium Nocturnum N.

Recip. Succ. ruthe 3ij
Mis. f. haustus O.

Recip. Spet. Diamosch. dulc. 3iiij
Diamb. 3ij
Pieris Archont. 3j
Smaragd. prap. 3ß
Vis. quer.

Sem. Pæon. ā. gr. vij
Pyrethri gr. v.
Conf. Stæchad.
Lavendula,
Borrag. ā. 3j

Nec. Ind. condit. 3ij
Sach. albiß. dissol. in aq. Rosmar. f. a. j.
Conf. in Mors. pond. 3ij
S. Morsuli F.

Recip. Conf. Stæchad,
Anthos.
Pæon.

*Lavend.**Acori cond. ā. ʒß**Conf. Borræg.**Bugloß. ā. ʒij**Helenij cond. ʒj**Spet. Diamosch. dul.**Diambræ ā. ʒjs**Nuc. condit. ʒß**Ciner. cuculi, hirundin. ā. ʒij**Cum melle anthosato formetur Elect.**S. Electuarium 2*

CONSILIUM XVIII.

DE PECULIARI PRAEPARATIONE
ET USU QUORUNDAM MEDICAMENTO-
RUM ANT-EPILEPTICORUMAQUA PROPHYLACTICA AD AFFECTUS
Cerebri, ut Apoplex. Epileps. &c.

Recip. *Flor Lilior convall.* lbß quæ imponatur fictili vitreato juxta magnitudinis & affundantur vini Cretici optimi lbj. Deinde R. Piperis longi pulverisati & in lineo ligati ʒß & suspendatur in fictili dicto, ita ut propè attingat vinum Creticum, sed ab eo non madesiat, similiter suspendatur frustum aliquod auri puriss. sed ita ut innitatur vino & floribus, postea claudatur fictile & muniatur diligenter undiquaque m. ssa panis cruda, & sepeliatur in terram siccam, & relinquatur per dies xiii, denique eximantur & destillentur per Balneum Mariæ, Aquæ huic destillatæ imponantur piperis longi ʒiij, & relinquantur in ea semper, exponanturque radiis solaribus. Hujus aquæ bibatur cochlear unum loco prophylactici, ante Lunæ mutationes.

AQUÆ CERASORUM DESCRIPTIO.

Accipiantur Cerasa nigra sylvestria, vulgò schwarze Vogel-Kirschen, unà cum nucleis suis contusa, & addatur subduplum florum Lavendulæ & tantundem Seminis sinapis. Misceantur diligenter, & infundatur tantum vini generosi & albi q. s. & in fictili vase, benè obturato reponantur in Cella, per octiduum, deinde F. destillatio s. a. Hujus aquæ as-
 Q² lumi-

sumitur cochlear unum cui addatur drachma una pulveris sequentis, idque singulis mensibus semel, die, proximo post novilunium.

Recip. Succini albiß. ℥vj
Spet. Diarrhod. Abbat ℥iij
F. Pul. subtiß.

AQUA AUREA DICTA.

Recip. Flor. & sol. Salvia ℥iijss
Fl. Lavendula ℥iij
Rorismarini ℥ij
Majorana ℥j

Gran. Pæoniæ
Calam. aromat.
Zedoaria ā. ℥ij
Aureos Ungaricos X.
Vini Cretici ℔ iij.

Stent. infusa per dies 14. aut plures, postea add. Granor. Paraisi ℥ij ac fiat destillatio s. a.

AQUÆ CEPHALICÆ CUIUS ET ALIBI FACTA EST MENTIO, DESCRIPTIO.

Recip. Flor. & sol. Salvia minoris ℥iijss
Flor. Lavendula adorat. ℥ij
Lilior. convall. ℥iijss
Rad. Pæoniæ ℥ij
Fol. & flor. Majoranæ
Cubebæ.
Cinamomi ā. ℥ij
Caryophyllor. ℥iij
Macis ℥ij

Infundantur omnia s. q. Vini Rhenani per dies xlv. deinde fiat destillatio per Alembicum vitreum.

S. Aqua Cephalica.

DECŒCTUM LIGNI GUAJACI ET SARSÆ.

Recip. Scobis ligni Guajaci recentis,
Rad. Sarsæ Parilla concisa ā. ℥ij
Flor. Stæchad. Arab. ℔ j
Herb. Beton. M. j

*Endivix**Cichorii ā. Mß**Sem. Anisi ʒij**Pœon. ʒj**P.ſſular. min. conquaſſat. ʒvj**Glyzirrhiſæ roſæ ʒij*

Hæc macerentur horis xxiv. in aquæ puræ ℥iij, Vini Rhenani ℥j, tea decoquantur in fictili vafe mundo & puro, ad dimidias, & poſtea Hujus decocti ſumantur pro haufu ſudorifico manè in lecto ʒviij expectetur ſudor, qui ſi ſponte fluat non impediatur naturæ motus, minus promoveatur fomentis foris applicatis. Poterit autem hoc fieri ſtidie, vel alternis diebus.

Cæterum relictæ materiæ decocti jam præſcripti addi poterunt Scobis Guajaci ʒjs & ſuper infundi aquæ puræ ℥vij Vini Rhenani ℥j & maceri hor. 24. tandemque decoqui, ut tertia pars abſumatur. Relicto ſumendum in prandio & cœna pro potu familiari.

Quod ſi decoctionem pro potu tantum parare velis, nec eâ uti ad ſudores, quantitati Sarſæ ʒiij & ligni ʒv, Stœchad. Arab. P. j. Be. M. j. Endivix & Cichorii ā. Mß, Sem. Anifi ʒij, Pœon. ʒj infunde aquæ puræ ℥viij, Vini Rhenani ℥j & macera horis 24. tum decoque, tertia pars propè abſumatur, & colaturâ utaris pro potu. Cui ſi rurſus adjicias ſcobis recentis ligni ʒjs & tantundem Aquæ & Vini ut præſcriptum eſt affundas, maceresque horis 24. decoquasque ut ſupra traditum erit decoctum ad potum utile. Interea dum hiſce uteris commodum fuerit octavo quoque die ʒj Pilular. Cochiar. & aurearum degluti.

Sumantur autem cochiarum ʒij & aurear. ʒj. Quoniam verò Meplerique ante exhibitionem hujus decocti, univerſalem evacuationem mittendam eſſe, neceſſarium ducunt, nolim te eam proſus negligere, ut ex conſilio clariffimorum virorum Dn. N. & D. N. eâ utaris ſua.

Perficietur autem hæc tribus modis. Laxativo aliquo commodo haufu, ſectione venæ & potionem humores noxios partim præparante, ſim præparata leniter ſubducente. Hæc intentione adminiſtrata, ſequeretur altera, nimirum humorum ſuperfluum in ambitu totius corporis contentorum, per ſudorem conſumendo, quæ decoctionis ligni ſuperius deſcripti uſu commodè perficeretur. Et autem hujus uſus continuari per dies ad minimum xiiij plures vel citiores etiam, pro ut ſudor citius vel tardius erumperet, ac etiam plus minusve flueret.

Cessante sudore majori dosi, largius fluente eodem, minori utendi dosi. Ante singulos haustus hujus potionis sudorificæ posset etiam frictio artuum & dorsi, tantisper dum sponte flueret sudor absque præsidio. Post sudores non fuerit abs re, uti rotulis ex galangæ extractione ad tonum viscerum servandum.

Porro pro particulari evacuatione cerebri majorem in modum conducunt medicamenta, dicta Errhina & Apophlegmatismi quorum hi præcipuè per palatum, salivam & pituitam proliciunt, & expurgandi cerebri ventriculos, quibus via declivis est in palatum, majorem vim obtinent. In hunc usum accommodantur gargarism & maslicatoria. Hæc formula talis ferè esse posset.

Recip. Sem. Staphidis agrie

Rad. Pyrethri

Cubebæ.

Rad. Ostrutii

Masticis ā. ℥j

Omnia in pulverem redigantur, & formentur globuli parvi ex linteo Illius verò nempe Gargarismi formula talis esto.

Recip. Rad. Fœnic. ℥ss

Pyrethri ℥ij

Fol. Majorana

Betonica ā. M. j

Salvia

Hyssopi

Origani ā. Mss

Caricar. ping. n. viij

Glycyrrhiza rasa ℥j

Masticis ℥j

Sem. Anisi

Fœniculi ā. ℥ij

Decoquantur secundum artem in ℥iij aquæ ad consumptionem medietatis, & colatura addatur

Oxymelitis comp. ℥iij

Mell. Ros. colat. ℥j

Nuc. moscat. ℥ij

Caryophyll. ℥j

Cardomomi

Cubebæ ā. ℥j

um bulliant 9. s. pro aromatizatione, postea colatura servetur usui.

Hoc decocto utendum est gargarizando, manè jejuno ventre, & post subjugendus usus unius globuli masticatorii descripti, vel loco ejus sufficetur aliquid mastiches, aut nucis moschatae, vel cardamomi, vel Caryophyllor zedoariae, item, quæ commandicatione suâ pituitam per os palati elicere, ac in os trahere possunt.

Naribus autem commodè admoveri poterit, nodulus aliquis, ad se-
mentem vel similem formam paratus.

Recip. *Nigelle tosta leniter* ʒjss.

Majorana sicca ʒj

Nuc. Moschata

Irid. Florent. ā. ʒß

Caryophyll. ʒj

Fiat pulvis crassiusculus, qui detur in sacculo ex syndone nigro.

Hic sacculus potest infundi ad horas aliquot in aceto rosaceo, ut ar-
taceri adjuvet penetrationem odoramentorum, & ut idem acetum post
ceptam inde aliquam vim, loco errhini ex vola manus in nares trahatur.

Si mavis simplicibus uti, sampuchum seu majoranam naribus im-
pono, ea enim mucum & pituitam blandè expurgat. Idem præstat salvia
betonica, & in alterutrum narem indita.

Beatae quoque & brassicae succus introrsus naribus immixtus capitis
pituitam elicit, cæterisque humoribus exonerat.

In his prolixior sum, quod intelligam te coryza & obstructis nari-
bus sæpius vexari. His omnibus peractis roborando capiti utilissima fue-
rit lotio, qui constabit ex sequentibus:

R. *Herb. Betonica*

Majorana ā. M. ij

Fl. Stæchad. M. j

Flor. Chamomel. Ital. M. j

Scob. Ligni guaiac. ʒiij

Agarici in linteolo ligati ʒß

hec in lixivio nonnihil ebulliant, & macerentur horis xxiv. rursus effe-
rescant & colentur, ferventurque ad usum.

A lotionem & exiccationem capitis aquâ nostrâ cephalica odoratissima
nè calida posterior capitis pars, tempora & futura coronalis inungi de-
bet. Fuerit etiam non inutile, post lotionem & exiccationem vino sub-
merso calido caput abluere, continuè manibus fricando, donec magna ex
parte

parte vini sublimati subitanea inter fricandum absumpta sit. Si quid humoris capillis videatur insidere, id calidis linteis exiccandum.

Caput quoque alias quotidie manè ab alvo evacuata exiccetur linteis calentibus sive multa frictione.

Pro corroboratione capitis assumat etiam vesperi semper aliquid Conservæ florum Rorismarini, cui aliquid masticeis sit permixtum, eique addas cubebæ gr. 2. vel 3. & superbibas cochlear unum Aquæ Cephalicæ.

Victus porrò ratio hæc servanda tibi est, infra modum bibendum & coena erit parcior. Vitabis alimenta quæ multum evaporant. Et moderate temperatis utere, nam frigida offendunt ventriculum, calida hepatis, justo calidiori (ut videtur) officiunt, ob id modus in victus ratione calida frigidaque tenendus.

Prandium & coenam si claudes cydoniato, cui aliquid cinamomi sit permixtum, vel etiam semine Anisi & Coriandri Sacharo incrustatis, ad os ventriculi claudendum rectè feceris.

CONSILIUM XIX.

IN EPILEPSIA.



NE superiorum de quibus satis verborum fecimus, tædiosa hic fiat repetitio, dico materiam Epilepsiæ esse plerunque melancholicam cum pituitâ mixtam. Causæ epilepsiæ similes tres sunt, vel à partibus extremis, vel ab inferioribus visceribus, vel ab ipso cerebro. De reliquis duobus prioribus dictum alibi de eâ quæ à cerebro, specie hic mihi futurus sermo. Est autem ea insita mala qualitas ventriculorum cerebri, orta ex putrida fuligine melancholicæ & pituitæ. Nam maligna & occulta qualitas cerebro more venenorum infensa est, & est eadem penè causa uteri strangulatus. Gal. 6. de loc. aff. Quod autem causam agnoscat venenatam qualitatem, id probatur ex diuturnitate morbi. Nam diuturnitas morbi intemperiem occultam & malignam denotat: obstructio autem diu durare non potest, cum paroxysmus non prius cesset, quàm solutâ obstructione. Non tamen penitus à ratione causæ morbificæ pituitosum vel melancholicum succum, hic excludum aut eliminatum volumus, illum quidem ob initium, istum vero propter moram. In usum ergò ducantur sequentia:

Reci

Recip. Flor. Chamomel.

Malva, parietar. ā. M. j

Sem. Lini, Fœn. grac. ā. 3vj

Carthami 3ß

Anisi 3iij

Carui, Cymini ā. 3js

Rad. Polypod. querc. 3ß

Althea, Lilior. alb. ā. 3vj

Furfur. crass. ligat. in petia M. j. ß

In colat. dissol. Elect. hiera simpl.

Diaphœnic. lenit. ā. 3ß

Mell. Rosar.

Anthosat. ā. 3jß

Vitell. Ovor. n. 1.

Mis. f. Enema.

Recip. Rad. Polypod. querc.

Sem. Fœnis. ā. 3iij

Fol. Senna f. stip. 3ß

Epithymi Cret. 3j

Cinam. 3ij

Coq. in f. q. aq. pro 3iij. In Colat. inf.

Rhabarb. Elect.

Aq. Endivia irrorati 3ij

Agarici noviter trocis. 3j

Cinam. 3ß

Schœninki 3ß

Infund. h. g. expressioni adde Syr. capill

℞ 3vj Mis. f. Haustus.

Recip. Rad. Fœniculi

Petrosel.

Polypod. querc.

Cicbor. ā. 3jß

Flor. Borrag.

Bugloss. ā. Mß

Stæckad. P. j

Coq. pro 1ßj. R. hujus decoct. 3iij add.

Syr. de Stæckad.

Syr. de Mellis anthosati

Oxymel. simpl. ā. ℥ss

Mis. f. Digestivum.

R. Rad. Petrosel.

Polypod. querc.

Sem. Caribami ā. ℥iiss

Passular. mundat.

Col. Senna Alexand. ā. ℥iiij

Epithym. Cret. ℥j

Cog. pro ℥iiij. In Colat. dissol.

Spet. Hieræ simpl.

Diaphenic. ā. ℥ij

de citro. exol. ℥iiij

Oxymel. squillit. ℥ss

Mell. anthosat. ℥ij

M. f. porio.

Hinc venæ sectio sequatur, ad perfectionem curationis aliàs admodum necessaria. Post

Recip. Rad. Pæon.

Visci quer.

Palma Christi

Pentaphyll.

Calami aromat.

Filipendula ā. ℥ss

Rad. Borrag. Bugloß

Fænic.

Petrosel.

Helenij ā. ℥vj

Asparagi

Cichorii ā. ℥j

Polypod. quer.

Sem. Caribami ā. ℥ij

Sem. Citri

Palma Christi ā. ℥j

Anisi

Carui

Cymizi

Fænic. ā. ℥iiij

Sem.

Sem. Pæon.

Dauci ā. ʒiʒ

Passular. ʒj

Fic. ping.

Dactylor. ā. n. viij

Rad. Elleb. nig. Syr. præp. ʒiij

Caryophyllor. ʒij

Turbitib. ʒij

Zinzib. ʒjs

Cort. Mirobal. Chebul.

Bellir.

Indor. Ol. amygd. dul. præp. ā. ʒss

Herb. Borrage.

Bugloss.

Rutæ

Fumar.

Capill. omnium

Cichor.

Pentaphyll. ā. M. j

Chamadrios

Chamaepyt.

Thymi

Calaminth.

Origan. Cret.

Filipend. ā. P. iij

Pol. Senna ʒiijs

Epithym. ʒjs

Cort. Arant.

Thamarisc.

Cappar. ā. ʒiij

Flor. Thamaris.

Pæon.

Antbos

Meliss. ā. P. j

Borrage.

Bugloss. ā. P. js

Coq. pro lib. i. Cui infund. agar. trocisc. ʒj

Rad. Ireos Florent.

Cinamom. ā. ℥iij
 Rhabarb. Elect. ℥v.
 Schœnanth. ℥j
 Expressioni add. Syr. de Stœchade,
 Oxymel. Squillit.
 Mell. anthosat. ā. ℥ss
 Succ. ruta clarificat. ℥js
 Sachari alb. ℥iv.
 Fiat Syrupus, aromatizandus cum ℥ss
 Spet. Diamosch dul. S. Syrupus.
 Recip. Maß. Pillul. scæidar. gr. xv.
 Trocisc. Alband. gr. iij
 Dacryd. gr. jss
 Cum. aq. Cinamomi s. pill. n. Xi.
 Sumantur ex Syr. de betonica.
 Recip. Theriac. Andromach ℥ij
 Mithridat. ℥ss
 Conf. Flor. Pæon. ℥ij
 Spir. Vitriol. gt. ij
 Mis. S. Mithridatium.

Hinc alteranda mala qualitas & singulis octo diebus exhib. Succ. ruta depur. ℥ij Oxymel. Squillit. ℥ss Mell. anthos. ℥iij. ad libitum superdormiat.
 Postea accedendum ad decoctum ligni.

Recip. Ligni Guaiaci lbj
 Cort. Ligni ℥iij
 Rad. Scorzonere ℥iij
 Pæon.
 Palma Christi
 Visciquer. & decrescente collect. ā. ℥iij
 Zinzib. ℥j
 Sem. Anisi ℥vj
 Passular. Corinth. ℥js

Ad. Pæon. & Beton. fervescant. ā. lbx infund. Olla vitrea & stent
 per hor. 12. in ciner. calid. tectâ ollâ, manè coq. ad. medietatem s. f.
 & s. lento igne, refrigerata per se colentur, Colatura dividatur in
 partes 9. quarum unam bibat manè intra hor. 3. & 4. Utatur à su-
 dore Diamosch. dul. vel plures anchonts aut Rad. Pæon. Sacharo incru-
 stat. vel condit,

Secundum decoctum.

Recip. Ligni Guajaci pulveris. ℥ss

Cort. ejusdem ʒjs

Rad. Pæon.

Zinzib.

Palma Christi ā. ʒij

Mell. opt. despumati ʒiij

Aq. Beton. Pæon. ā. ℥vj

Stent per 20. hor. bulliant ad tertias. Auribus, dum sudat, sac-
ci tales opponendi:

Recip. Mithy

Salv. ā. ℥ss frigor. in sartagine,

Fol. Lauri

Baccar. lauri ā. ʒss

Juniperi

Pæon. ā. ʒj

Ex his fiant sacculi inter puncti, qui apponantur auribus, Alter-
diebus semper Theriaca ante decoctum exhibeatur. Naribus ad-
veatur hoc linimentum.

Recip. Succu cyclaminis

Beta

Anagallid. utr.

Majorana ā. ʒss

Olei Irini gr. v.

Cum paucis cere f. linim. quod parum in nares agat.

Si alvus non fluat, clystere emolliente utendum.

Cauteria in cruribus & brachiis etiam locum habere possunt.

Trallianus & Gal. auctores sunt, ut à fortioribus initium fiat. Pill.
ex and. de nitro, cerebrum ob omni lenta crassa & viscida pituita
evacuant.

Electuar. roborans.

Recip. Conser. Rorismar.

Flor. Salvia ā. ʒvj

Offis cranij usi de femina suspensa aut decollata ʒjs

Beton.

Rad. Pæon. D. decresc. coll. ā. ʒj

Cor. cervi iusto tempore coll.

Pyrethri ā. ʒß

Smaragd. veri præp. ʒß

*Pulverisatis omnibus subtiliss. cum Syrupo de Stæchade fiat.
Electuarium. Vel.*

R. Conser. Rosar.

Stæchad.

Rorismar.

Borragin. ā. ʒvj

Sem. & Rad. Pæon. ā. ʒij

Sem. Palma Christi

Oss. de cranio suspens. ā. ʒjs

Pulv. Cucul.

Hyrundin. ā. ʒj

Corn. Cervi præp.

Pyrethri ā. ʒjß

Smaragd. veri ʒj

Corall. rub. præp. ʒß

F. Cum Syr. de Beton. Electuarium.

Recip. Maß. Pull. azaiareih ʒj

Agar. noviter trocisc. ʒij

Sem. Pæon.

Ruthe ʒj

Medull. Sem. Carthami ʒß

Flor. Stæchad. ʒß

Cum Oxymel. simpl. f. massa pillular.

Ex ʒj ejusdem cum aq. Pæon. f. pill. n. xl.

S. Pilula nocturna.

CONSILIUM XX.

CONTINENS CONCERTATIONEM
INGENIOSAM D. BALTHAS. BRUNNERI CUM D. B. C.
AN IN QUADAM FOE ZINA ILLUSTRİ EPİLEPSIA PER CON-
SENSUM ORTA SIT AB UTERO, AN VERO A VUL-
NERE CRURUM FOVEATUR.

I. THEMA D. B. C.

Locus iste sub fura, non aptus est vel congruus ad tale quid, & viru-
lentum progenciam om. CON.

CONTRA SUNT.

I. AUCTORITATES : 1. Galeni 3. de loc. affect. 7. ubi expressit tres facit Epilepsiæ species. 1. Per essentiam, 2. per consensum ventriculi : quo interpretes eam quæ ab utero referunt. 3. Ab aura maligna, cruribus ascendente.

2. Aëtij. Tetrab. 2. Serm. 2. cap. 13.

3. Pauli lib. 3. c. 13.

4. Avicennæ 1. tertij F. 5. c. 8.

5. Halyabbat. 5. pract. cap. 21.

6. Rhazis : 9. ad Almanfor. 11. & 1. contin. 5. Unde etiam Genes à veteribus diversa illis speciebus nomina indita tradidit. Primæ Epilepsiam, secundæ Analepsiam, tertiæ Catalepsiam.

II. EXPERIENTIA. 1. Gal. 3. de locis aff. 7. ubi duos ejusmodi casus duorum puerorum refert.

2. Avicenn. qui l. c. non tantum crurum, sed & manuum, scapularum & vertebrarum meminit.

3. Gentilis in comm. & aliorum qui observationes scripserunt.

4. Observationes eorum, qui praxin exercent.

III. RATIONES.

1. Ex modo. Avicen. loc. cit. Humore ibi aliquo retento, & calore nativo abscisso, putrescente, vel ob malam qualitatem converso : unde postmodum periodicè vel non periodicè ascendat.

2. Ex modo generationis tumorum præter Naturam per congectionem, tum quantum ad materiam, ut 1. de sanit. tuend. c. 13. cum quantum ad efficientem, Gal. 1. d. diff. sympt. 5. Averrh. 3. coll. 5. In-
imis Avicen. 2. 1. doct. 2. c. 17.

3. Ex modo generationis Tumoris præter naturam, per influxionem, ex Gal. de inæqual. intemp. c. 3. Itemque art. par. c. 95.

4. Ex modo generationis Tumorum p. n. per fusionem ex 13. Meth. & Arist. de gen. & corrupt. tex. 37.

5. Ex modo quo Avicen. 1. 3. t. 3. c. 1. & 1. 3. t. 1. c. 10. cerebrum & ossa apostemari contra Serapionem probat. Nutriuntur, E. aliud suscipiunt. Ita & h. l. Pars illa nutritur, Ergò aliquid suscipit, quod detineatur, alterari poterit.

6. Ex modo à Gal. descripto 3. d. l. a. 7. quemadmodum in alijs membris, ita & in crure, ad similitudinem veneni ab animali aliquo
vene-

venenato impresso, vaporem quendam vel saltem qualitatem progigi posse, quemadmodum exempla de morsis à cane, aranea, equo.

7. Ex causis ibi sufficienter concutrentibus, ac benè illic dispositis effectum necessario inducentibus.

I. Quantum ad materiam.

1. Ratione diætæ inordinatæ, pravum alimentum eò mittatur.
2. Excrementa ibi colligi possint, cum præferim ratione motus musculorum, multum alimenti ibi consumatur, consequenter multum excrementi gignatur.
3. Excrementa eò deferri, tanquam ad emunctoria soleant.
4. Excrementa, ratione gravitatis.
5. Vel etiam situs. Cum itaque ex optimis alimentis & humoribus, sanguine v. g. semine &c. venena generentur, cur non etiam excrementis.

II. Quantum ab subjectum.

1. Crura emunctoria epatis statuuntur.
2. Partes illæ aliàs externis injurijs magis sunt obnoxia.
3. In sura propter musculorum motum frequentiore, excrementa facilius suscipiuntur.
4. Tibia aliàs totius molis corporeæ quasi fulcrum sit, facile igitur suscipere aliquid possit.

III. Quantum ad efficientem.

1. Sive calor partis imbecillior sit statuendus secundum Avicen. I. & Gentil. in commento.
2. Sive innaturalis ex Gal. 3. d. l. a. 7. & Th. à Vega in comm. & quodam aut in defectu, utpote materia tanquam rebeli à calore nativo defecta, aut in excessu, utpote materia ibi conculcata, sic calore excitata Singuli h. l. dantur.

Sententiam verò suam confirmat D. B. C.

I. Non adsunt ibi vasa.

CONTRA. Et *αἰμοψία*. Complures enim compagines venæ scilicet ralis imprimis Saphenæ, Ischiadis majoris & poplitis, isto exactè in loco concurrunt. Ut non immeritò varices idcirco, eò potissimum loci oboriri, Anatomici annotarint.

II. Non adest ibi tanta capacitas, atque in utero & aliis visceribus.

Respond. 1. Attamen aura illa maligna, quantum ad menses non gignitur in utero: cum ex anatome pateat, menses non purgari per venas uteri, sed per venas colli uteri.

2. Tot dantur vapores aliarum partium, quibus tamen nullæ sunt cavitates. Ut in palpitationibus istis particularibus videre est.

3. Vapor ille vel secundum Galenum qualitas, tantâ cavitate non eget.

4. Musculi, ossa & aliæ partes solidæ dictæ suam quoque obtinent cavitatem proportionalem ex Avicen. lib. 5. c. Si enim nutriuntur, etiam cavitatem suam obtinent.

5. Tumores ibi non tantum minores, terminthi, hydatides &c. Sed & majores furunculi, varices oriuntur. Qui certè cavitatem præsupponunt.

II. THEMA. D. B. C.

IN utero potius sedem affectam esse inquirendam. Idque probat quatuor rationibus.

1. Quod experientia constet frequentius ex sanguine menstruo retento, aut corrupto ejusmodi mala contingere.

Resp. Ut frequentius aliquid contingat, attamen rariores casus non excludantur. Hinc repræhendebat Galenus 3. l. a. 7. eos, qui species illas tres Epilepsiæ distinguere neglexerint.

2. Quod tempore imprægnationis symptomata illa passa fuerit : quando nimirum retenti menses fuerunt corrupti.

Respond. 1. Atqui hoc est *κενόμενον*, an ab utero ascendat. Potuisset enim & à ventriculo tum oriri, vel ab ipsis etiam cruribus cum primis vicibus singula non fuerint observata.

2. Pauciores fuerunt (duo scil. tantum) paroxysmi retentis mensibus, quam lochiis fluentibus cum certè materia sublata, effectum quoque tolli oportuisset.

3. Tardiores quoque fuerunt periodi istorum duorum paroxysmorum, retentis mensibus, scilicet septimanarum spacio distantes : cum fluentibus lochiis paucorum dierum, quandoque etiam horarum intervallis invaserint.

4. Tempore partus, materiam illam in utero commoveri fortius oportuisset.

5. Ignominiosum est Medicis omnes mulierum morbos ad uterum referre : si de alio loco constet.

III. Quod primus hujus morbi insultus fuerit primo eruptionis mensium tempore : nullo tum præsentem, neque in suris neque in digitis pedum dolore.

Respond. 1. Attamen non constat exactè an hystericus, an Epilepticus paroxysmus ille fuerit.

2. Et ut fuerit Epilepticus : attamen si ex Hippocr. 6. Epid. 6. text. 8. pro quibus qui morbi : ut ipse loquitur : quid ni & pro unius morbi loco alius erit expectandus , unde totus hinc inde in coacis & aliàs translationis matariæ morbificæ fit mentio.

3. Quemadmodum etiam dolores capitis & aliarum partium , modò ab hac , modò ab alia causa , modò in hoc , modò in illo loco hærente , oboriri experimur.

IV. Quod hystericae passiones in hoc subjecto quandoque concurrant.

Respond. 1. Atqui morbos complicari frequentissimum est : in nostris præsertim corporibus impuris.

2. Ex Gal. 3. l. a. 7. Aura illa venenata partes quas pertransit , per continuationem alterat. Non itaque mirum , si circa uterum materiam quoque dispositam forsan reperiatur , quin ambo affectus inducantur.

3. Cum præsertim symptomata varient , ut præfocatio ab Epilepsia discerni faciliè possit.

TERTIUM THEMA. D. B. C.

Licet dolor sub sura initium paroxysmi itemque ascensus inde quasi vaporis tum sentiatur : attamen & vitio uteri id contingere posse , cum nimirum facultas uteri , à causa morbifica irritata , per motum symptomaticum vel convulsivum illam retrò per venas & arterias hypogastricas & spermaticas excludere conatur : ubi calor naturalis validior vasorum & viscerum ei obvians , quandoque per truncum venæ cavæ & reliquos meatus , illam rectà in pedes dejicit & detorquet. Ubi tanquam in loco remotiori , cum calor nativus sit imbecillior , pori quoque cutis magis occlusi , convolvitur , multiplicatur , conglomeratur. Per successionem inprimis novi vaporis maligni , à valida natura eò detrusi : ibique vires acquirens , quasi per *avtrimeplaxiv* revolvitur. Ac nervis aliisque meatibus virulentiam suam remeando inferens cerebro communicatur.

Qui sanè modus apparentiam quidem quandam obtinet : interim minutius excutiatur , in hoc casu locum vix habere videtur.

1. Licet enim facultas uteri , à causa morbifica irritari possit , ita ut excludere illam conetur , attamen quis motus ille symptomaticus vel convulsivus sit , nondum patet , cum venæ & arteriæ non convellantur , neque arteriæ præter systolen & diastolen moveantur.

2. Cumque per vasa spermatica & hypogastrica retrò ad truncum venæ cavæ ferri illam statuatur : mirum certè cum vaporis natura sit sursum ferri , quod non superiora potius petat , quoniam fumos sursum ferri experimur.

Omnia quidem confluxibilia ab Hippocrate : Nihil quoque in corpore humano sursum vel deorsum statuitur : facultatibus animarum mediante calore nativo administrantibus singula.

Interim proportio & natura humorum vel vaporum observatur : quemadmodum tali ratione cerebrum, non crus ab Hippocrate instar cucurbitulæ esse traditur.

3. Nimirum quoque, quomodo calor validior obvians, materiam illam detrudat, ac non potius consumat, cum caloris fortis imprimis sit condensare, sed rarefacere & digerere vaporem imprimis.

4. Mirum tandem, quod sub suram & non alium locum uterus vaporem illum propellat : cum præsertim in poplitem, in musculos inguinis, ischion, natium cutem, hypogastria rami sese inferant.

5. Neque, quem nam ἀντιπερίστασις locum hic habeat, facile patet. Si enim vim vocabuli nudam inspiciamus, inter truncum illum venæ cavæ & suram, locus certè non est angustus, quo vapor aliquis quasi circumscribatur & concludatur : cum tot viscera, muscoli, vasa interjaceant.

Sin verò prout à Philosophis accipitur, sumatur : pro eo scilicet, quod contrarium unum objectum contrarii alterius intensius fiat.

1. Præterquam quod rejiciatur illa ab aliis.

2. Non videtur quomodo in partibus corporis humani detur. In cerebro quidem catharri gignuntur ex vaporibus : sed non qualitas vaporis intenditur.

3. Et ut intensior reddatur vapor quantum ad calorem : attamen non qualitate primâ, sed tertiâ, scil. malignitate peccat.

4. Ac sub sura certè tot reperiuntur venarum antea relatarum rami, ut frigus ibi non sit sperandum.

5. Quin etiam occurrunt aliæ partes interea non minus frigidæ & non nimis densæ v. g. poples & genu : ubi sistere sese vaporem oporteret. Nec non meatus sub surâ alii, per quos ulterius adhuc vapor seu materia illa deferri posset.

6. Cumque statuatur alium novum vaporem subindè deorsum trudi, unde prior augmentum ac vires suscipiat : mirum sanè quomodo vinculis priore intercepto, reliqui sursum non ferantur, & malum illud inferant.

7. Cum præsertim longè alia indicia Epilepsiæ ex utero afferat Avic. 1. tert. tr 5. c. 9. sive ex retentione mensium, sive spermatis (quorum tamen hoc loco neutrum est) sive aliarum humiditatum eò effularum. 1. Dolorem in pectine. 2. Dolorem in utroque inguine. 3. In dorsi partibus. 4. Gravitationem in matrice. Quale quid hoc loco non percipitur?

tur : quin potius dum præsentissimo est animo, de dolore suræ & ascensu vaporis conqueri incipit.

8. Tandem non pateat, si vaporis ascensus sentitur, cur non etiam ejus descensus percipiatur. Ut omninò cum

1. Auctoritatibus,

2. Experienciis,

3. Rationibus.

1. Ex modo Avicen. 1. 3. t. 5. c. 8.

2. Ex modo generationis tumorum præter naturam per influxionem.

3. Congestionem.

4. Fusionem.

5. Ex modo Avicen. 1. 3. t. 3. c. 7. & 7. 3. t. 1. c. 2.

6. Ex modo Caleni 3. l. a. 7.

7. Ex causis sufficienter concurrentibus & benè dispositis.

1. Quantum ad materiam.

2. Quantum ad subjectum.

3. Quantum ad sufficientem pateat sub suris potissimum materiam
jussimodi frequenter generari solere & posse.

In hoc autem subjecto.

1. Causæ eadem adsint.

2. Inprimis præcefferit olim procatarctica, innixus scilicet violentus
tabulæ lapideæ in crus vel crura.

3. Et modus generationis paroxysmi, aurâ ascendente.

4. Nec non præcautionis paroxysmi per vincula.

5. Modus tandem curationis id attestetur.

Cum universalis, dum sublata causa proportionali, malum mitius
redditur : tum particularis, dum paroxysmus jam præsens, per frictiones
& ligaturas tollitur.

Concludo veram essentiam mali hujus particularis in crure potius,
quam in utero latere. Hinc intentiones curativas ad locum ipsum affe-
ctum, non autem uterum dirigendas. Quæ verò auxiliorum materiæ
ex usu sint futuræ, aliàs ostensum fuit : & exigente
necessitate de aliis quoque cogitandum
erit.

CONSILIVM XXI.

IN EPILEPSIA CUJUSDAM PUERI
PER CONSENSUM AB ORIFICIO VEN-
TRICULI.

Causam proximam, ob quam infans misellus Epilepsiâ corri-
pitur, existimo esse chylum vitiosum & corruptum, produ-
ctum in ventriculo ob causam externam, lac videlicet nu-
triciis illaudabile. Idipsum satis arguunt tormina, & alvi fæ-
ces ærugini non absimiles. Inde enim vapores maligni & venenati sur-
sum repunt, quos cerebrum summâ vi expellere nititur, paroxysmumque
convulsorium inducit. Accedit cacochymia pituitosa totius corporis, orta
ab humiditate, partim nativâ, partim etiam affcicia, ob quam etiam in-
fantibus malum hoc ferè familiare, existit. Cerebrum itaque vaporibus
insensibilis vellicatum, pituitam è toto facilè recipit, eandemque rursus ad
pulmones sensim deturbare, stertoremque & suffocationis metum inve-
here solet.

Hujus quippè (pituitæ) mole gravatum, & illius (vaporis) infestâ
qualitate laceffitum, seipsum contrahit, atque quicquid est noxium, ex-
cutere summopere conatur.

Ad prognosin quod attinet, affectus est valde acutus & periculosus
propter crebros & diu perseverantes paroxysmos, tempus hybernium, ha-
bitum corporis crassum, viasque exinde, per quas noxia materia propel-
lenda venit, admodum exiles. Imò verendum, ne crebris accessionibus
& symptomatum vehementiâ statim suffocet aut jugulet. Si tamen (quod
vix sperandum) malum protrahatur, ac mitigetur: ætatis tandem progres-
su, aliisque sex rebus non naturalibus ritè adhibitis profligari fortasse posset.

In instituendâ Therapiâ respiciendum primò erit ad paroxysmum,
inquantum id quod magis urget: alvo tamen prius candelâ cereâ aut cly-
stere sequenti vel simili lenitâ: ut:

Recip. *Juris pulli ℥iij*
Mell. Rosar. ℥jss
Mis. pro clysmo.

Sacculus sequens ad formam quadratam collo, ut stomachi orificum
attingat, filo rubro sericeo suspensum ad dies aliquot permaneat, ut:

Recip. *Rad. Pœonia*, (si haberi possunt) *viridium*,
alias exiccat. & in Luna decresciente col-
lect. & incis. ℥iiij

Sem. Pœonia mascul. contus. ʒjs

Includantur sacculo, interjectâ bombace, qui syndone coopertus & inter-
 fusus applicari debet. Nam hoc solo plurimi infantes dicuntur liberati.
 Nares in paroxysmo sæpè confricentur rutâ cum aceto contusâ: aut as-
 fætîdâ, castoreo item, aut balsamo succini, vel apoplectico. Quæ licet
 affectum odoris vehementia aut ingratitudine sæpe soleant commovere
 tamen multum quandoque depræhensa sunt juvare, causam tollendo. Dum
 nimirum crassum humorem incidunt & extenuant: siccam, expultricem
 que cerebri vim stimulare & ad se redire faciunt.

Paroxysmo non cessante, semina Pœoniæ ablatis corticibus pulveris-
 ta, vel pulveris puerorum ʒß cum pauca cerevisia, aut aqua flor. tilia
 calidè vel frigidè propinetur. Vel in iisdem liquoribus exhibeantur gr.
 vel iij pulveris ex dente piscis, Rosmar vulgò dicti, vel ossis unicornu.

Accessione perseverante propinetur dimidium cochleare spiritus cer-
 forum, aut gt. j olei è castoreo destillati cum aq. appropriatâ. Ad ave-
 tendam quoque materiam morbificam, brachiola & pedum plantæ lenitè
 fricari, & oleo nardino, costino, sampsuchino vel amygdal: amar. inu-
 gi poterunt: quibus etiam spina dorsi illinatur.

Extra paroxysmum nutrix hunc linctum sæpius ori infantis ingerat.

Recip. *Mell. despumati ℥ij*

Syr. ex Stæchad.

ex infus. rosar. ā. ʒß

Mis. Vel singulis matutinis cochleare unum mellis rosacei, aut frustulu
 Sachari candidi pulverisati vice illius sumat. Ad demendam causam an-
 cedentem, prospiciendum imprimis fuerit lactenti mulieri, & pharmacia
 & victu.

Pharmacia Nutricis.

Utatur primum mane hora 7. pillulis sequentibus.

Recip. *Mass. pill. cochiar.*

de hiera c. agar. ā. ʒß

Cum Syr. de Stæchade

F. pill. n. XXI.

Posterioribus duobus diebus manè hora 6. & à prandio hora 3. ebibat poti-
 culam, gratiâ præparandi humores crassos, viscidos & pituitosos, ut:

Recip. Syr. de Stachade

de s. radicibus ā. ℥j

Oxymell. simpl. ℥s

decocti herbar. Salvia

Absynthii

Fœniculi ℥iij

Mis. Reiteretur quater ad separata fictilia.

Sequenti mane utatur portione dejectoria, ut:

Recip. Rad. Asari ℥j

Polypod. q. ℥iij

Uvar. pass. annuleis lib. ℥ss

Sem. Carthami conquass ℥iij

Agarici crudi ℥js

Zinzib. ℥js

Coq. pro ℥iiij. Decocto adde Syr. de Stachade ℥ss. Ol. Anisi gt. ij. Misce. Post hac singulo mane sumat quantitate castanea de sequenti condito:

Recip. Conser. Rorismarin.

Beton. ā. ℥j

Mithridatii ℥ss

Spet. Diamosch. dul. ℥iijs

Spir. Vitrioli ℥j

Mis. pro condito.

Diæta Nutricis.

Diæta diligenter erit instituenda nutrici, quippè in qua plurimum momenti videtur esse positum.

Aëre itaque cum infante utatur temperato, vel ad caliditatem & siccitatem inclinante: unde hyberno hoc tempore emendari debet thure, mastiche, baccis lauri & Juniperi, lavendula, roremarino &c. Nimis tamen calidus vitandus, quia pituitam fundere & in locum affectum præcipitare posset.

Cibi sint: panis benè fermentatus & elaboratus, sale etiam, carui aut Pœoniæ Semine pulverisato inter pinsandum conditus. Carnes lauantur assæ magis: aut cum majoranâ, roremarino, baccis Juniperi, aut carui semine coctæ.

Aromata hic locum non habent: quia caput nimis replent. Abstineat piscibus succum glutinosum gignentibus, quales sunt, anguilla, carpio,

pio, alburnus, asselli, passeris: avibus item stagnosis ac palustribus imprimis locis gaudentibus.


Potus sit, si haberi posset, mulsa, Cerevisia Servesiana, Giebichensteinensis, aut Reutterlingi dicta. Vinum unice cavendum. Acida omnis generis tam in potu, quam cibo vitentur, ea enim lac corrumpunt, illudque, Dioscoride teste, congelascere faciunt.

Exercitia mediocria ante cibum, alvo prius deposita, suscepta proderunt: à cibo autem quiescat, nec ab eo mox balneum ingrediatur. Fructibus crudis abstineat, & eorum loco comedat passulas & amygdalas dulces.

Quibus omnibus, si nihil aut parum proficiatur, non abs re fuerit, nutrici ligni decoctum propinare, reliquaque (quemadmodum lue Venerae infectis facimus) observanda eidem praescribere.

CONSILIUM XXII.

IN CURATIONE ET PRÆSERVATIONE PAROXYSMI EPILEPTICI.

 Uotiescunque ingruit paroxysmus epilepticus, certissimum est indicium, materiam, quæ causa morbi est, irrumpere in ventriculos cerebri, eosque ad expulsionem irritare: unde motus depravatur. Hæc autem materia est vel vapor malignus ex venenata materia ortus, vel ex aliquo humore? vel est minera, non vapor, sed minera vaporis. Est humor tenuis, flatulentus, qui facile in flatus resolvitur & dissipatur. Ut ergo talis materia expellatur, necesse est omnibus modis naturam juvare, ut non mogo expellat, sed etiam discutiat & dissipet.

1. Ergo exponatur æger loco lucido, quia lumen juvat expulsionem.
2. Aperiat os & dentes spatula ex ligno parata, quæ intingatur in guento.
3. Elevetur caput, ne vapores extendantur, non tamen nimis late sed ut possint se movere, ut materia tanto citius à natura possit per motum discuti & dissipari.
5. Ligentur femora & crura, & deorsum trahantur & fricentur calidis pannis, si mora admittat.
6. Palatum intingatur unguento seu Mithridatico.
7. Infundatur in os aqua hirundinum vel ceraforum Spiritus.

8. Admoveatur naribus ruta infusa in aceto rutaceo, admisceatur aceto rutaceo Mithridaticum vel succus rutæ : aut succus rutæ cum aqua rutæ : vel castoreum in spiritu vini infusum.

9. Caput circa futuram coronalem ungatur oleo rutaceo, ut vapores penetrare possint.

10. Si paroxysmus sit vehemens, olei Salviæ gt. ij. infundantur in aures.

11. Spina dorsi inungatur oleo vulpino, vel lumbricorum terrestrium.

12. Cervix inungi poterit oleo Juniperino.

Finito paroxysmo :

1. Ungatur spina dorsi oleo lumbricorum terrestrium, vel oleo vulpino,

2. Exhibeantur rotulæ ex oleo carui, aut alterius fortis oleo, vel ambra grysea.

PRÆSERVATIO PAROXYSMI EPILEPTICI.

ANte & post quadram Lunæ detur aq. hirundinum, vel Spiritus cerasor. cochlear j. vel dimidium in quo dissoluta sit rotula ex ambrâ vel oleo macis. Acibo sumatur cochlear trageæ, & postea nil amplius bibatur.

Sequuntur Medicamenta in Præservatione & curatione

Paroxysmi epileptici exhibenda :

Recip. Rad. Altheæ lilior. alb. ā. Zij

Pentaphyll ʒß

Polypod. q. ʒß.

Sem. Carthami ʒvj

Anisi ʒiij

Baccar. lauri Zij

Furfurum crass. ligat. in petia. M. j

Herb. malva, parietar. mercurialis

Borrag.

Bugloss.

Pentaphyll.

Salvia, Origan. ā. Ms.

Flor. Chamamel.

Stæchad. Arab. ā. M. j

Coq. in s. q. aq. pro ℥j. In colat. dissolve hiera rachij ℥j

Hier. simpl. ℥ss

Lenitivi ℥ss

Diaphœnic. ℥ij

Mellis anthosati ℥js.

Ol. Rutacci, anethini ā. ℥j

Mis. F. Enema. A.

Recip. Rad. Pentaphyll. ℥viij

Salsa Parill. ℥ijss

Lig. Guajac. pul. ℥v

Visci querc. ℥js.

Corylor. ℥j

Rad. Scorzon. ℥iijss

Palma Christi ℥iij

Pæon. ℥ij

Anisi ℥vj

Passular. Corinth. ℥ij

Herb. Pentaphyll. M. iij

Aquar. Pentaphyll. ℥viijss

Beton. ℥j.

Nasturt. aquat. ℥j

Cichor. ℥iijss

Infundantur calefacta in olla vitreata satis capaci super cineres candidos per h. 24. postea lento Δ & olla probe tectâ ad medietat. postea per se refrigerentur & colata servantur insictis. Hujus haustus sudoriferi exhibeantur ℥v. usque ad vii. aut viii. Manè hor. v.

R. Rad. & Herb. Pentaphyll. ℥iij

Salsa Parill. ℥js.

Lig. Guajaci ℥iij

Rad. Scorzon. ℥ij

Visci querc. ℥vj.

Corylor. ℥ss

Rad. Pæon.

Palma Christi ā. ℥ij

Mellis optimè despumat. ℥iij

Aquar. Beton.

Pentaphyll.

Nasturt.

Nasturt. aquat. ā. ℥iij

Passular. ℥js

Coq. ad consumt. tertia part.

R. Plures archont. diamosch. d. ā. ℥ij

Ol. Carui g. v.

Ambra electiss. g. iiij.

Spet. Diarrhod. Abb. ℥j

Sach. solut. in aq. Cichor. & Pentaph. ℥v.

F. Conf. in rotulis usurpandis à sudore.

Si forte linguam mordeat, paretur ex melle rosato tale remedium.

Recip. Mellis rosat. col. ℥ij

Mastiches thuris ā. ℥ss

Mis. inungatur. lingua.

Recip. Sem. Coriand. qrap. ℥ss

Carui ℥iij

Caryophyllor.

Nucis mosch. ā. ℥j

Cinam. ℥ij

Macis ℥j

Rad. Pæon. ℥iij

Cal. Aromat. ℥ss

Margarit. prap. ℥ij

Corall. rub. ℥j

Sach. rosat. tabul. ℥iijss

F. Tragea. Hic est ille pulvis pepticus.

Electuarium corroborans.

Recip. Conf. Cochlear. ℥ij

Flor. Salvia Rosmarin. ā. ℥vj

Rad. Elenij condit. & incis. ℥ss

Acori veri ℥iij

Exir. Pæon. ℥j

Cornu cervi, iusto tempore collet.

Rad. Pyrethri ā. ℥j

Smaragd. veri ℥ss.

Pulv. concremat. Cuculi

Hirundinum ā. ℥j

Sem. Palm. Christi ℥i. ℥j

Ungula alcis ℥j

Cort. Myrobal.

Chebul. condit. incisor. n. iij

Cum Syr. de Stæchade f. Elect. condit. cum ambra vera ℥s. et olei
anisi ℥s.

S. Stercoris porci.

Recip. Extr. Ruta ℥ij

Mithridat. opt. ℥ss

Ol. Nuc. condit. expressi ℥j

Ol. Macis expressi ℥ss

Ol. Ruta destillat. ℥j

Ol. Ruta communis q. f.

Mis. S. Galbe zur Spatell.

Recip. Ol. Chirini ℥j.

Rutacei commun. ℥vj

Destillat. ℥s.

Mis. S. Del quo inungatur sutura corona
lis post paroxysmum.

Recip. Ol. Salvia destillat. ℥ij.

Recip. Ol. Lumbric. terrest. ℥iij quo inungatur spina
dorsi post paroxysmum.

R. Ambra vera et elect. g. XLII.

Tinctura Corallor. rub. gt. vj.

Sacch. albiss. solut. in spiritu cerasor. ℥j

F. Conf. in rotulis S. Ruchlein ex ambra.

Recip. Ol. Carui g. v.

Ambra electa g. iij

Sacch. albiss. solut. in aq. Lil. convall. ℥ij

F. Conf. in rotul. S. rotula ex carui.

Recip. Extr. tæon. ℥j

Margarit. præp. ℥ss.

Ol. Macis destillat. g. vj

Sacch. albiss. solut. in aq. flor. tæon. ℥iij

F. conf. in rotul. S. Ruchlein ex oleo macis.

Recip. Flor. Lil. convall. M. xij. Tilia

M. v. Vini malvat. ℔vj. Aq. Ruta ℔ij. Stent in
putrefact. per dies vi. Postea destillantur.

In destillat. infunde Cinam. elect. ℥vj, Nuc.
mosch. ℥ss. Piper long. ℥ij. Flor. Lavendul. ℥j.

Rosma.

*Rosmarini Stœchad. Arab. ā. ʒs. Cubebar. ʒij.
V. sci querni Rad. Pæon. dictam albi ā. ʒß. Stent
in infusione ut putrescant iterum per dies octo,
& iterum destillentur s. Besser.*

Pill: quibus ad finem curationis usus est hæ sunt.

Recip. Maß. pill. cochlear. aurear. de hiera cum agar. ā. ʒj

Dacryd. g. j

Cum aq. Beton. f. pill. XXI.

s. Pillen A.

Recip. Maß. Pill. aurear. aggruuar. de hiera cum agar. ā. ʒj

Dacryd. g. ʒs.

Cum aq. Beton. f. pill. n. XXXII.

s. Pillen. B.

CONSILIUM XXIII.

IN PRÆSERVATIONE APOPLEXIÆ, CALCULI ET HYDROPS.

Reverende & magnifice Domine &c. Temperamentum tuum antehæc tempora erat verè temperatum, sanguineum, omnibusque actionibus animi & corporis perquam idoneum. Ob tifficilima verò & laboriosa itinera, naturæ quædam illata injuria. Ità pedetentim *enegolæ*, in *duenegolæ* degeneravit.

Epatis enim, ut omnium membrorum nutritioni inservientium œconomiam labefactatam esse, luce meridianâ clarius. Ex cruditates generant catharros: hi in renes deturbati, caliditate renum in calculos fuere indurati. Epar laudabilem cum non generet sanguinem, sed aquosum; hi verò cum utpote inutilem & molestum motu quodam eccentrico naturam à corde remotiores allegavit.

Inde œdema pedum, inde tumores alij ad initia hydropis tendentes, excessibus ijs itinerarijs caput & ipsum debilitatum fuit. Inde catharri debentes in pectus, oculos, dentium alveolos: inde quædam Apoplexiæ initia. Hi sanè tres affectus è communi quodam profluunt principio, temperie nempe frigidâ & humida, vel verbo ut dicam, cacochymiâ.

Hæc autem cacochymia, cum adhuc in latitudine sit exigua, diligenti-

ti studio adhuc emendari poterit. Intentio itaque erit, causas foventes remove, renesque, epar & caput ad naturalem statum reducere.

Hoc propositum ut exequamur, necessum est, ut saburrâ cacochymix tum eductâ, tum emendatâ, partes frigidæ & laxæ siccentur & corroborentur. Hoc loci & de medicamento, quod huic intentioni satisfaciat, dispiciamus. Natura enim medicamenti ad naturam morbi accommodata ut sit, necessum est. Id verò præstabit Lignum sanctum, quam optimè omnibus his accommodatum.

Cacochymia primò omnium removenda.

Id ni fiat, multoties morbi longi, incuratione, morborum acutorum naturam induunt.

Medici itaque in curâ ligni id non præmittentes, Tyranni potius, quam sanitatis custodes.

Primò, itaque omnium Lenitivum sumatur manè hora sextâ cum custodia. Viam id aperiet subsequituris reliquis medicamentis. Sequenti die quatuor cochlearia de Syrupo longæ decoctionis B. capiantur calidè: hoc per sex ita continuabitur dies. Præparabit iste non solum, sed & præparatum è tribus locis affectis educet. Singulis etiam diebus potio hæc regulariter quater movebit alvum: si pluries, tria tantum sumantur cochlearia, vel uno cessetur die: sin minus dosis abaugebitur. Tribus prioribus diebus expletis, quarto sint induciæ: quinto, sexto, septimo peragatur. Si quæ reliquiæ adsint fœculentæ, abjiciantur. Hocce loci notandum, studio me jussisse, ut hic Syrupus in tantâ sumatur quantitate. Cum enim propter Syrupos ingredientes Sachari adsit multum, dosis ejus fuit adaugenda.

Syrupi usu absoluto, dies unus intercaletur. Postridiè pro electivâ purgatione, sequenti die, sub aurora Pilulæ C. deglutiantur. Hora nonâ decoctum bibatur cicerum rubeorum. Jejunium ad decimam usque esto. Die sequenti pro corroborando epate & cerebro Electuarium D. totum sumatur, horis antelucanis, & pro libitu sudetur.

Porro dispiciendum, an corpus exactè evacuatum sit, nec ne. Urina id ostendet, & promptior corporis agilitas. Si ita, rectâ ad usum ligni te conferas: sin minus ad sex circiter dies id differas, primo die usurpando Enema A. Sequentibus verò Syrupum A. vel totum vel dimidium. Singulis insimul ijs diebus Morsulis E. manè & vesperi utaris. Si verò corpus jam satis sit evacuatum, nec Syrupum iterabis, nec morsulis uteris, sed Enema A. vel aliud applicari curabis, ut reliquiæ ex purgatione in hypochondrijs hærentes, & ipsæ deorsum deriventur & evacuentur. Sequenti die ad curam ligni acedendum. Hoc

Hoc loco incidit quæstio : Quam diu nimirum Guajaci usus , utpote qui citra ullam controversiam præservationi horum affectuum accommodatissimus est , sit continuandus ?

Respondendum censeo , in præservatione morborum chronicorum , uti & præsentium , qui primum terminum perfectæ criseos constituunt diem quadagesimum , per quatuor vel sex septimanas in illius usu esse persistendum. Licet autem in curatione luis Venereæ tantum ad 2. vel 3. id fiat septimanas , tamen facilior erit hæc nostra præservatio , cum diætâ non adeò rigorosâ , ut in lue Venerea includat. Siquidem in præsentî hoc casu non simpliciter omne Vinum vel Cerevisiam interdiciamus , sed nonnunquam moderatum illorum usum concedimus & imperamus. Ex hac alia sequitur controversia : An in præservandis ejusmodi , quos præ manu habes affectibus , dum cerevisiam concedis , & vinum , & cibum non adeò strictum , corpus plus , quam par est , ut pinguefiat verendum , cum scopus tibi sit præfixus , exiccare. Quid ni itaque & Guajacum solum pro potu dandum. Hanc controversiam ita dirimo.

In Lue Venerea , ut morbus undique & cum violentia oppugnetur , opus est. Eâ violentiâ hic opus non est , ergo nec eâ tenui & exquisita victus ratione. Sine hac enim & optimè finem optatum assequemur , diebus singulis bis bibendo tantum & sudando. Quin imò & sex septimanarum spacio membra nutritoria ad tonum naturalem optimè reduci , superfluitatesque satis copiosæ (quantum nempe earum ad perficiendam crisin requiritur) per sudorem ejici poterunt. Controvertitur tandem , an Guajacum destillandum sit vel coquendum ? Videtur mihi in hoc casu nostro , cum cacochymia ad frigiditatem declinet , destillandum esse. Sic enim ratione tenuitatis suæ expeditius penetrabit , promptiusque attenuabit , minorique cum nausæâ acceptabitur. Quod si verò Reverendo & Magnifico Domino placeret , plures quam sex septimanas hac curâ consumere , suaserim , ut decoctum detur , non destillatum cum diætâ tamen exquisitiore.

Quâ ergo die ad usum ligni accedendum , dixi supra. Sumantur eâ quâ dixi diæ uncia quatuor aquæ Guajacinæ destillatæ , calefiant , ebibantur horâ tertiâ matutinâ : dormiatur , sudabitur. Sudor si statim subsequitur , indicio est prægressæ perfectæ evacuationis , sin minus contrâ. Accidit quandoque , ut primo quolibet triduo sudor neutiquam erumpat. Id si ita usu veniat , tu tamen progredere ; eoque in casu , si placet , enemate utere.

Quod

Quod si verò sudor, licet vel minimus (nihil enim parum contemnendum) aliquis erumpat, patienter eundem tolere, ad horam usque septimam Puro syndone absterges corpus, surgas, confectionisque F. nonnullas cape portiunculas. Horâ octavâ prandium sumas, idque ultra horam nonnam non extendas. Post prandium conservam rosarum cape, juglandi quantitate, vel Sacharum rosarum tabulatum, vel confectionem pistaciorum, unâ tantum crustâ inductorum, vel passulas minimas.

Horâ pomeridianâ tertîâ sumas eodem modo aquæ superioris calefactæ uncias quatuor. Jejunium sit ad horam usque quintam, & sudor. Sudore absterfo iterum confectionis F. nonnullas cape portiunculas. Horâ sextâ coenabis: coenâ absolutâ, Sacharum fume rosarum tabulatum. Et ita fiat semper. Quod si in ventriculo borborygmi suboriantur aliqui, vel tormina, tum Tragæam tuam stomachicam, jam ante consuetam, in usum revocabis.

Hoc loci de quibusdam Reverendus & Generosus Dominus monendus. Primo quolibet quatruiduo usus ligni tormina gignit circa umbilicum, & in hypochondriis. Atqui ea floccifacias, evanescit is dolor sponte suâ. Quod si placet, Enemate utaris, vel oleo rutaceo, anethino ventris regionem inungas, aut alia adhibeas topica.

Secundâ septimanâ dosis Aquæ Guajacinae augenda, ad uncias usque sex, nec verò quicquam ultra. Durante eodem ligni usu, singulis septimanis lenitivum insuper sumat quodcunque cum debitâ custodia, & sine sudore illius diei. Alvus etiam ut semper laxa sit, oculatissimè invigilandum. Secus si fiat, suppositorium in usum veniat, aut Enema A. applicandum horis vespertinis ante sextam, sudore ad finem deducto. Singulis etiam septimanis immediate ante usum destillati pro corroboratione partium 3ß capiatur Mithridatij.

Cum insuper, Reverende & Generose Domine, renes habeas ultra debitum calefactos, uti & tale epar, singulis antemeridianis & vespertinis temporibus regio renum unguento G. inungatur. Epar quoque, si & illud incalescat, quod ex urinis colligitur, unguento H. tepesfacto demulceatur. Quod si & alia ingruant symptomata, uti fluxus alvi plerumque sequitur, nequaquam abjiciendus animus, sed idoneis remedijs & accommodatâ victus ratione ijsce obviam eatur. Hisce ad tempus usque destinatum continuatis & absolutis, ad biduum sint induciæ. Dein lenitivo utatur quocunque. Sequenti die Mithridatio utatur D. more solito. Eodem die post meridiem in balneum se conferat, ibidemque cum sudarit, caput lixivio abluat, cui sacculus I. infusus sit. Et ita cura hæc finem assequetur.

queur suum. Antequam verò balneo utatur sudorifero, biduo ante aë-
ri se pedetentim assuefaciat. Consultum jam esset, quatuordecim dies
roborandis epati, renibus, & cerebro operam dare medicativam: sed de
his suo tempore. Durante ipsa ligni curâ, post abstersionem sudoris,
pro firmandis dentibus collutione uti potest vel quotidie, vel quolibet
die tercio.

Quod si curâ peractâ, defluxiones è vestigio non substiterint, nil
quicquam desperandum. Effectus enim ligni curæ apud quosdam in
actum erumpit die octuagesimo ab initio curationis, apud quosdam
centesimo.

Consultissimum etiam fecerit Dominus, si durante cura, perpetua
edibus suis affixus quasi ibidem permanferit: urgente negotiorum dirâ
necessitate, non nisi sudo exeat cœlo, uti & non nisi vestibis benè un-
diquaque munitus. De cibo & potu nil quicquam hic sermonis, cum
supra de iis injecta mentio. An enim diata adeò præcisè, ut in lue Vene-
rea servari possit & debeat, præsentis viderint Medici. Altissimus cle-
menter has meditationes ad ægroti nostri incolumitatem & salutem con-
vertat.

Medicamenta sequuntur.

Recip. *Elect. Diacathol.* 3v

Diaſebesten sine Dacryd. 3ij

Mis. cum Sacharo pro bolo.

S. Bolus A.

Recip. *Herb. Parietar.* M. iij

Mercurial. M. j

Origan., *Calaminth.* ā. Mss

Flor. Chamomel.

Summit. Aneth. ā. Mss

Sem. Lini Fœn. græc. ā. 3ß

Anisi, *Carui*, *Cumini* ā. 3ij

Rad. Altheæ 3vj

Calam. arom. 3ij

Coq. pro lib. una. In colat. dissol.

Elect. Diacathol. de hiera simp. ā. 3ß

Bened. Laxat. 3ij

Ol. Chamomel. Aneth. ā. 3j

Mell. Ros. Col. 3j

Mis. F. Enema A.

Recip. Flor. Anthos, Stæchad. Arab.
Meliss.

Borrag. Epithym. Cret. ā. Pß

Rad. Pæon. 3vj

Acori, calami aromat. ā. 3ij

Cori. Thamaris. 3js

Fœnic. Petrosel. ā. 3vj

Centaur. major. rubia tinctor.

Pentaphyll.

Filipendule, Elenii ā. 3ß

Glycyrrhizæ rase,

Altheæ ā. 3vj

Ononidis 3iij

Polypod. quer. 3vj

Sem. Carthami 3ß

Lingua avis 3iij

Sem. Anisi

Fœnic.

Pæon.

Seseleos ā. 3js

Citri

Melon. ā. 3iij

Saxifragiæ 3iij

Dauci 3ij

Alkekengi n. V.

Berber n. X.

Herb. Beton, Origan,

Marrhub. Alb.

Chamad.

Chamapyt.

Agrimon. ā. M. j

Ceterach. Cuscuta,

Absynth. Pont. ā. Ms

Cichorii M. j

Salvia, primula veris,

Flor. Tiliæ P. j

Coq. in s. q. aq. pro lib. ij. & paulo amplius, sub
finem injiciendo,

Fol. Senna ℥iij

Soldanella splendida ℥ß

Cort. citri arantior. ā. ℥ijs

Galanga ℥ij

Ubi satis coxerint colentur sine express. pro ℥XVI.

In quibus per noctem infunde agarici troc. ℥X.

Rhabarb. opt. ℥ijs

Schœnauib. ℥ijs

Manè bulliant ter quaterve, & exprim. fortiss. in
expresso dissol.

Manna Calab. ℥js

Syr. Bysantini ℥ij

de Succo parietar. ℥j

de Succo Beton.

de Stœchad. ā. ℥js

Sach. albiß. ℥vj

F. Syrupus coctus, aromatizatus cum ℥ß

Spet. Diarhod. Abbat. & ℥j Cubebar.

S. Liquor succulentus B.

Recip. Maß. pill. Cochiar. ℥ß

de hiera c. agar. ℥j

Azaiareth ℥ß

Troc. Alband. gr. j

Cum Syr. de Succo Beton. f. pill. n. XXV.

S. Pillula C.

Recip. Mithridatici opt. ℥j

Conser. Rosar. ℥iiij Mis.

S. Confortativum D.

Recip. Spet. Diamb. plures Arch. ā. ℥ij

Aromat. Rosat. ℥j

Diarhod. Abbat.

Diatrion Santal. ā. ℥ß

Lig. aloes,

Galang. ā. gr. XII.

Spodia de ebore ℥ß

Epat. lupi præp. ℥ij

Extract. Pæon. Cubebar. ā. gr. IX.

Ol. Nuc. mosch. destill. ℥ß

Margarit. præp. ʒj

Carab. alb. β. ʒj

Conf. Flor. Thilia,

Anthos. ā. ʒij

Cichor. ʒjs

Sach. soluti in aq. decoct. Schœnanth. & Thi-

lia q. s. F. Conf. in Morsulis,

S. Morsuli E.

Recip. Spet. Aromat. ros.

Diambra.

Plur. Arch. ā. ʒj

Diarrhod. Abbat. ʒj

Extract. Rœon. ʒß

Lip. aloes gr. V.

Sachari soluti in aq. Thilia ʒiij

F. Conf. in rotulis.

S. Rotula F.

Recip. Ung. infrigid. Galeni.

Rosat. Mes. ā. ʒß

Rosar. rub. Spodin ā. gr. V.

Spica gr. ijs

Camphora gr. js

Cum Ol. Rosar. odorif. s. Unguentum.

S. Ung. pro renibus & lumbis G.

Recip. Ung. Santalini,

Rosat. Mes. ā. ʒß

Aceti ʒß

Cum Ol. nymph. s. linimentum.

S. Ung. pro Epate H.

Recip. Fol. Lauri,

Calaminth.

Majoran.

Beton,

Salvia ā. Mß

Fol. Senna ʒij

Agar, crudi ʒjs

Rad. Azari ʒij

Ladani ʒj

Contusa & incisa crasso modo dentur ad scaturam.

S. Herba pro sacculo ad lixivium l.

Recip. Ligni Guajaci ℥vi

Cort. ejusdem ℥ij

Aq. Beton. lib. ij

Vini Rhen. ℔ij

Aq. Agrimon.

Cichor.

Chamom. ā. ℥vii

Infund. s. cineres calid. per hor. 24. post adde

Confer Flor. Pæon. ℥ij

Stæchad. Arab.

Meliss. rosar. Cichor.

Absynth. Pont. ā. ℥vi

Mithridat. opt. ℥js

Polypod. quer.

Ceterach. ā. ℥js

Cinamom. Elect.

Cort. citri,

Rad. Pæon. ā. ℥j

*Distillentur omnia in vase vitreo capaci secundum
artem summā diligentia.*

S. Aqua destillata.

Recip. Ligni Guajaci benè limati ℔ij

Rad. Pæon. ℥ss

Passular. ℥j

Sem. Anisi ℥ij

Pæon. ℥j

Cinamomi ℥js

*Infund. in aq. ferventiss. lib. xv. per hor. 2. Po-
stea coq. ad consumptionem medietatis, & ubi per se
refruxerint, fiat colatura, quæ servetur pro potu su-
datorio. D.*

Recip. Remanentias primi decocti & adde Cinamo-

(mi ℥js

Sem. Anisi ℥j

Rad. Pæon. ℥ii

Herb. Agrimon. Mss

U 3

Flor.

*Flor. Strachad. P. iij**Aq. Communis lib. XX.**Coq. ad tertias, fiatque potus.**S. Potio cibalis.*

CONSILIUM XIV.

IN DEFLUXIONE è CAPITE ET
METU CATHARRI SUFFOCATIVI.

Obilissima Domina, oritur hoc, quo affligeris, rheuma a
impura & viscosa sanguinis malsâ, quam ita tanquam fo
cunda quædam mater mala victus ratio progignit. Fertur
autem ille sanguis viscosus catervatim caput versus, unde
deorsum vi summa decumbit in thoracem. Cum verò hæc sanguinis
massa bipartita quasi sit, nempe tum crassior, tum tenuioribus quibus
dam & aqueis concomitata portionibus; fit inde ut quod crassius est
tussim excitet copiosam unâ cum copioso excreatu: quod verò tenuius
& aqueum, ad inferiora defluat, lobos pulmonum oppleat, non nisi suffo
cationis periculo. Huic autem malo ut fortiter contraveniatur, dupl
ci id tentandum est viâ. Præcipuè enim sanguis, ventriculus, epas &
pectus ejusmodi sanguine frigido, crasso lento & quadantenus aqueo
purgandus: Dein dictæ partes corroborandæ, adeò ut iis peractis, hau
facile redeat fluxio, vel si omninò præter spem ob violentiam rerum ex
ternarum id ita accadat, ut nobilissima Domina peculiaribus & sufficien
tibus armis instructa esse possit, ad illud malum averruncandum.

Utaris ergò manè hora septima Pilulis A. sequenti aurora circa ho
ram sextam potionem B. pitissando quasi absumas, mediam horulam ru
sus superdormias, sudorem cavendo, & ad decimam usque jejunando.
Id facias quater: sedes de die quatuor movebit hæc potio: Si plures, de
unâ quiescas. Potione tamen hâc bis ebibitâ, tertio die in dextro brachio
sanguinem mittas ad senas uncias. Dein bibendo pergas. Absumta
quaternis vicibus potione, primus insequens dies absque omni medica
mento transigendus, & ad pleniorum capitis pectorisque evacuationem
pilulæ C. usurpandæ cum custodia. Dein ad roborandas dictas partes
fiat transitus. Singulis auroris postquam N. D. surrexerit, uti & singulis
hor. 3. post meridiem, rotulæ D. in ore sub lingua, vel quod commo
di

ius erit sub gingivis detineantur, ut ita oris caliditate ac humiditate internâ paulatim dissolutæ, sensim in pulmones ferantur. Et hisce tantisper consistendum, donec nihil quicquam amplius supersit. Nunquam his detituatur rotulis, ut ubi defluxio fiat viscida, ea iis rotulis dissolvi queat ex templô. Quem etiam ad finem liquorem E. bacyllo liquiritiæ conuassato excipiet & lambet. Repentinâ verò defluxione ingruente cecidat de Succo F. quantitate avellanæ. Vitet cibos dyspeptos, cerevisiam turbidam, dulcem nimis, aërem frigidum & humidum: neque etiam in primo olidoque hypocausti calore perseveret, sed abeat. Suffumigia fiant mastiche, præsertim in paroxysmo. His ita benè convalescat.

Recip. *Maß. pill. de hier. c. agar. ℥ij*

Agregat. ℥j

Dacrydii gr. j

Cum aq. tussilag. f. pill. n. XXI.

S. Pilula A.

R. Rad. Cichorii ℥j

Helenii

Tussilag.

Angelica ā. ℥ß

Polypod. quer. ℥j

Liquirid. ℥j

Sem. Citri ℥iij

Anisi ℥js

Fujubar.

Sebest. ā. n. X.

Ficuum n. V.

Dactylor. n. ij

4. Sem. Frigid. major. ā. ℥j

Passular. ℥j

Herb. Ceterach.

Capill. Vener.

Beton. Veron.

Card. bened.

Hysopi.

Calament.

Marrub. alb. ā. Maß

Cichor.

Endivia ā. Mj

Fol. Senna ʒjs

Epithym. Cret. ʒj

Ceq. in f. q. aq. pro ʒij ʒiij

In quib. sine expressione colatis infund. per
hor. 7.

Rhabarb. opt. ʒj

Agar. trochisc. ʒss

Spica ʒj

Expressi R. ʒiij

Syr. de Hysopo,

Oxifach. Scyllit. ā. ʒvj

Mis. F. haustus reiterandus quater.

S. Potiuncula B. quaternis absumenda
auroris

Recip. Maß. pill. Cochiar. ʒj

de hier. c. agar. ʒij

Cum aq. iussilag. f. pill. n. XXIII.

S. Pilula C.

Recip. Spet. Diacreos ʒjs

Diatragag. frigid. ʒj

Succ. Glycyrrhiz. ʒs

Crocī gr. ij

Ol. Nuc. mosch. destill. gr. viij

Sach. alb. sol. in aq. Cichor. & Card. bened. ʒiij

F. Conf. in rotulis.

S. Rotula D.

R. Looch de Pino, sani & experti ā. ʒij

Irid. Flor. ʒj

Penidiar. Diatrag. fr. ā. ʒvj

Conf. Violar.

Adiant. nig. ā. ʒjss

Pulm. Vulp. ʒss

Uuar. Pass. detract. Vinaceis ʒss

Cum Syr. de liquirit. & Rhob. ex berber.

F. Looch.

S. Liquor E.

Recip. Rhob. ex Berber. vel ex ribib. ʒj

S. Succus F.

CONSILIVM XXV.

IN GRAVEDINE ET DEFLUXIONE
E CAPITÈ IN BRACHIA.

Amplicissime Consul, eveniunt hæc symptomata à frigido sanguine, qui in capite collectus delabitur. Ideoque caput purgandum parum, & corroborandum.

Pilulis A. utaris manè circa horam septimam cum custodia. Sequentibus duabus auroris pro corroborando capite, ventriculo & concoctione frigidi humoris portiunculam B. exhaustas, hor. 5. calidam super dormiendo, & tandem cum custodia. Sequenti die hor. 6. Pilulis C. utitor: auroris sequentibus singulis morsulorum unum capias ac comedas, continuando eorum usum tamdiu, donec omnes absumti fuerint.

Juxta hæc non negligendus quoque erit Cucuphæ E. usus, quâ semper caput probè tegatur. Mitrarum quoque ac pileorum gestationem Dominus Consul sibi commendatam habeat, non quidem rarorum, levium ac laxorum, sed paulò densiorum ac gravium qui viros senes & consulares apprimè decent.

Tempore tamen prandii & coenæ Cucufa ea deponatur, ad horas ferè tres.

In paroxysmo defluxionis, locum in quem decumbit fluxus, unguento G. calidè inungat. Sub constitutione aëris frigidâ & humidâ, dum in publicum prodit locum, nodulum odoratum F. naribus applicet.

Defendat caput a frigore, uti & ab immodico hypocausti calore.

In hypocaustâ etiam, sub intensissimo calore, fenestras nunquam ita aperiat, ut aër frigidus subintrans rectâ ad cervicem deferatur.

De Diætâ reliqua coram monui. DEUS benedicat.

Recip. *Mass. pill. de hiera c. agar.* ʒʒ

Cochiar.

Aurear. ā. ʒʒ

Cum Aq. Beton. F. pill. n. XXI.

S. Pilule ā.

Recip. *Syrupi de succo Beton.*

de Stæchad. ā. ʒʒ

decoct. Rad. Pæon.

Calam. arom.

Fol. Betonica ā. M. j

Rorismar.

Flor. Stæchad. Arab. ā. P. j

Cichorii ℥iij

Aq. Cinamomi ℥j

Mis. fiat haustus reiterandus bis.

S. Potiuncula B.

Recip. Maß. pill. Cochiar. ℥j

Aggregat.

Assajeret. ā. ℥ss

Diagryd. gr. js

Cum aq. Beton. f. pill. n. XXII.

S. Pilula C.

Recip. Flor. Lavendula infus. in aq. Lilior.

convall. & iterum leviter exiccat.

P. ijs

Spet. Diambre

Diamosch. dul.

Plires Archont. ā. ℥ss

Extracti Pæon. ℥j

Succini c. aq. cerasor. prep. ℥ss

Ol. Nuc. moscate destill. gr. xv.

Sach. albiss. soluti in aq. Cinamomi. ℥v

F. Conf. in Morsulis.

S. Morsuli D.

Recip. Fol. Melisse

Betonica

Majorana

Pulegii ā. Mß

Gran. Kermes ℥ij

Macis ℥j

Abfynth. sicc. Mß

Flor. Stæchad. Arab.

Rorismar. ā. P. js

Cort. Rad. Cappar. Pul. ℥ij

Calami aromat. ℥j

Incisa

*Incisa & pulvis ista insuantur in forma
Cucuse fact. ex syndone rubro.*

S. Cucusa E.

Recip. Sem. Nigella infus. in Aq.

Lilior. convall. 3j

Exsicceetur pulvis & irroretur

Ol. Carui gt. vj

Postea ligentur in nodulo.

S. Nodulus F.

Recip. Saponis Venet. 3j

Ol. Lumbricor. terrestr.

Chamomel. ā. 3ß

Ol. Juniper. 3j

Theriacinalina 3ß

Vini sublimati 3ß

Mis. S. Unguentum G.

CONSILIUM XXVI.
IN CONTINUA AD OCULOS DE-
FLUXIONE ET HORUM RUBEDINE.

Conqueritur Magnificus & Nobilissimus Dominus, de oculorum impeditâ actione, ob externum errorem, nempe affluxu humorum ad angulos eorundem, quo fit, ut oculi plus justo madentes, non modo tedium materiæ continuò fluentis, sed etiam crebrioris abstersionis & oculorum rubedinis, pariant, & insuper actionem videndi non quidem admodum lædant, sed tamen impediant, tum maximè, quando legendum aut scribendum.

Est hic morbus è genere fluxionum, quæ oritur à materia. Materia autem generatur in capitis parte exteriori, videlicet extra cranium, inter cutem & cranium. Generatur autem ob imbecillitatem partium & vasorum sub illis contentarum, profectam ex actione læsâ ob intemperiem frigidam, in coctione. Intemperies verò oritur ex causa internâ nativâ: & externâ, utpote studiis, lucubrationibus, situ prono, aeris externi injuriâ, nuditate capitis, asotiâ.

Talis materia ruit à capite, ad oculorum partim superficiem & angulos, unde Mador oculorum, partim ad venulas oculorum unde rubedo Fluit autem partim per venas, partim per meatus sub cranio & cute.

Curativæ intentiones hæc se offerunt.

1. Materia quæ lachrymas producit, est auferenda. 2. vel derivanda. 3. Aufertur autem sublata causa generante, quæ duplex est, Intemperies ipsa & causæ externæ. 4. Intemperies corrigenda. Sed id fieri non potest, ni prius auferantur impedimenta, quæ est materia collecta & fluens. 5. Ergo talis materia evacuanda. Ergo erit intentio evacuandi, vel per Medicamenta, vel per derivationem seu revulsionem.

Est itaque prima indicatio materiæ præparatio. 2. Eductio electiva. 3. Partium mittentium & suscipientium roboratio. Hæc peragitur calefacientibus & siccantibus vel simul & per se, vel ex accidenti. Quæ simul & per se, sunt vel interna vel externa. Interna erunt confectiones, Rotulæ, Aquæ & similia. Externæ erunt miræ, pulveres, lotiones, epithemata, stillicidia. Ex accidenti vel siccando per accidens, sudoriferis nimirum, vel per Chirurgica remedia, aut derivando ad partes vicinas, aut revellendo ad partes remotas. Peragentur autem hæc tum derivationes, tum revulsiones vel per vesicatoria, vel per cauteria tam actualia quam potentialia.

Curationem hanc tali ingenio feliciter inchoavimus, feliciusque *omni* *deum* absolvemus.

Pilulis A. singulis septimanis utatur bis, semper biduum interponendo pro dosi xx. Quando sub aurora assumptæ eæ pilulæ, ejusdem diei horis pomeridianis utaris pulvere B. cujus pro vice una sumes cochlear, inspergendo super frustulum panis, & superbibendo aliquid.

Sub ingressum lecti diebus singulis dimidium cochlear pulveris C. consperges circa verticem, super ligando nonnihil bombacis. De nocte ut & die Emplastrum D. inductum alutæ, quæ tres digitos lata sit, & quindecim longa, fronti & temporibus tepidiusculum imponatur, quod & syndone cooperiatur.

Manè, vesperi, & quotiescunque oculi affliguntur, nodulus E. (qui cum aqua semper in loco stabit calido) intingatur oculisque apprimatur. Medicinis hisce absumtis malo non cessante, ad diversiones divertamur. Chirurgus itaque Cantharides cum fermento imponat cervici: intra bihorium vesica orietur. Hæc vesica beneficio emplastri aperta maneat dies plures. Quod si in cervice id habere renuat, in utroque id fiat brachio.

Cibi vitentur, qui hostes sint oculorum, uti sinapi, cape, raphanus.

Potus

Potus sit levis & mediocris, qui caput non multum repleat.

Sequuntur Medicamenta.

Recip. Aloes elect. infus. in succo fœniculi per
noctem ʒj

Rhabarbari electi ʒs

Agar. troc. ʒj

Mass. pill. Azajareth.

Aggregat. ā. ʒj

Dacrydij gr. iij.

Macis gr. vj.

Cum succo Fœniculi f. Pillule n. LXXX.

S. Pilula A.

Recip. Sem. Coriandri preparati ʒs

Anisi.

Fœniculi ā. ʒs.

Ros. rub. ʒij

Corall. rub. præp. ʒs

Spet. Rosat. novell. ʒj

Sachar. al. iß. ʒjs

Mis. F. Tragæa.

S. Pulvis Ophthalmicus B.

Recip. Cyperi, Charyophyllor. ā. ʒj

Cort. citri ʒjs

Stiracis Calamit. ʒijs

Gran. Chermes.

Coriandri præp. ā. ʒiiij

Fol. Betonicæ sicca.

Majorana ā. ʒj

Rosar. rub. P. j

F. Pulvis Cephalicus C.

Recip. Emplastri contrarupturam q. s. extendatur
super corium & syndone cooperiatur.

S. Emplastrum D.

Ros. rub.

Turie præp.

Myrobal. citr. ā. ʒj

Pulverisata subtiliter indantur in nodulum, qui immergatur decoctioni sequenti.

Recip. Aq. Rosar. Fœniculi ā. q. s.

In quibus ebulliant

Rosar. rub. P. ꝑs

Sem. Fœniculi ʒj

Flor. Euphrasiae Ps

In Colatura ʒiiijss

Infunde nodulum superiorem &

S. Nodus E.

CONSILIUM XXVII.

IN IMBECILLI VISIONE.



Effertur nobis hac vice vir quidam primarius, qui tantâ laborat visus imbecillitate, ut res, quæ offeruntur, visiles, nequaquam sat rectè percipiat: quin imò metuunt quamplurimi, futurum, ut postquam hæc visus debilitas quotidiana subinde incrementa acquisierit, visio aboleatur in solidum.

Hic ergò, quomodo imminenti huic malo, ne omnimodam progressu temporis, visivæ facultatis deperditionem secum trahat, maturè sit occurrendum, meritò in quæstionem vocatur. Nobis si licitum sit, id quod sentimus, liberè effari, palàm fateri necesse habemus, rem hanc non modò summæ difficultatis plenam, verum etiam ingenti cum periculo conjunctam fore. Cum enim Parœmiæ locum dederit vulgatum illud: Nil prodesse oculis; cum etiam fieri possit facilimè, ut sub usu medicaminum opthalmicorum, dolores suboriantur aliqui; quales obsecro tunc sermones nos audituros arbitrabimur?

An non vulgus pleno exclamabit ore: Nil, inquit, admovendum erat, resque in suo relinquenda statu, quandoquidem is adhuc fuisset tolerabilis. Interim tamen ægrum nequaquam sine medicamentis relinquendum statuamus licet vulgus, qui plerunque iniquissima fert judicia paulò aliter sentiat. Diligenter autem perpendenda veniunt hæc tria: Primò Natura viresque ipsius ægri, dein Natura hujus affectus: demum verò & natura facultatesque medicaminum, quæ non nisi sobria sagacique consultatione præmissâ, conquirenda, antequam manus injiciantur auxiliares.

Naturæ

Naturæ ergò ductum, diligenter secuti, ægro lege artis, ceu Naturæ emulatricis, eâ quâ par est cautione ac circumspeditione summiâ medeamur. Id si fecerimus, omnem vulgi calumniam, facile evitaverimus, testatur enim experientia, in casibus ejusmodi compluribus sat feliciter quandoque propinata fuisse pharmaca. Naturæ enim motu accuratè observato circumspeditioneque adhibitâ cautissimâ, non semel id effecti apparuit ut adspirante divini numinis favore, difficultates ejusmodi vel subitæ fuerint penitus, vel saltem eò res reducta, ut grato dolorum allato nemine, iidem planè consopiti, inque totum profligati, nemini non viderentur.

Dum ergò primum Naturæ ductum sequi intendimus, complexio agri, naturalis visionis constitutio, facultasque medicamentorum probè consideranda veniunt. Hac enim ratione fiet, ut causa læsæ visionis manifestè appareat. Eâ perfectè cognitâ, an affectus hic vel radicitus exipari, vel saltem mitigari, & ne ulterius serpat, prohiberi possit, circumspiciendum. Temperamentum agri generale, vel ut loquuntur secundum motum, cum ab alis Medicinæ Doctores, quorum consilium hâc in re sit efflagitatum, copiosè sit explicitum, Idcirco ego brevitati studens, pluribus illud perstringere nunc superfedabo. Ad ipsius affectus contemplationem me jam rectâ conferam. Subjectum hujus affectus est uterque oculus; ita quidem, ut dextro in oculo actio videndi graviter sit læsa, in sinistro verò penitus abolita. Sed quæ mali hujus causa? Exactè investigari nequit, ni prius, quomodo fiat visio secundum naturam, doceatur. Tunc enim locum habebit scitum illud Aristotelis: Rectum est regulæ sui, & obliqui. Præmittam igitur modum visionis qui talis est:

Visio secundum naturam fit, quando speciei visibili, per lumen externum (Solis, Lunæ vel Ignis) ad basin oculi delatæ, lumen internum seu radius visivus, beneficio crystallini humoris, spirituum animalium lucidissimus) aëri externo, oculo vicino, tanquam medio, inter utrumque lumen obvium factum conjungitur, & ita (perinde ut simile simili) nitur & miscetur, ut cum eo novam basin seu corpus proportionem ad visionem idoneum constituat: A quo corpore, utriusque luminis mixture generato: tanquam à novo subjecto: mediantibus spiritibus animalibus, species visibilis (deflexione per lineas rectas, quarum mediam optici axem pellant) in formâ pyramidis vel coni ad basin seu superficiem oculi, ut initium sumens, per tunicam corneam & albugineum humorem utraque lucidissima) ad formam uvæ: & deinceps ministerio spirituum animalium (ab eo loco usque ad humorem crystallinum) copiosissimorum:

rum : ad humorem crystallinum, tanquam visionis proprium subiectum ita defertur, ut humor crystallinus à dictâ specie visibili non solum in colore alteretur; verum etiam vi animæ, medianibus spiritibus animalibus, è cerebro per nervos opticos (tanquam causam sine qua non) defluentibus : facultatem visionis (auxilio tamen temperamenti sui proprio) exerceat, & rem quamque qualis est, separet, perficiat, & secundum formam suam perfectè dijudicet. Tribus verò potissimum membris hæc innititur commemoratio : Primò quidem ipsis oculis, utpote morbi subiectis; deindè modo visionis vero & legitimo : tandem visionis medio, seu externo aëre. Primò uterque oculus duplici consideratur modo, tum secundum totum per se, tum secundum partes totum oculum constituentes. Quod attinet oculum, ut secundum totum consideratur, palam profiteor, in hoc ægroto nostro nihil reperiri tale, quod in crimen contentionemque vocari possit. Legitima videlicet totius oculi quantitas, legitima forma, legitima congenita à primâ nativitate complexio. Quod attinet oculos secundum partes sciatur, in dextri prima conformatione naturam errorem commisisse quippe majus illa, quàm par est, foramen in tunica uvea primitus formavit. Rem verò dicam : major est pupilla, quàm decens oculi proportio admittat. Inde factum, ut ægroto noster à primâ statim infantia objecta vel species visibiles longè distitas visu apprehendere nequiverit. Quapropter etiam vel propius accessit semper, vel si res passa fuit, propius admovit oculis. Rei hujus ratio inde pendet. Nihil visu agnosci potest sine justa & sufficienti spirituum animalium copiâ. Eorum quo major adest quantitas, eò melius sese res habet. Necesse autem est, ut horum justa proportio & quantitas ab humore crystallino ad foramen usque uveæ, in oculo reperiatur. Horum etiam sufficiens quantitas præstare adfuit semper huic ægroto nostro, & quidem à primo ortu in hodiernum usque diem. Demonstrant id omnes cerebri sensuumque exteriorum actiones, quæ satis laudabiliter hætenus semper obiri potuerunt. Hoc unum desideratur : amplius quàm par est, foramen uveæ tunicæ, conformatum natura. Licet enim sufficiens animalium spirituum adsit copia, conveniens tamen eorum proportio hinc turbata fuit, quod semper fuerint dissipati, dislocati, nondumque adeò arctè & densè, ut naturalis requirit perfectio uniri congregarique potuerint. Dissipati fuerunt ii semper ob amplitudinem & dilatationem pupillæ. Quapropter nec pyramidi vel cono rei visibilis, per quem species aut subiectum visibile ad cernendum humori offertur crystallino, spiritus ii debitum præstant auxilium. E hinc in ægroti nostri oculis factum, ut ne conus rei visibilis sub debito

magni

magnitudine vel debito angulo, humori offeratur crystallino. Constringitur enim conus ille, fit minor & angustior. Hinc etiam res paulò remotiores, propter angulum coni angustiolem, minores, quam revera sunt, percipiuntur.

Eum etiam ad usum natura nos ciliorum diductionem docuit. Eâ enim pyramis rei visibilis per collectionem spirituum, fit densior, compactior, fortiorque: rectior etiam itâ humori affertur crystallino. Ut etiam conus vel basis objecti visibilis directior & sine impedimento ad humorem crystallinum deferri possit, ægri ad res visibiles propius accedere solent, edocti vel iussi à nemine, solâ naturâ eas itâ monstrante vias & rationes. Fundamentum verò, ratione cuius fiat, ut res in propinquo sita, perfectius videatur, tale est, ut sequitur. Quando res aliqua propinquius admodum admovetur oculis, basis coni vel objectum rei visibilis non quidem se ipso redditur majus: cum tamen basis illa propinquiori in loco, intervalloque minori præsens oculis sistatur, anguli in ejus cono propter istam vicinitatem redduntur majores, itâ quidem, ut amplitudini foraminis in uvea, secundum amplitudinem quidem respondeant, spiritus verò animales arctius solidiusque congregentur, minimumque eorum in vacuas auras frustra dispergatur. Fit inde per consequens, ut spiritus ij imaginem objecti visibilis humori crystallino illibatam offerant, sicque ipsa visio sine copiosorum spirituum animalium dissipatione & frustanea perditione, plenariè obiri queat. E dictis elucescit clarissimè, qui fiat, quod ægri nostri res diffitas visu assequi nequeat. Hæc omnia cum itâ essent; rei opticae professores ingeniosissimè excogitarunt conspiciælia. Pro ijs enim, qui vel à natura hebetudine laborant oculorum, & subtilissima netricum stamina & filamenta visu non possunt assequi vel etiam in aurifabrorum sculpturis occupati sunt, conspiciælia, vel ut Germani vocant *Parillen*, fuerunt introducta. Duplicem quippe illa utilitatem præstant, ne nimis prodigaliter spiritus profundantur animales neque etiam obtusi reddantur oculi. Sicut etiam palpebrarum diductio visivos radios, qui ipsi sunt animales spiritus, in unum quasi colligit fasciculum, sicque dissipationem spirituum animalium prohibet, conumque objecti visibilis ad humorem promovet crystallinum. Itâ & conspiciælia utpote subiectum externum intermedium fuere excogitata. Per hæc species visibiles reflexione radiorum redduntur majores, & sub majori etiam angulo ad basin oculi deferuntur: inde per radios visivos sine detrimento spirituum animalium ad humorem pertingunt crystallinum.

Tantum dictum esto de primo ægri nostri vitio, quod morbus est in mala conformatione partium oculorum, nempe foraminis uveæ, à

Prima nativitate plus quam par est, ampli reddit. Cujus vitio fit, ut res diffitas vel non agnoscat, vel in minima quantitate, quod spiritus in amplissimo foraminis uvæ campo disgregentur, sicque conus non rectè contineatur, sed evanescat facilimè.

Dicendum jam de secundo, quod in decenti visione considerandum. Est illud modus visionis in quo à me dictum, quod tota videndi actio non solum tunicas & humores respiciat oculorum, sed & bonitatem spirituum animalium præsupponat. Requiritur, ut ij sint puri, subiles, tennes, benèque in quantitate & qualitate proportionati. Sunt namque illi in actione visus, causa per quam, sive causa sine qua non. Si ergò ij in qualitate sufficient, in quantitate verò deficient: fit quiddam simi e, quod in ijs, qui robusti, pauci tamen, arcam onustam bajulare fatagunt. Quod si non sint subiles, sed crassi nimium, fit, ut instar candelæ in laternâ è laminis densissimis compositæ, ferè nullum de se splendorem præbeant. Quod verò in ægro hoc nostro spiritus ratione imbecillitatis, omnium coctionum tam in ventriculo quam Epate, corde & ipso cerebro, sint impuri, insinuat nobis senium, quod ipsum morbus est: ostendunt morbi & labores, quos exantlavit, plurimi, ijque tum corporis tum animi: ostendunt denique errores nocturni, crebrioribus irrigationibus cerebri, largiorique hilaritatis fomento, poculis videlicet commissi. Subtilitatem tandem & legitimam tenuitatem spirituum in ægro hoc, ut quisquam sibi polliceatur, non opus esse arbitror. Est ipse podagricus, est catarrhicus, & ad marasum proclivis. Cum autem catarrhi sint tertix coctionis in cerebro excrementa, & à calore cerebri imminuto suam habeant dependentiam: quæ, obsecro, fiet, ut calor cerebri in hoc ægro substantificos, probè concoctos, & subiles genere spiritus? Cum præterea pauci per se generentur spiritus in ægro isto, citius, facilius, largiusque illustrantur à lumine externo, quod proportionè lumen oculi internum superat. Hoc ipsum etiam non parum dilatio pupillæ promovet. Ità nimirum illustrati, majori splendoris copiâ, rectâ humorem petunt crystallinum, adeò, ut eum facile occupent, doloresque dicto citius ibidem excitent. Simile quid in omni sensu videas. Omne quippe sensibile nimis propinquum sensorio, molestat sensum. Ità manus admota candenti ferro, non ideo tristem sensationem percipit, quod ferrum sit calidum, sed quod nimis propinquè admoveatur manibus. Sic clamor immensus molestus est auribus, non quia magnus, sed quia nimis arctè tangit, nimisque vicinus est auditus sensorio.

Tertiò : in descriptione modi visionis secundum naturam , mentio fiebat externi aëris. Est autem ille tanquam medium quoddam inter lumen externum & internum , quod (internum puta) radius visivus à quibusdam appellatur. Aër iste externus duplici consideratur modo , universaliter & particulariter. Universaliter ità cognominatum aërem quivis intelligit : particularem verò eum non omnes , sed probè eruditi hauriunt. Est enim ille , qui proximè ambit oculum. Hinc duplici de causâ est lucidus. Primo quidem à Sole , Lunâ , igne & candelis : Dein verò & ab interno radiorum visivorum lumine. Cum enim humor crystallinus ad instar solis vel luminis cujusdam coruschet in oculo , cum etiam animales spiritus natura sint lucidi , quod in quorundam animalium noctu ignitos ex oculis , emittentium radios , videre est ; nihil non lucidum ex oculo in aërem oculum proximè ambientem per Spiritus animales effertur. Emissus iste ignitus radius non in infinitum , ut solis radius sed ad certam & determinatam extenditur distantiam. Huic ità spiritui lucido obvium quasi progreditur lumen aliud. Quod verò illud , & quomodo ? è re visibili , seu objecto lumen progreditur quoddam , in forma pyramidis , rectâ petens oculum. Hæc duo lumina circa oculi superficiem conjunguntur. Ibidem ex iis duobus , accedente lumine intermedio , novum quoddam formatur corpus , speculo non prorsus absimile. Corpus hoc optici basin objecti remoti appellant. Quod si ergò accadat , ut aër externus seu subjectum propinquius in reprehensionem aliquam incurrant , fit , ut res visibilis per tunicam corneam , dein per humorem albugineum postmodum & per foramen uveæ , tandem ad ipsum humorem crystallinum , nequaquam competenti modò , à radiis visivis deducatur. Tum verò statim error in receptione rei visibilis , καὶ ἐπὶ τῷ κρίσει in ferendo iudicio suboritur. Ac verò nec iste aër externus vitio caret in hoc ægro. Unde fit , ut spiritus vel radii visivi primò in iusta peccent copiâ : deindè ut nec in debitâ substantiæ densitate extra oculum deferantur ad aërem. Aër enim ille à spiritibus nimis raris non satis depuratur vel illustratur : species verò visiles nimis puræ & impermixtæ reflectuntur , & secundum rectam lineam ad humorem crystallinum (ob nimiam spirituum raritatem vel rectius dislocationem) sub satis amplo & magno angulo deferuntur. Sic ergò pedetentim formæ seu species pereunt visibiles ; idque ob nimiam spirituum raritatem. Pereunt inquam vel ad tantas rediguntur minutias , ut vel iusto minores appareant , vel etiam vix ac ne vix quidem agnosci judicari vè valeant. Adaugetur hoc malum maximè , si complures pyramides seu coni à diversis plurimisque objectis visibilibus simul & semel in

momento temporis, ad externum oculi deferantur aerem. Harum cum quædam à magnis abstrahantur corporibus, iisque vicinis, & sub majori percipiantur angulo: magisque sint lucidæ: quædam verò remotiores, minus lucidæ ex natura sua, & à corporibus abstractæ minoribus: fit inde, ut illæ rectissimè videantur: hæ verò, vel nequaquam, vel si aliquo id accadat modo, confusam tantum, non verò distinctam visionem pariant.

Priusquam hinc abeam, totum, sed breviter repetam negotium. Causæ ob quas ager noster objecta remota nequit agnoscere, sunt tripartitæ. Prima est foramen uveæ dilatatum plus justo. Vocatur hoc vitij pupillæ dilatatio, latinis; græcis *μυδεια*. Dependet hoc à primâ in utero materno conformatione. Secundò quod dum spiritus in foramine amplo nimium, conservari nequeant, conus visionis evadat acutior, sicque omne visile justo appareat minus. Tandem & ipsi animales spiritus in ægro hoc, hocque temporis statu vitiosi sunt. Primò in substantia: rari nimium ij, nimisque tenues, vel rectius, nimis dislocati. Deinde & in quantitate peccant. Quomodo verò inquit aliquis? habeto verò ille sibi hoc responsi. Pauci nimis, pauci Accedit, quod non puri sint, non clari, non lucidi. Unde hoc? partim ob deficientem hoc tempore calorem naturalem in corde radicum: partim ob deficientem cerebri calorem. Inde nec spiritus absolutè boni, nec ad visionem undiquaque idonei generantur.

Et tantum de dextro oculo. Affectus sinistri est morbus in via & numero. Supervacua quædam & inutilis humiditas è venis emulsa capitis, loca inter humorem crystallinum & foramen uveæ intermedia jam jam occupavit. Quapropter humoris crystallini spirituumque animalium internum lumen cum lumine externo externi objecti vel ire visibilis, in aëre oculum immediatè ambiente, associari nondum potest. Rectissimè affectus iste Eclipsis oculi cognominari posset. Interpositio namque humoris excrementitij inter foramen uveæ & humorem crystallinum causa est, ut fiat interceptio luminis interni vel radij visivi, & luminis externi à re visibili abstracti. Humiditas autem hujus, cum & copiosa, & ut ex relatione cognovi pupillæ humorique crystallino nimis arctè vicina sit, remotionem pluribus in curatione persequar.

CURATIO.

IN curatione hujus affectus, tria potissimum consideranda veniunt. Puta, ægri complexio, natura morborum utriusque oculi, qualitatesque medicaminum,

Com-

Complexio ægri hujus tam latè à naturali recessit statu, ut nulla coctio, sive prima ea sit, sive secunda & tertia, jam jam ulterius perfectè obeatur. E quibus consequitur, introductam esse cacochymiam, venas vitioso & illaudabili refertas esse sanguine? Sanguinem etiam illum non tam nutritium, quam excrementitium esse, qui etiam restaurando radicali humido minimè sit idoneus. In quo ergò corpore calor natus pro pabulo verum & genuinum radicale humidum non obtinet, decrevit ibi, depascitur, indiesque magis refrigeratur & exiccatur, usque dum vires ad nihilum redigantur, ægerque tandem, ut in senibus videre licet, prosternatur penitissimè.

Post ejusmodi igitur coctiones depravatas subintrant generosi sanguinis loco humores excrementitij, qui ipsi minera existunt podagræ, aliarumque id genus defluxionum vitiosissimarum. Sanguine ita non existente bono & laudabili, consequenter nec laudabiles generantur spiritus, tum naturales, tum vitales. Hinc nec perfecti, nec copiosi, addito nec idonei generari possunt animales spiritus: hinc nec functiones animales, cum hæ suam à spiritibus animalibus habeant dependentiam, spiritusque facultatis sit ὄχημα vel vehiculum, in ullo aliquo universi corporis membro, sufficienter expediri possunt. Lepidissimè enim omnes corporis partes catenæ quasi quâdam indissolubili connexæ & conglutinatæ videntur. Scitè ergò dixit, quicumque dixit: *ἐν ἑσθίῳ μίαν, ἐν ποτίῳ μίαν, ἐν πνεύματι πάντα.*

Sed quorsum hæc omnia? eò videlicet, quemnam ad scopum inurando hoc affectu attentè & intentè collimandum. Scopus ille curativus hic esto, qui sequitur. Cum ægri nostri temperamentum à naturali statu longè nimis recesserit, in id incumbendum unicè, ut ad naturalem id reducatur statum.

Fiat id per ejusmodi medicamenta, quæ cacochymiam tum coctione, tum crudorum superfluatorumque subductione, imminuant. Dein erò malus siccitatis & frigiditatis habitus, quem ego absens non adeò profundas egisse radices, arbitror, non tam medicamentis, quàm decenti iunctis ratione ad feliciorè reducatur benignitatem. Hæc tamen omnia dei & dexteritati doctissimorum Medicorum, qui ægro nostro familiares sunt & domestici, qui ejusdemque ægri qualitates tum generales tum individuales penitus perspectas habent, commissa sunt.

Postmodum verò hoc ipso in casu & aliquid ulterius factu opus est. Quod verò illud? Oculus dexter, quo in videndo adhuc utitur, & utinque fruitur ægrotus noster non omnimodo involvendus silentio. Post-

quam ergò totius habita fuerit provisio per imminutionem cacochymia, danda opera, ut in hoc oculo spiritus animales progenerentur tales, qui debitâ substantia, quantitate, puritate luciditateque condignè respondeant. Eos verò nunquam producet cerebrum, ni prius cor spiritus naturales debito perficiat modo.

Istud cor nunquam præstabit, nisi eò ex epatis culina generosissimus mittatur sanguis. Mittetur iste nunquam, ni prius in ventriculo chylus perficiatur bonus. Si ergò justam spirituum animalium nos exoptamus copiam & proventum, post habitis omnibus probæ incumbendum *χυλώσει καὶ αἱματώσει*. Hæc longius fortasse & prolixius inculcavi; sed id non mirum, cum universæ humani corporis partes sorytas ejusmodi logicas ultrò ferè nobis insinuent. Postquam ergò per debitam concoctionem & educationem cacochymia emendata fuerit, cura ad hæcticam senectutis dirigenda. Ea tunc instituatür victus ratio, quæ cibos moderatè calefacientes & substantificè nutriendos contineat. Quæ ijs sint, inculcare non possum sine tædio; quippe ijs universi medicorum scatent libri. Nec dubito, quin ipsi quoque, qui præsentem curam ægroti administrant, eâ in re, proborum ac fidelium functuri sint Medicorum officio. Unicum addam; postquam diligens ventriculi habita fuerit provisio, in promovenda ventriculi concoctione, pulverum peptiæ, ut & eorum quæ caput oculosque respiciunt, Medici domestici non sint immemores.

Quia verò nihil ad reficiendos citò spiritus aptius natum sit vino, suaferim, ut ne eo, quod caput statim petat, utatur. Rectissime utetur eo, quod mediocriter ventriculum calefaciat, concoctionem promoveat, simulque sit diuræticum. Eo in genere vinis ferè omnibus si non palmam præcipit, ambiguam tamen facit, id quod Wippachense cognominari solet. Nam peculiari quodam præ alijs hoc gaudet privilegio. Quo verò illo? Potenter urinam movet, partesque generationi inservientes in ijs, qui provectioris sunt ætatis corroborat. Imò tantum abest ut ullas capiti creet molestias, ut illud potius blando ac mitissimo calore suo suaviter recreet, labascentesque ibidem animales spiritus refoillet largiter. Contrarium in vinis experiri licet alijs, inprimis verò ijs, quæ in terrâ fabulosâ proveniunt. Caput ea immodico profundunt calore, copia vaporum gravant, autoresque molestissimorum existunt rheumatismorum. Et quidem hætenus de ijs, quæ temperamentum ægri nostri concernunt. Plura, ad id necessaria domestici viderint Medici. Unicum addendum censeo: sequentem nempe concoctionem.

Recip.

Recip. Sem. Anisi

Fœniculi

Carui

Coriandri præp.

Nigella

Eruca

Sesileos ā. ʒj

Cardomomi

Cubibar.

Gran. parad. ā. ʒß

Sachari candi albiß. soluti in aq. Fœniculi q. s. f. confectio, egregiâ duarum tunicarum crispatura parata.

Non solum ventriculi hoc medicamento promovetur concoctio, sed & intemperiei cerebri, & quæ ipsis in oculis cuniculos egit, eò succurritur. Spiritibus animalibus depurandis ea me hercle non parum confert auxilii. Usus & dosis ejus sit cochleare dimidium manè & vespèri.

Vespèri nihil superbibatur, comedatur nihil: manè post ejus usum, esuriales horæ sint omnes, ad ipsum usque prandium.

Et hæc de Temperamento ægri nostri.

Jam de ipsorum oculorum agendum constitutione. Dictum autem supra, oculum dextrum ut inde ordiar, naturali conflictari morbo, vitio nempe malæ conformationis pupillæ, vel foraminis uveæ, quod justo amplius formatum natura: dictum deinde, eò quod pupillæ adsit dilata-tio, adesse etiam disgregationem spirituum animalium, qui alias in eâ ca-pacitate, quæ inter humorem intercedit crystallinum, & pupillam, uni-tissimi, arctissimèque conjuncti esse debebant. Significatum tertio, ipsos etiam animales spiritus hoc tempore quâ substantiâ, quâ qualitate & quan-titate vitiosos esse.

Quod ergo primum attinet, vitium nempe particulare dextri oculi, sciendum, id cum nativum sit, nequaquam medicamentis emendari posse. Ac verò nec disgregatio spirituum animalium cohibebitur. Fit istud ob amplitudinem uveæ. Ubi autem ampla datur capacitas, ibidem necessa-riò disgregantur spiritus. Huic ergo spirituum dissipationi nullum conve-niens opponi potest pharmacum. Quod si quis per exiccationem tunica-rum id præstari posse arbitratur, ut ita concentrentur spiritus, per me ita arbitretur, licet? quæ verò inconvenientia exinde subsequatur, non satis ille perpendit. Spiritus animales secundum substantiam, quantitatem & qualitatem ad meliorem reduci posse statum, affirmo. Instituat decens

cacochymix alteratio & evacuatio, emundetur *διανεμία* totius, & partium imprimis coctioni servientium; bonâ nempe victus ratione initâ, bonisque adhibitis vinis diureticis, ut & medicamentis coctionem promoventibus ad tempus benè longum. His itâ decenter factis, ægrum nostrum meliusculè, visu valiturum, pronuncio. Idque ut itâ pronunciem, sequentibus adducor rationibus. Omnes actiones cerebri, quæ & ipsæ ut visio, non nisi per spiritus obiri possunt, sicut & auditio, quæ bonos & idoneos præsupponit animales spiritus, justè & legitimè in ægroto nostro sese habent. Hic forsan aliquis itâ mihi obstrepat. Cum spiritus animales, inquit, copiosi adsint, & boni, quâ ratione visus, ut & auditus, non salvus permanet? An non verò consentaneum, adesse quippiam in nervo optico, quod ingressum spirituum animalium impediat? An verò spiritus in sua substantia secundum crassitiem, vel ob admixtos vapores crassos è ventriculo exhalantes fursum, quoddam contraxere vitium?

Hæc si ita mihi quis objiciat, ego itâ respondeam. Actiones cerebri, & consequenter sensuum secundum naturam se habuere semper, à primâ ægri nativitate. Oculi verò morbo conflictantur, qui in utero materno adhuc contractus fuit. Est ille nimia foraminis uveæ amplitudo. Id cum justo amplius, justo etiam copiosiores requirit spiritus, vel ut loquuntur, secundum quantitatem.

Quia verò isti secundum proportionem in respectu ad alias actiones cerebri & sensuum exteriorum, oculo propter amplius foramen uveæ nequaquam sufficiunt, indè fit, ut nec sufficienter actionem oculi expediant, quæ tamen in aliis fit sufficientissimè. Hoc loco istud monendum arbitror. In dextro ægri nostri oculo spiritus animales, secundum substantiam quantitatem & qualitatem, satis sunt laudabiles, reliquisque reliquarum actionum spiritibus verè similes. Quia tamen ille ipse ægri nostri oculus per lucubrationes nocturnas, ut & lectiones vel jejuniò nimis ventriculo, vel ebrietate & crapulâ gravato, absolutas, debilitatus fuerit, frigidam & siccam contraxit intemperiem. Proinde nequaquam cum cerebri reliquorumque sensuum actionibus visio pari passu ambulat. Cum autem visio valdè sit imminuta, exin consequitur, ipsos spiritus animales etiam valdè ob frigiditatem & siccitatem ad motum ineptos esse. Huic autem vitio non nisi appropriatis vinis, solisque quæ coctionem juvent ventriculi, medicamentis subveniri potest. Nihil enim hic aquæ proderunt opthalmicæ, nihil vesicatoria, cauteria psilotra & id genus alia. Mali namque hujus causa in substantia cerebri, & intra oculi tunicas se-

dem

dem fixit suam. Habent etiam locum hæc præsidia solum, si causa materialis vel intra venas cerebri, vel extra venas sub pericranio aut cute hæreat capitis; quæ conditiones in ægro nostro nequaquam inveniuntur.

Cum mihi præterea non constet certò, an æger noster ad usum conspiciendorum sit assuetus, proinde ut si non factum hæctenus, jam jam cum iis faciat periculum. In eorundem usu pileum imponat capiti, cujus marginis sit latissimus. Ita enim lumen externum alteratur paululum. Sed nec ex usu est oculorum, si ii per noctem liberi relinquantur: sine tegumento. Redduntur ii hæc ratione debiles. Et si multiplex diligensque præcessit lectio, disponuntur ad recipiendas defluxiones. Dare ego soleo eam ad rem hoc consilii. Paretur vitta lectuaria è linteis. Infarciatur ea levissimis plumulis. Ea ad noctem capiti imposita, ad nasum usque deorsum detrahatur, ità ut & ipsos tegat oculos.

Hac ratione calor nativus oculorum conservatur, ultimaque eorundem concoctio perfectissimè absolvitur. Quin imò animales per eam vitam spiritus non parum refocillantur. Feci ego hujus rei experimenta quam plurima, tum in ægrotis aliis, tum in me ipso. Et quod ego, qui annum ætatis 63. qui climactericus est, excessi, acutius & expeditius videam aliis, soli huic vittæ lectuariæ acceptum refero. De die verò ubi in publicum prodierit ægrotus noster, caput oculosque cautissimè ab externi aëris muniat injuriâ.

Sinistri oculi se se jam offert contemplatio. Laborat iste, ut supra factum inditum, suffusione vel Eclipsi. Humor quippe crassus partim phlegmaticus, partim adustus & melancholicus inter humorem crystallinum & foramen uveæ interceptus causat Eclipsin.

De humoris hujus maturatione, ut quid dicatur, nõndum opus. Quippè profundè admodum cum sit immersus regioni humoris crystallini, adeò, ut acicula prehendi nequeat, quid multa de maturatione ejus? quod si fortè (αὐτοψία præsentium medicorum hoc committo) humor ille inter tunicam corneam, humoremque interceptus esset albugineum, spes esset, eum, ubi ad justam pervenisset maturitatem, aciculâ abradi posse. Sicque deinceps visio restitueretur.

Intellexi, medicos domesticos, ægro nostro præsentibus, arbitrari, hanc in dextro oculo obscuritatem visus, ἀμβλυοπίαν esse, quam alii guttam serenam cognominant. At verò minimè locum habere potest ea sententia. Cum enim æger noster objecta visibilia percipiat quamplurima, quæ obsecro meatus nervi optici, quod in ἀμβλυοπία contingit, obstructus perhibebitur. Cum objecta quædam sensibilia adhuc, ut dixi, percipiat, signum

id est demonstrativum, quod imago objecti visibilis ad humorem deferatur crystallinum, & quod etiam discretio rei videndæ per spiritus animales obeatur. Quod verò indistincta visio, & imperfecta adsit dijudicatio, id demum spirituum siccitati, paucitati & subtilitati ascribendum. Cum etiam ἀμαύρωσις obstructionem pori optici omnimodam præsupponat cœcitatem, causæ visus aboliti in sinistro oculo non concordēs essent cum causis visionis tantum depravatæ in dextro. Subjectis etiam differunt causæ aboliti visus in sinistro, & causæ ἀμαύρωσεως. Hæc enim in poro consistit optico, visus, sinistri abolitus causam habet inter tunicam uveam & crystallinum interceptam.

Cum etiam ἀνελευσητία & ἀμαύρωσις subjectis conveniant, de eadem idem ferendum iudicium.

Cum ergo morbus hic adsit in malâ conformatione foraminis uveæ: cum etiam pauci tenues, subtiles, sicci & impuri nimis generentur spiritus: cum denique aër externus propter defectum spirituum deferentium non satis depurari queat; medicamentis parum proficiemus. Quin potius in eam incumbamus intentionem, ut præmissis universalibus & evacuato corpore, bonam victus rationem secundum quantitatem, qualitatem, tempus ordinem & modum competentem teneamus.

In primis verò omnis in bibendo evitetur excessus. Advertatur etiam sedulo, an visus promoveatur post usum conspiciolorum. Ita fiet, ut omnibus quæ sequuntur & referuntur, diligenter examinatis, majori cum fiducia medicamenta præscribantur.

Hæc in gratiam aëri nostri, secundum formam & normam relatarum mihi circumstantiarum respondere volui. Faxit DEUS Trinunus ut res ista felicissimum tandem aliquando eventum sortiatur.

CONSILIUM XXIIIX.

IN STUPORE, PER USUM LIGNI SASSAFRAS.



AD morbos capitis lignum Sassafras peculiari quodam summi DEI beneficio est accommodatissimum. Proin in stupore utiliter usurpari poterit. Idque vel per se, vel cum ligno sancto. Per se si sumitur, longè id præferendum Guaiaco, quod usus ejus cum magnâ quadam licentia sit conjunctus. Si cum Guaiaco, regimen Guaiacinum per omnia tenendum firmiter.

Deco-

CONSILIUM XXIX.
VEL DISCURSUS BREVIS ET SOLIDUS,
SYNOPTICE PROPONENS HÆMORRHAGIÆ CAUSAS
UNIVERSAS, UTI ET SINGULA FERÈ GENERA.

| | | | | | |
|------------------------|--|--|---|---|---|
| Hæmorrhagia fit, ex | Sanguinis peccantis vi- tio, nimirum. | copiosi in | { temperamento sanguineo, habitu carnosio, victu laudabili, vita otiosa defectu membrorum. | } | qui intra metum se continere nequit. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hæmorrhagia fit, ex | Viscerum | acris | { propter hepatis calorem victum curiosè conditum vel nimium saltum | } | qui venas erodit. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hæmorrhagia fit, ex | Virtutis corpus regentis | ichorosi propter | { crapulam ventriculi epatis | } | frigiditatem } qui sua tenuitate transiit. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hæmorrhagia fit, ex | Venarum | biliosi ex | { victu calidiore & pingui vino generoso hepatis calore motu { animi corporis | } | qui turget & sursum vergit. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hæmorrhagia fit, ex | Venarum | pituitosi ex | { hepatis imbecillitate ventriculi frigidi- tate, unde non elaboratur, | } | qui propter crassiciem ad habitum corporis non distribuitur. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hæmorrhagia fit, ex | Venarum | Flatulenti vel vaporosi, melancholici | { unde venæ distenduntur. lienis obstructionem hepatis calorem | } | qui deorsum vergit, varices & fici excitat. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hæmorrhagia fit, ex | Venarum | calore, qui plus chyli attrahit, frigore, quod non conficit chymum, | { & eundem plus justo calefacit, unde biliosus redditur. unde loturæ carniū similis fluxus. | } | qui deorsum vergit, varices & fici excitat. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hæmorrhagia fit, ex | Venarum | Robore, unde menses certis fluunt, unde dysenteria hæmatis, purgatur. | { unde hæmorrhoides statis temporibus dum habitus corporis per cavæ venæ ramos ex- purgatur. | } | qui deorsum vergit, varices & fici excitat. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hæmorrhagia fit, ex | Venarum | debilitate, unde symptomaticæ vacuationes, dum non retinentur utilia, vel non attra- buntur, sic fluxus ex venis portæ. | { Textura rampuntur exiles rami, in valido exercitio. rariore aperiuntur ora in excandescencia vel ebullitione humorum depurativa, hinc e- unde antemata & maculæ. | } | qui deorsum vergit, varices & fici excitat. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hæmorrhagia fit, ex | Venarum | Imbecillitate unde Obstructione, unde non fit distributio, vel assimilatio in atrophia. Situ decliviori, unde saburram admittunt. | { utiles humores cum inutilibus effluere sinunt secundarios succos non conficiunt. | } | qui deorsum vergit, varices & fici excitat. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hæmorrhagia fit, ex | Venarum | Continui solutione, propter ictum, conatum egerendi, sreatum, tussim, Medicamentorum superpurgantium vel hæmagogon usu, &c. | { Medicamentorum superpurgantium vel hæmagogon usu, &c. | } | qui deorsum vergit, varices & fici excitat. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Decoctum Sassafras cum Guaiaco.

Recip. Sassafras ℥ij.

Guaiac. ℥iſſ

Lig. aloës ℥ij

Coq. in aq. lib. X. ad VIII.

Dosis ℥v

Secundum decoctum coq. in lib. xij
ad remanent. X.

CONSILIUM XXX.

IN DOLORE LATERIS SINISTRI,
CUM SUSPICIONE FRACTÆ PER LAPSUM
COSTÆ, ET AFFECTUS SCORBUTICI.

N sorore tua, Vir perillustis, pro ipso Curationis primordio diligenter considerandum, doloris & quærimoniæ initium, & progressio: deinde dolores tum recrudescentes, tum mitigatiores redditi: tandem & ipse affectus locus. Hæc enim omnia sequentem morbi descriptionem mihi suggerunt.

Dico igitur quod sit in costa nothâ omniumque infima, collectio quædam humoris lancinantis, partim à melancholico, & ponderoso, partim à bilioso & effervescente sanguine dependentis.

Humori iste influxus in principio nullos concitavit dolores, quod ægra placidissime lecto affixa, ibidem conquieverit, nullaque causa, quæ ad motionem ipsam impelleret, in promptu fuerit. Postquam ipsa jam infortunio quodam infelicissime de loco editiore in pavementum deciderit, ibi verò demum & influxus ille humor fuit concitatus, qui jam novis subinde accessionibus accumulatur. Cum tamen humor ille biliosus affluens non sit copiosus admodum, tumor ille non ad plura se extendit loca, sed fixus permanet in pristinâ sede, qualitatemque eandem ferè semper retinet.

Dolores tamen accrescunt & accrescent semper usque dum materia illa influxa vel discutiatur, vel à natura consumatur. Sed nec interea temporis pax est omnimoda: quippe semper aliquod in loco affecto hæret residuum, quod dolorem causat punctorium.

Licet autem ægrota hæc foemina ante infelicem illum casum, deliquium quandoque animi, & cordis trepidationem experta fuerit: tamen id à liene, venis mesaræis, hystericoque quodam affectu exitit: quod tamen huc minimè referendum.

Hoc consideratione dignissimum, quod sequitur. Unde nam dolor iste, qui in quantitate medii Joachimici in uno semper consistit loco, suam trahat originem! Hoc si habuerimus, basin curationis nos habituros gloriabimur.

Receptissimum id est in schola Medicorum, quod dolor locum affectum indicet, & quasi loquatur.

Dolor verò iste hæret in costâ infimâ sinistri lateris: costa autem, utpote os, nequaquam sentit, nisi nervorum id fiat beneficio: quapropter in parte carnosa dolor residet verò verius.

Uterius quæritur, an concitetur hic dolor à materia, quæ in carne colligatur, an verò à fracturis vel fissuris costæ, quæ in lapsu illo infelici compressa fuerit. Posterius ut statuam, rationibus adducor gravidissimis. Earum prima hæc est ferè. Quicumque dolor gravis & acutus à materia causatur & continuatur influente, ille tumore & rubore manifesto proditur, & ab ulterius affluente humore ulteriora incrementa accipit, inque altum attollitur, & tactu deprehenditur, quod pars sub cute contenta sursum vergat & quasi renitatur tactui. Atqui in hac nostra ægrâ nec tumor vel rubor adest, nec locus affectus majora sumit incrementa, nec in altum attollitur & nec tactu quidem deprehenditur.

Ergo iste dolor non causatur ab influente quotidie materia.

Majori ut fidem faciam, non procul abibo allatum testimonia. Exempli rei ejus nobis suppetunt domestica. An non ad dolorem, qui fit phlebotomo, sequitur largissimus sanguis? an non dolor, ut cucurbita sanguinem ad se allicit?

Pergo: quicumque locus affectus semper eandem retinet faciem, tum eo, quò percipitur dolor, tum eò, quo nullus sentitur, tempore; ille ab influenti humore causari non potest. Atqui in ægrota nostra foemina eadem est loci affecti facies, tum quæ erat ante gravem illum è loco editiore lapsum, quo tempore nullus percipiebatur dolor, tum quæ jam lapsum illum consecuta est.

Ergò ab influenti humore causari nequaquam potuit. Hic mihi forsitan aliquis oganniat, dicatque dolores etiam adfuisse in dorso ante lapsum illum. Responsum id sibi is habeto: dolores illi à liene dependent, qui nequaquam huc transferendi.

Hæc cum ita sint, audacter pronuncio dolores hosce causari à costæ fractæ aliqua particula, quam tempus in lucem aliquando proferet.

Ad fracturas enim illas osseas natura omne robur suum transmittit, idque ferruminandi gratiâ: dum ita id natura molitur, dolores interim excitantur, qui tamen ad extra nec tumore nec rubore aliquo prodantur.

Docuit me experientia, rerum optima magistra, per multos annos quandoque dolores à fissuris ossium fuisse sentitos, cute externa nec inflammata nec protuberante, nisi quando demum per suppurationem fracturæ illæ osseæ ad extra promotæ fuerunt.

Quapropter nequaquam sperandum, posse tolli hunc dolorem, priusquam fracturæ istæ in abscessum degeneraverint: quod tamen brevi futurum arbitror, cum dolores magis magisque exacerbentur. Sed nec quandoque nonnihil fervidi sanguinis ad locum deferri affectum nego, qui dolorem unâ cum fractura exasperet. Docuerunt id tùm venæ sectio, tùm alia id generis medicamina, quæ hætenus quidem cum usu fructu adhibita, nequaquam verò ipsam doloris arcem demoliri potuerunt.

Institui hætenus discursum, qui causam formalem hujus indagabat morbi; Nunc verò ulterius ejusdem affectus curationem paucis persequar.

Operæ precium futurum arbitror, si ægotam nostram interdum leniter evacuantibus purgemus, tumque affluxum copiosorem sanguinis & melancholici & bilosi per phlebotomiam intercipientes, nequa fiat, ut sanguis atrabilarius istic nidificet.

Bibendæ deindè portiones modeste refrigerantes: tandem deveniendum ad Topica, quæ & anodyna sint, & defensiva & discutientia.

Ne major fiat affluxus, id tali præcavetor ingenio. Singulis septimanis vel præter propter, succus evacuetur Melancholicus, quod fiat portione A. notatâ.

Necessarium id apprimè: eò potissimum, quod lien si eum in venas suas angustissimas receperit sanguinem, dolorem ex accidenti augeat. Præterea cum sanguis iste crassus sit & ponderosus; lac etiam naturali sua humiditate succos siccos & frigidos tùm emollit tum fluidos faciat: suaserim ut ægota quandoque lacticiis utatur in cibo. Si diebus subsequen-
tibus deprehendamus, cum bonis agræ rebus lac assumi, lactis continuandus usus multoties.

Horis etiam matutinis quandoque propinetur decoctum lactis vel feri caprini, in quo cochlearia vel nasturtium aquaticum ebullierint. Medicamentum id vulgare & jejunum: sed revera in morbis melancholicis

& tumoribus in quibus metuitur affluxus materiæ atrabiliaræ, non parum prodest.

Verè dico, vulgare id medicamentum cunctis menelagogis palmanum si non præripit, ambiguam tamen facit. Si metuitur, ne lac flatus pariat, ejus loco serum substituatur. Dico si metuendum: vix enim fiet, ut cochlearia vitiositatem lactis non corrigat, dum incidit & attenuat crassissimum illum sanguinem, sicque expulsiōi idoneum facit.

Utuntur quidam in hoc casu lactucā Endiviæ, quam cum foliis borraginis juri gallinaceo incoquunt. Sed non magnopere id ego probarim, tum quod superius decoctum hætenus me nunquam optato successu frustraverit, tum quod & individualis quædam in hoc subjecto id ita requirat proprietas. Scorbuto quippe, vel leucophlegmatia, vel Ictero nigro illustis hæc scæmina non parum futura videtur obnoxia.

Ne etiam ventriculus, epar & lien ulterius ejusmodi gignant sanguinem, cautu opus est. Quapropter Conditi B. matutino & vespertino tempore, portionem in quantitatē castanæ capiat, jejuna postmodum maneat ad tempus usque solitum.

Quod si dulcia huic scæminæ non ingrata fuerint rotulas C. quandoque in usum revocandas censuerim.

Hæc si unâ cum decenti diætâ, de qua præsentēs præcipient Medici, tentata fuerint, spero rem non infeliciter successuram.

Unum hoc loco monebo, priusquam abeam. Si fortasse potio purgans A. ingrata futura est ægrota huic dominæ, quod fortasse autumnus & veris accidere posset tempore, ante missionem sanguinis: Nodulus D. cerevisiæ immergendus, deque eo potu primus in mensâ sumendus haustus. Eundem usum Enema etiam præstare poterit, si præsertim lien contumaciam præ se quandam tulerit.

Fortassè hic quisquam sapientulus dixerit, fracturas costæ diigentius pensitandas: utque ex partes fractæ residuæ educantur, undiquaque circumspiciendum. Responderim ego huic, in Theoria hæc quidem dici posse, cum usu verò practico convenire neutiquam. Natura enim ante tempus non patitur sibi injici laqueos, quicquid etiam agat Medicus. In naturis robustis & minus delicatis quandoque miraculosa ejusmodi curationes tentari possunt, quas in delicata hæc ægra, ne per ideam quidem nobis imaginari possumus. Ibant dum poterant: dum non poterant, ibi stabant. In sex rebus non naturalibus ut procedendum præsentēs monebunt Medici.

Deus deorum benigniter hoc nostrum propositum felicitet, Fiat, fiat, &c. Recip.

Recip. Fol. Sennæ f. stipit. 3v
 Rad. polypod. q. 3iij
 Sem. Dauci
 Anisi ā. 3js
 Passular. 3iij
 Cors. cappar. 3js
 Herb. capill. Ven.
 Veron.
 Ling. cerv. ā. Mß
 Flor. borrag.
 Buglß. ā. 1ß
 Coq. in s. q. aq. nasturtii aquat. pro 3iij
 In quib. dissol.
 Exir. melanogogi nostri gr. viij
 Syr. de pomis 3vj
 Mis. f. Potio A.

Recip. Rad. cichor. condit. & incis. 3v
 Cort. citri condit. 3iij
 Zinzib. Chin. cond. 3ij
 Conf. rosar. vet.
 Flor. tunica ā. 3vj
 Conf. cochlearia 3j
 Spec. rosar. novell.
 Diarhod. Abbat. ā. 3ij
 Diambre 3ß
 Magister. corall. rub.
 Margarit. ā. 3j
 Conf. Alkermes 3ß
 Ol. cinamomi gr. iij.
 F. l. a. Conditum B.

Recip. Rad. sænic.
 Cichor.
 Asparag. ā. 3ijs
 Sem. anisi 3ij
 Herb. cochlear.
 Agrimon.
 Cuscuta
 Capill. Ven. ā. Mß

Fol. Sennæ Alex. ℥j

Rad. polypod. quer. ℥ss

Rhabarb. inter. & opt. ℥ij

Rad. mechoacan. ℥ij

Cinamomi el. ℥js

Spica ℥j

Zinzib. ℥ij

Ex incisis & contusis fiat

Nodus C.

CONSILIUM XXXI.

IN PLEVRITIDE SPURIA.



Nil à Medico agi potest, sine cognitione morborum, causarum, & partium affectarum.

Ea verò cognitio haberi nequit, nisi quis symptomata eorumque naturam exploratam habuerit.

Itaque de affectionibus tuis sententiam meam expositurus, symptomatum quæ te affligunt, seriem in limine quasi constituam.

Inter quæ symptomata præcipuum est dolor in regione pectoris circa mammillas sæpè numero molestias inferens.

Qui dolor non tam in externis partibus, quam internis sentitur. Estque pungitivus & qui facili momento recedit. Affligit vespertino, tum nocturno frequentius. Interdum vehemens dolor est, & referre videtur, te ipso teste, palpitationem cordis. Duravit per sex ferè annos. Initium fuit quidam dolor circa mammillas, cui successit tumor, qui sponte ruptus est. Fuit cum quâdam duritie, sed non cum dolore conjunctus. Effluxit multo temporis spacio materia quædam ichorosa; eoque tumore foliis Tabacæ sanato, dolores quidam semper, non certo tamen temporis spacio, redierunt, iique subindè graviores.

Hæc symptomatum historia est, quæ ad suos morbos & causas reducenda est.

Dolor symptoma est ad factum depravatum pertinens. Depravatum verò is potissimum à solutione unitatis. A quibus verò fit solutio plurima sunt, quorum ea quæ ad rem præsentem non faciunt, silentio involvam, idque quod hujus doloris causam esse existimo, tantummodo

modo huc conjiciam. Estque distentio quædam partium in regione Thoracis.

Distenduntur partes à variis causis : in nostro casu distentio ea fit præcipuè à flatibus, cujus rei argumenta sunt, tum quod dolor ille subito exoritur; tum quod citò recedit. Denique quod vagus est, neque in uno loco perstat, sed nunc hoc nunc alterum latus præcipiti quadam insultu præhendit : quæ omnia solis flatibus maximâ cum ratione à Medicis ascribuntur. Patet ex his doloris hujus causa; quæ à flatibus proficiscitur. At quia flatus ubi ubi in corpore reperiuntur, soboles sunt humoris aliquis flatuosi, ex quo resoluti elewantur : Itaque indagandum qualis humor ille sit : dein an in partibus thoracis generetur, an verò aliunde eò deferatur : postremò quæ causæ sint vel generationis vel transmissionis.

Ex humoribus flatuosi sunt ii qui frigidi: calidi enim nisi frigidis permisti sint, vel nunquam flatuum materia existunt. Frigidi humores vel sunt pituitosi vel melancholici. Ex utrisque in hoc casu flatus elevari videntur.

Ut hoc credam, ea me adducunt, quod & in tumore qui mammillas ante aliquod annos occupavit, aliquid humoris melancholici admixtum fuit, id attestante duritie, quæ in tumore comprehensa est, tum colore ejus tumoris, ad obscurum vergente : præterea in idem conspirantibus omnibus affectionibus, quæ huc usque in superioribus corporis partibus contigerunt, in quibus semper aliquid humoris melancholici admixtum fuisse color affectarum partium humorum indubius index ob oculos ponit.

Ea tamen humoris melancholici portio non multa est, neque aliena ab eo qui in venis continetur.

Dilutus est hic humor cum materia pituitosa, tenuiori, dulci : præterea cum ichoribus copiosis, unde & in tumore (cujus sæpius facta mentio) materia quæ effluxit, magna ex parte tenuis, & flavitie quædam tincta fuit. Faciunt hi ichores, ut pituita illa, cum portione melancholici humoris, ad partes pectoris facilius ferantur, quibus eò delatis, caloréque in eos agente, flatus excitantur, qui distendentes illas partes dolores inferunt, & quia tenuis sunt substantiæ, tum quia calor in thoracis partibus ob cordis vicinam robustior, facile dissipantur, ac dolor quoque abeunte causa definit. Quod si aliquando diutius durat, dubium non est, quin materia, à qua flatus insurgunt crassior, ac copiosior sit, uti accidit præteritâ hyeme (qua frigidi humores potissimum abundant) quo tempore hic dolor satis diu sub noctem molestus fuit.

Secundum quod disquisitione dignum, est an in partibus thoracis, humores ii generentur, an verò aliundè eò affluant. Quod à capite in eas partes aliquid feratur, dubitare non possumus, cum in propatulo sit, caput multarum fluxionum esse causam.

Caput enim humidius est, undè multum expuit, in nullo tamen excessu insigni frigiditatis & caliditatis constitutum, unde omnes actiones, quæ à principibus facultatibus dependent, feliciter obit. In somnum non est proclivis, quod nimirum cum humiditate illa, unde pituita tenuis producit, potius caliditas quàm frigiditas & sicci humoris aliqua portio adest.

Attestantur idem affectiones præteritæ, tumor gingivarum, repletio musculorum cervicis, sensus humiditatis cujusdam in pectus descendentis, quæ elapso tempore evidentiora fuerunt, ac certa fluxionis à capite indicia. In ipsis quoque thoracis partibus produci consimiles humores verisimile est, quod à diuturno humore circa mamillas, tum à doloribus istis sæpius recurrentibus robur earum partium imminutum fuit, cavitatesque dilatatæ; quæ utraque tum ad generationem, tum susceptionem superflue humiditatis plurimum faciunt.

Causæ à quibus isti humores vel producuntur, vel transmittuntur, tum ratione præteriti, tum præsentis temporis considerantur.

Ac ratione præteriti possunt ex in internas & externas distingui. Externæ consistunt in variis erroribus, in sex rebus non naturalibus commissis, veluti sunt errores in videndi genere, circa cibum & potum, qui studia excolentibus graviter nocent: nimirum studium præsertim statim ab assumpto cibo, & potissimum sub nocturnum tempus, multæque id generis aliæ, quarum aliquæ ad superfluum proventum, aliquæ ad capitis repletionem atque aliquam debilitatem inducendam vim obtinent non exiguam. Internæ, tum respectu præteriti temporis, tum præsentis eadem sunt: quarum aliæ generationis humorum sunt: aliæ transmissionis. Causæ generationis consistunt partim in ventriculo, partim in parte affecta, scilicet thoracis regione. Ventriculus quia humidior, causa est ut aliqua tenuis superfluitas in ipso generetur quæ ad caput & vicinas partes transmitti, vel saltem ea consensus ratione alterare potest: causa etiam est, ut deinceps in Epate copiosiores humores serosi, iique quodammodo crudiores producantur, quia aliarum superfluitatum ad partes debiliores vehiculum sunt. Præterea etiam quæ ad crudiores, authores existunt flatuum & dolorum vagantium. Partes verò in thorace affectæ, nonnihil consimilis excrementi generant, quod nimirum tanti temporis spacio ab affectionibus

bus istis debilitatæ, aliarum partium superfluitates susceperunt, à quibus nonnihil alteratæ, nutrimentum quod ad eas advehitur, ita probè vix commutant, quin crudiora excrementa relinquantur, quæ facili evacuationi minus apta in partibus iis hærent, donec à calore subigantur, in qua subactione flatuosi aliquid insurgere rationi consentaneum est.

Causæ transmissionis triplicem considerationem habent: primam quo ad partem transmittentem: secundam quo ad suscipientem: tertiam quo ad vias per quas aliquid transmittitur.

Transmittens pars caput est, quod dum humidius humida excrementa generat, quæ tanquam sibi molesta, innatâ expellendi vi à se rejicit.

Humidum a. esse caput antea ostensum, quo etiam hoc signum pertinet quod interdum cum sputo matutino tempore, dilutus sanguis excernitur, qui ob raritatem venarum ex humiditate ortam inde excidit, & spuitione ejicitur. Aliundè etiam & à venarum propaginibus ad eundem locum aliquid interdum effluere, conjecturæ sunt, quæ ostendunt, sed quæstio hæc exigui momenti.

Suscipiens partes pectoris sunt, ad quas ea excrementa demandantur, tanquam ad eas, quæ debiliorum rationem habent.

De tertio, de viis scilicet, nihil dicendum amplius, quam quod ejusmodi excrementa ad has partes maximè feratur, ob introductam (qualis qualis jam sit) aliquam laxitatem.

Hactenus de causis generationis & transmissionis humorum, qui flatuum causa, secundò verò dolorum existunt. Quæ ut hoc tempore vigente robore caloris naturalis, in ætate ista florente, leviores sunt, ita affectione, minoris momenti producunt. Istis causis explicatis cognitio ipsius affectionis, ejusque causarum exposita est. Superest, ut de parte affecta accuratius aliquid hùc conjiciatur. Sunt n. multæ partes in thoracis regione, continentes scilicet & contentæ ac rursus utrarumque multiplices.

Ex contentis cor est, pulmo, diaphragma, in quibus has affectiones non consistere ostendi posset, nisi nimia prolixitas fugienda.

Ex continentibus plures sunt, sed in quib. dolores excitari possunt, potissimum tres, cutis, muscoli, tunicæ. Quod in cute hi dolores non fiant, testatur sensus ipsius doloris, qui in parte interiori, non in externa, qualis cutis est, deprehenditur. Quod neque in musculis, aut certè non præcipuè in musculis, argumento est doloris species. Pungitivus n. dolor est, qualis non in carnosa parte, sed membranosa, ipsiusque tunicis contingit, quod in Pleuritide manifestò apparet. Pervenit ad ejusmodi partem materia peccans, potissimum per venas, per quas & à capite ali-

quid defluere videtur, elucere quod idem per venas transmissa materia tumoris in gingivis, in earumque parte penitiori, tumoris cujusdam eminentioris causa ante hac extitit. Non inde fit Pleuritis, quod non crassior humor, isque copiosus extra venas in spacia illarum irrui, sine quibus difficilima fit Pleuritis. Si quis tamen ad Pleuriditis spuriae, & à flatu proficiscentis speciem hanc affectionem referre velit, non aberasse censendus.

Eruta cognitione eorum omnium, quæ curationi malorum præmittenda sunt: instituenda consideratio quid in curando assequi possimus, quod ex indicationibus, quæ nobis aperiunt, quid agendum sit, perspicuum fit. Idem & de indicationibus dicendum, quæ in nostro casu variae sunt, quarum aliquæ à symptomate: aliquæ à morbo; aliquæ à causis sumuntur.

A symptomate inquam oriuntur indicationes, non quatenus symptoma est, sed quatenus symptoma id rationem causæ consequitur. Contingit verò id in paroxysmo, qualis præterita hyeme fuit, qui & satis diu duravit, & satis molestus ob vehementes dolores. Oritur verò ratione hujus symptomatis indicatio, scilicet leniendi dolorem.

A morbo quem in numero solutæ unitatis ponimus, unire soluta.

A causis: flatus discutere: materiam flatuum quatenus crassior, & evacuationi minus apta, attenuare: quatenus frigida calefacere: ut humida siccare, ut quantitate peccat evacuare. Et ne generetur amplius, id prohibere roborando partes, à quibus producit. Præterea quatenus movetur à capite, eam revellere derivare. Ac ne suscipiatur, partes pectoris roborare: vias per quas fertur, ut laxiores sunt adstringendæ. Ex quibus indicationibus quædam minus, quædam magis utiles & necessariae sunt. Utiliores & magis necessariae vel paroxysmum præsentem spectant: vel extra paroxysmum occurrunt. In paroxysmo duæ sunt necessariae: lenire dolorem & flatus discutere. Extra paroxysmum attenuare, calefacere, siccare, evacuare, partes alterare, revellere, derivare, roborare, laxa adstringere.

An hæc consequi possimus quæritur? Res est certè difficultatis plena, tum quod omnes affectiones inveteratæ (quales præsentis sunt) pertinaces evadunt: tum quod in generosis auxiliis, qualia antea à Clariss. Medicis adhibita fuerunt, non cedens difficilimæ curationis omnium iudicio existimatur.

Sed licet difficilimum sit has affectiones radicitus evellere, non ita tamen rebelles sunt, quin mitigari atque insigniter quidem possint, progressu etiam tolli iis auxiliis, quæ nondum fuerunt adhibita: præsertim cum

um & præterito tempore, institutâ curatione, non tantum mitior fuerit redditus morbus, sed & ad spacium aliquod temporis planè profligatus. Et cum hoc tempore paroxysmi etiam leviores & rariores evaserint, nulli dubitamus, quin deinceps etiam multò rariores sint futuri.

Hæc nobilissime Vir de affectus tui diagnosi & prognosi ad te scribere volui, ut petitioni tuæ satisfacerem: medicamenta, eorundemque tendi modum mecum allaturus, quamprimum mihi per occupationes te visitare licuerit. Interim benè & feliciter vale.

CONSILIVM XXXII.

**IN DIFFICILI RESPIRATIONE, CUI
IMMODICA NARIUM HÆMORRHAGIA CON-
JUNCTA: QUÆ OMNIA, UTI EVENTUS DOCUIT,
DEXTERRIME FUERE CURATA.**

Nobilissima Matrona N. domina reverenter colenda: Ægritudo tui filii, quâ ille diris conflictatur modis, est catharrus, qui in pulmones se jam insinuavit penitissimè, adeò ut ipsam respirandi actionem reddat impeditissimam. Inde fit, ut dum pro respiratione denuò captat aërem, totum thoracem non sine magno nisu cogatur attollere. Rheuma enim quoddam frigidum & viscidum, quod pulmonum opplevit vasa, ad eosdem pulmones centrum gravitatis propendere efficit. Sed nec id solum difficilem reddit respirationem, cum & alias subesse causas deprehensum sit. Aer enim ille, qui per *σπείρον* intro recipitur, non sine impedimento, labore & molestiâ per catharrhos illic contentos transire potest. Causas hujus mali, æquâ pensamus lance, dicendum, eas tum à refrigerato, tum verò à adusto salsuginoso-corrosivoque dependere sanguine. Quin imò & hoc addendum: tum pars mittens, tum pars corporis recipiens hic in considerationem veniunt.

Mittunt eum sanguinem venæ, in quibus dominatur plethora. Sed quomodo ais, vitiosus ille sanguis in venis generatur? Euge verò, benè est: plus continetur in venis sanguinis, quàm cui regundo natura sufficit. In venis, cum sanguis obruatur multitudine, effervescit, rectaque aperit quod operculum est corporis, petit, sursum ascendens, E capite

partim sub *ἀναστροφή* venarum exit è corpore : partim deorsum vergit ad sinistrum latus, in quo pleuritidem efficit spuriam. Quod si quandoque accadat, ut nec per nares, nec per pleuritidem absumatur totus, tunc pars quædam illius ad pulmones vi summâ protruditur. Inde dyspnæa illa, quæ suffocationem quandoque minatur, existit. Adaugetur id periculum, si sanguis ille ad caput delatus, & jam in spiracula illapsus humores pituitosos cerebri secum eò abriperit, deduxeritque. Ingens quippe tum temporis & tussis & dyspnæa causantur certo certius. Sanguinem hunc vitiosum tamen, qui in nares, fauces, pulmones, tunicamque succingentem illabatur, generant tum ventriculus tum Epar primum sanguificationis organum. Ventriculus quidem id facit, quod naturali labore imbecillitate, intemperieque affligatur frigida & sicca. Inde si vel maximè cibi ventriculo obiciantur laudabiles, in chylum tamen illaudabilem, puta frigidum & siccum, ij convertuntur.

Hæc primæ coctionis vitia, in ventriculo commissa, dein in epate secundâ coctione corriguntur neutiquam. Epar enim quod constituitur ejus sit calida immodicè, & non nihil duritiei contraxerit, neutiquam laudabilem, sed falsum, acrem & adustum producit sanguinem. Isti pro nutritione earum, ad quas transmittitur, partium, nequaquam omnimodè est idoneus. Colligatur ergò, ubicunque etiam id fiat, necessum est.

Colligitur in ægri nostri potissimum capite : ibidem quippe in crassam pituitosamque convertitur substantiam. Pituita illa in capite collecta, ubi vel pondere suo deorsum vergit, vel etiam à naturâ criticè expellitur, pedetentim in organa respiratoria illabatur, tussimque hoc pacto concitat. Ubi pulmones summo per tussim nisu excalefacti fuerint, tum verò deum plus attrahunt humorum.

Hoc ubi factum, humores illi non solum instar pluviae cujusdam in pulmones decidunt, sed & in ipsa pulmonum vasa se se immittunt profundissimè. Inde totalis quasi existit respirationis abolitio. Et hæc quidem de iis humoribus, qui per internas capitis vehuntur venas. Quod si verò humores ij perniciosi intra calvariam & pericranium intercipientur, tunc nequaquam pulmones, sed costas petunt, earumque opplent tunicas. Hæc ratione & dolor conciliatur punctorius & difficilis respiratio. Sed hæc posteriora nequaquam tantum creant periculi, quantum fortasse priora, de quibus supra ubertim dictum.

Si ergò, ut hoc inferam prognostici loco, cum maximè opus sit, quod persona ægri delicata sit & nobilis : si inquam talis tantusque humo

um influxus annârit & perennârit diutius , futurum dico certissimè , ne solum pulmones reddantur imbecilliores , sed & ipsi ab eodem humorum influxu excarnificentur adeò , ut quamcunque etiam peccantem materiam facillè admittant. Tota quippe massa sanguinea fenestram habebit aperissimam , eò confluendi affatim. Postquam igitur idem influxus contraxerit habitum , haud facillè extirpabitur.

Ut ergò malis his maturimè occurreretur , primò omnium intentio curativa dirigenda ad ventriculum & Epar : dein ad ipsum caput : postidea ad massam sanguineam : tandem verò ad ipsos pulmones.

In ventriculo melior curanda concoctio , ne ita impofterum totus chylus in acidum & ingratum convertatur succum , sed dulcem , naturæque acceptabilem.

Epatis obstructions censuerim referendas , epar emolliendum , caloremque ejusdem immodicum modicè refrigerantibus temperandum. Itaque quippe futurum , ut Epar è ventriculo egestum chylum non adurat , sed nobilissimum in sanguinem convertat.

Satis autem fiet utrique huic scopo , si epar & ventriculus succo quodam leni & solutivo evacuentur. Ita sanguis melius dulcescet , qui deinceps nec tantâ cum ferociâ per vias feretur corporis , nec & immodicum calorem contrahet.

Eum ad usum æger noster pilulis lenientibus , literâ A. notatis , utitur. Sumuntur eæ sub auroram : imperandumque ad horam usque decimam jejunium. Sequenti die manè sub auroram succi B.umat cochlearia bina : utitur eo succo calidè , statimque postea somno se componat ad horam mediam.

Prohibeatur tamen cautissimè , ne dum post usum illius succi sub somno sudet : esto jejunus ad horam usque decimam. Hujus succi usu massa sanguineæ emendabitur acrimonia. Per alvum etiam id de die evacuat bit quater , vel præter propter. Hæc res si ita ex voto successerit , sequenti , tertiâque repetenda est die. Quod si duo , quæ dixi , cochlearia alvum non solvant quater , quatuor de die recipiantur plena cochlearia. Postquam ad integrum triduum hoc usus fuerit succo , die quarto ab omni medicamentorum usu cessabitur. Deinceps verò massa sanguinea , quod tertia innuit intentio , consideranda penitus.

Hæc sanè massa sanguinis , cum ob multitudinem conclusa incaluerit , & consequenter ebullierit , exitumque quærat , suaserim , operæ precium nos facturos , si ad naturæ ductum nos accommodemus : cumque ipsa natura sanguinis imminutionem moliatur per nares , nos eundem detrahamus.

mus per venæ sectionem. Fateor sanè id genus remedii, pueris, qui ex Ephebis non exceſſerint, parum eſſe commodum. Cum tamen nihilo minus id remedii natura quaſi intento digito nobis commonſtret, idquæ ſemper cum bonis ægri rebus fiat: quapropter volo jubeo, ut eo, quod medicinis non utitur die, vena tundatur Media, ad emiſſionem unciarum ferè trium. Ita per conſuetudinem habitualement natura eò, quicquid vitioſum, detrudet: ità etiam annuatim hoc repetendum præſidii chirurgici genus. Suaſerim etiam diligenter, ut poſt venæ ſectionem, (modò ea feliciter ſucceſſerit) cutis ſcarificetur appoſitis cucurbitulis, idque repetatur multoties. Cum enim fidem faciat *ἀντὶφρα*, contentos intra calvariam & pericranium humores deorſum ferri: quidni jufferim, ut per crebrum cucurbitarum uſum humores ij ad ignobilioreſ deducantur partes, ibidemque evacuentur penitus. Poſt Venæ ſectionem ut rem repetam, ad triduum utatur ſucco B. ſequenti die ſint feriæ: demum verò ſucci repetatur uſus. Quod ſi ſuccus ille interea temporis condenſetur nimium, vel etiam aceſcat, valedicendum ipſi, ne naſeam pariat ventriculo, quapropter tunc ad biduum ab omnibus abſtinendum medicinis.

Tertiò die poſt pro evacuatione capitis & pulmonum pilulis C. utatur manè h. 6, cum debito ad horam uſque decimam jejunio.

Tandem quartus reſtat ſcopus, ut nempe pulmones ad naturalem reducantur ſtatum. Inprimis autem hoc loco humor pituitoſus qui jam influxit & radices egit, radicitus extirpandus. Humor iſte pedetentim incidendus & demum educendus. Complebitur iſtud uſu ſucci D. ſuma hujus ſucci diebus ſingulis portionem mediæ cochlearis. Fiet id manè poſt lotionem, oriſque ablutionem & gargarisationem. Contineatur ſuccus hic ore, uſque dum ultrò diffluſerit: continuetur per triduum.

Ut verò & ventriculo debita conſervetur temperies & conſtitutio, per integrum octiduum utatur æger noſtro pulvere ſtomachali E. notato Doſis ejus, cochlear unum parvum, quali utuntur aromatarii. Nihil poſtidea bibatur, vel comedatur. Decurſo octiduo, ad dies pauculoſ ceſſabit, deinceps verò denuò in uſum revocabit, modo conſimili.

Ne inſuper ſolius ventriculi & pulmonum habeatur ratio, reliqua quoque membra omnia univerſi corporis non negligenda penitus.

Proderunt eam ad rem Morſuli F. Ejusmodi morſuli partem ferè mediam accipiat hora poſt meridiem tertiâ, jejunando ad cœnam uſque. Eorundem etiam uſus tam diu continuandus, uſque dum penitus ſin abſumti.

Et hæcenus de Medicamentis, quæ ad præſervationem ſubitanei aliqujus ſymptomatis poſſunt facere : jam de iis, quæ ſi ex improvifo ſuffocativus incidat catharrus, adhibenda. Semper ergò eam ad rem idonea, ad manum ſint medicamina.

Primum locum hîc obtinet ſuccus berberorum. Doſis, quantitas avellana, ſi ori imponatur, ſpontaneaſque relinquatur diſſolutioni. Idem ferè præſtabit ſuccus G. qui ſi dimidio ſumatur cochleari, ſponteſque in ore diſſolvi permittatur, catarrhos ſuffocativos maſculè debellat. Sumendus etiam aqua fontana ſextarius, in quem guttæ de ſpiritu ſulphuris acido infundantur, quotquod ad gratum ſaporem ſuffecerint. Aqua hujus doſis unum eſt cochlear.

Neceſſitatis etiam tempore convenientiſſimum erit, ſi potui immixtum fuerit oleum olivarum puriſſimum.

Summa etiam efficaciam eſt Aqua Aurea noſtra, de qua in caſu neceſſitatis cochlear unum poſt alterum præſcribitur.

Quo tempore catharri ſummo impetu (quod eſt paroxyſmus) decumbunt in fauces, æger collocandus in ſellam, fricanda brachia & pedes, pectus tegendum veſticulis calidis, aer etiam frigidus irruat in faciem. Quod ſi fenestras aſtantes aperire nolint, ventulum ipſi faciant flabellis, venulabris, aut patinis etiam ligneis. Et tantum de medicamentorum uſu: de Dieta pauca.

Modus ſtatuetur exquiſitus cibo & potui. Niſi enim Dieta manus auxiliares præbuerit medicamentis, oleum, certò perdiderimus & operam. Caveat ſibi æger noſter ab aëre nebuloso, frigido & humido. Vitet moram ſub dio, ſub pluviis. Caput nunquam pileo careat. Vitet moram ſub ſole, ut & violentiam ignis caminarii. Abſint ab ipſo fumî, vapores, exhalationes, qualeſcunque eriam. E maſtiche tamen, vel pulvere H. fieri poterit ſuffumigatio. Cibus vitet cacochymos, dyspeptos: è quorum cenſu, carnes fumo duratæ, capita & pedes animalium, aliq̃ue ejus furfuris cibi. In cibum veniant hœdi, vituli, boves juvenculi, gallina cujuſcunque ætatis, galli caſtrati, perdices, aves montana & campeſtres. Aquaticæ aves in ſolidum arcentor, ut & caro cervina & aprugna. Piſces non benè conveniunt, tum quod frigidum generent ſanguinem, tum, quod non leve eſt, ventriculus iis concoquendis non ſufficiat.

Varietatis tamen gratiâ indulgendi quandoque lucii, auratæ, gobii, fluviatiles, perca.

Eleguminibus conceſſa ſunto pultes nucum pinearum, piſtacio- rum, amygdalorum dulcium: pruna itidem ungarica, ſemen hordei in

molâ præparati : pira similiter tam assa quam cocta , ut & citonia , post mensam tamen. Proderunt quoque pulmenta cerevisiaria , ova recentia mollia , ova liquidius frixa. Absint taganitæ , placentæ tornatiles , stribilitæ , liba ex ovis , lacticinia , juscula.

Ordo etiam servandus in ingerendis cibis , ut & carnes cum piscibus nunquam confundendi. Quod si id evitare non possit , pisces præmittuntor , subsequuntor carnes. Memor sit ipse versus , quem commendant Medici :

Sic bibito ut sitias : sic ede ut esurias. Motus corporis non sit nimius. Proinde saltus , pugna , discursus , ambulatio , omnia mediocria. Vociferationes , interruptasque & longas perorationes vel recitationes cane & angue pejus devitet. Si nox ad lectum non intret Luna fenestris. Alvus nunquam sit constipata , sed semper suum faciat officium , sive arte fiat , sive naturâ.

DEUS Deorum clementer benedicat. Fiat , fiat , &c.

CONSILIUM XXXIII. IN ASTHMA TE.



Effectus , quo mater tua laborat , vocatur Asthma , cujus primaria & ultima , retro eundo , causa est ventriculus frigidus , vitiosis atque corruptis humoribus scatens.

Inde enim multi vapores ascendere , in capite congelascere , & ad pulmones relabi , bronchiaque eorum obstruere , unde necessario difficultas spirandi evenit , solent.

Quin etiam in iis moram trahentes , temporis diuturnitate , pulmonumque calore magis magisque incrassantur , lentescunt , atque ita angustiam augent. Hocce loci quæritur , unde inæqualis tussis , unde etiam illa , inæqualis tamen spirandi difficultas ? Breviter si materia est in canna pulmonis sentitur gravitas & oppillatio in partibus gutturis , & fit excreatus facilius cum tussi parva & rascatione.

Si verò sit in ramis parvis tracheæ arteriæ distantibus à canna non fit excreatus nisi cum tussi multa.

Si verò materia contineatur in vena arteriali vel arteria venali frequenter est Asthma sine tussi , & si est tussis est sine sputo , & fit pulsus tremulus , maximè quando materia continetur in arteria venali propter tremorem sive pulsum cordis tremulum , cui pulsus arteriarum proportionatur,

natur, & hoc asthma perducit frequenter ad tremorem cordis confirmatum & syncopen & mortem si verò materia contineatur à carne molle fit scireatus secundum plurimum cum tñ sñ multa & laboriosa.

Si verò asthma pendeat à ventositate sentitur extensio sive gravitas, quæ aliquando permutatur, & si sit in pectoris spacio, id est inter pulmonem & pectus fit difficilis inspiratio, & pulmonis dilatatio.

Si verò contineatur in pulmone, fit difficilis expiratio & pulmonis constrictio. &c.

Malum certè curatu, utpote in sene, satis difficile, ut taceam tempus hyemale & causam morbi pituitosam, quæ non nisi per longa intervalla expugnari potest. Etsi autem malum hoc adimi prorsus nequeat: ineunda tamen est curatio, propterea quod leniri, diuque justis remediis adhibitis, vita prorogari possit. Mature igitur id agendum: ne vitalis facultas, cujus fovendæ pulmones magnum pondus obtinent, labascatur: aut etiam ægra, catharrho novo affatim allapso, repentinâ, quod haud paucis contigit, morte & suffocatione intereat.

Itaque ventriculus quidem & caput roboranda erunt calefacientibus atque adstringentibus, humoribus tamen vitiosis è ventriculo prius eductis quod pilulis potissimum tentare utile fuerit: ex n. diutius in illo morantes exquisitius etiam illum unâ cum capite expurgant. Materia autem pituitosa consistens in capite, evacuetur errhinis. Apophlegmatismorum usus hoc in loco non videtur esse tutus, quippe qui morbificam materiam magis ad pulmones præcipitare possit. Antequam verò id fiat: præparanda erit calidis incidentibus & detergentibus. Materiæ etiam motus è capite ruentis inhibeatur, revellentibus atque intercipientibus, ut ligaturis & cucurbitulis non scarificatis, capiti aut etiam brachiis scapulisque impositis: reprimentibus quoque, ut sunt: ribes, berberis, uva spina, & alia adstringentia, angustantiaque. Syncipiti etiam lini aut cannabis stuppa, thurè, mastiche & sandarachâ suffumigata utiliter imponi solet.

Ratione materiæ impactæ conducent incidentia, detergentia, aperientia & expectorantia. Pulmones ipsi, ne tam promptè suscipiant, roborentur.

In paroxismo, quia suffocationis periculum imminet, utiliter exhibetur dimidium cochlear aquæ ruffæ vel aureæ meæ descriptionis, posteaque ad causam demoliendam rursus via reflectatur.

Ad victus rationem quod attinet, aërem eligat temperatum, aut subcalidum & siccum, ferenum, purum, nec aquarum aliarumque foetentium rerum expiratione inquinatum. Non sit conclusus, aut fumo obscura-

tus. Sensim etiam mutandus est : nec quicquam ferè magis nocivum, quam si ex aëre frigido in æstuarium impensè calidum patiens se se conferat : liquatur enim humor, affatimque impetum in pulmones facit. Cibi sint concoctionis faciliis, calefacientes, incidentes atque exiccantes, magisque idcirco assi quam cocti : aut si coquantur, addi debent serpillum, rosmarinum, origanum &c. Aquatilia hîc obsunt. Potus sit vinum non vaporosum : & cerevisia mediocris consistentiæ & ætatis.

Exercitia subeantur ante prandium & cœnam, quiere tamen ante cibum, horam unam, aut minimum dimidiam interpositâ. Somnus horas septem vix excedat : caveatur pomeridianus. Observandum præterea ne decumbat supinus : sed in latus alterutrum capite elato, nequaquam demisso. Alvus quotidie sit aperta nisi naturâ, chystere tamen aut balano. Sudor maximè circa caput si fluat, in declinatione, valdè conduxerit : quo nomine capite probè munito semper dormiat.

Mucus manè probè emungendus, & sputum expurgandum. Gaudium procuretur, vitatis animi mœroribus, & solitudinibus. Reliqua ex dictis facile addi poterunt, quæ in rem hujus ægræ fuerint.

Adjiciam hoc loco Medicamenta, communiter Asthmaticis à me per-
scribi solita :

Pilulæ sublinguales in Asthmate.

Recip. *Myrrha electa*

Olibani ā. ʒj

Tragacanth.

Gum. Arab. ā. ʒiij

Croci

Succi liquirit. ā. ʒj

Carn. dactyl. n.

*Cum sapâ s. pillul. sub linguâ tenenda, vel potius
ad gingivam.*

Looch ad Asthma & tussim.

Recip. *Looch sani* ʒij

Cons. Hyssopi ʒj

Carn. Dactyl. n. j

Rad. Enula ʒj

Ireos ʒss

Sem. fœniculi

Anisi ā. ʒs

Cinamomi ℥iij
 Zinzib. cond. & incis. ℥s
 Cum modico Syr. de glycyrrhiza, f. Electuarium
 pectorale.

Looch ad Asthma.

Rec. Loock sani & experti ℥iij
 Conf. Satureia ℥s
 Cardamomi gr. vj
 Cubebæ. ℥s
 Rad. Ireos
 Angelica ā. ℥iij
 Baccar. Lauri ℥s
 Sulphuris in aq. Scabiose loti ℥ij
 Cinamomi ℥iij
 Cum Syrupo de glycyrrhiza
 F. Loock.

Decoctio ad Tussim & Asthma.

Recip. Herb. Scabiose ℥ij
 Hyssopi
 Satureia ā. ℥ss
 Fol. Sennæ 3vj
 Polypod. quer. ℥ss
 Passular. enucleat. ℥j
 Rad. Glycyrrhiza ℥ij
 Sem. Fœniculi ℥ss
 Agarici albi. ℥iij
 Zinzib. albi ℥s
 Ligatur agar. cum Zingib. in petia, & decoq. in
 aq. comm. ℥ij
 Vini lib. j. & mell. ℥ij
 Vel ejus loco. Syrupi violac. ℥ij, pro die altero, al-
 ternatim. Coq. ad tertia partis consumptionem,
 & in fine decoctionis add. Rad. Ireos conquass. ℥j
 Despumetur, cum albumine ovi clarificetur & F.
 Apozema, alternis diebus ℥iijss.

Rotulæ ad Asthma.

Recip. Pinearum præp. ℥ij
 Rad. Ireos
 Glycyrrhiza rose ā. ℥ij

Tragantb. ʒß

Sem. anisi ʒj

Fœniculi

Urticæ ā. ʒß

Rad. Angel. ʒs

Cinamomi ʒiiij

Storac. calamit. ʒß

Sachari penid:

Candi ā. ʒjs

*Cum aq. scabiosa. vel aqua vitis alba qua appro-
priata dicitur ad hunc affectum, fiat Confectio in
Rotulis.*

S. Röchlein, ꝛc.

CONSILIUM XXXIV.

IN ASTHMATE PRO QUODAM EPISCOPO.



Generosus Nobilis, proceræ staturæ, natus annos circiter tri-
ginta, exercitiis paucis aut ferè nullis utens, maximâque
ex parte in ocio vitam transigens: temperamenti frigidi &
humidi: parenchymate pulmonum raro, laxo & molli;
conflictatur catharris crassis, à capite sensim quidem ad vesperam arteriam,
& inde ad bronchia pulmonum defluentibus, ibique lentescantibus, non-
nunquam tamen tanto impetu & copia, ex improvviso (præsertim quando
vel quietis vel somni causa decumbere tentat) tam de die quàm de nocte
irruentibus, ut omnes pulmonum meatus planè obstrui: respiratioque
anheloso suspirio superveniente, planè auferri suffocatioque subsequi velle
videatur. Quibus omnibus additur appendicis loco, medicorum qui ha-
tenus consulti sunt, unanimem consensum esse, talem affectionem
asthma appellari.

Ex historia ad me missa planum est affectum, quo cum nobiliss. vir
conflictatur esse Asthma, seu motum depravatum pulmonis, secundum
elevationem & depressionem scilicet celeritatem & frequentiam in expi-
rando & inspirando, dependentem ex materia seu exeunte præter natu-
ram mutato, pituitoso, ex capite destillante: copiâ, crassitie & visciditate,
angustiam

angustiam in bronchiis pulmonum excitante talem, ut aëri, qui vitæ causâ pro eventatione scilicet cordis & arteriarum, & expulsionem fuliginum attrahendus est, præcludatur via: sæpè adeò arctè, vehementer & atrociter, ut nonnunquam suffocationis, imprimis quando decumbere incipit, periculum mineretur. Quoniam autem motus iste depravatus accidit ob angustiam in pulmonibus, idcirco necesse est de tribus capitibus diligentem institui disquisitionem, ut nimirum fundamenta & indicationes curationis, non modò ritè & exquisitè eliciantur: verum etiam sic instituantur, ut nobilissimus vir ex usu medicamentorum præscribendorum manifestè deprehendat naturam morbi & causarum hujus, exquisitè cognitam & omnia secundum artem & methodum debitè & convenienter inventa atque directâ esse.

Primum igitur nonnihil dicendum est de viscere, in quo affectus dominatur, nempe de pulmonibus ipsis. Deinde de causa continente, angustiam & obstructionem efficiente, ad eam quæ impeditam respirationem fovente. Tandem de materia, à qua affectus suam habet dependentiam in esse & conservari.

DE PRIMO.

Satis ex historia liquet, pulmones esse humidiores naturâ, frigidiores autem non solum naturâ, sed etiam habitu. Cum enim defluxio pituitosa longo tempore durarit: dubitandum non est à nativâ intemperie in tantam latitudinem frigiditatis deflexisse, quanto major est efficacia humoris frigidi continuo fluentis in alterando subjecto, in quo longo tempore commoratur. Unde quoniam parenchyma ipsorum est molle, rarum & laxum: non modo materiam transmissam facillè suscipiunt, & obstructionem in bronchiis admittunt: sed & ipsum parenchyma & carnea substantia ex alimento seu sanguine propter labefactatam in ipsis coctricem, crudo & in substantiam ipsorum non perfectè & debitè immutato & appposito, ita repletur & inebriatur, ut planè permadescat, & gravius ponderosiusque & ad perspirationem & aëris transitum ad cor permittendo inhabilius ineptiusque fiat. Argumento est, quod præter difficultatem respirationis ex obstructione bronchiorum factam, suffocationis periculum statim exacerbari incipiat, atque vir nobilissimus, sive de die sive de nocte id tentet, se se lecto componit. Cujus sanè alia causa stabilis & certa reddi non potest, nisi quod pulmones nobilissimo patiente in alterutrum latus decumbente se se mutuò comprimant & coarctent, quod magis accidit, quando pulmonum lobi seu carnes præter jam dictum frigidum & pituitosum mucum in substantia sua contentum, etiam deflu-

xione

xione tenui à capite, (quod frequenter Astmaticis usu venit) plusculum gravantur. Tum enim exdextræ partis de cubitu lobi sinistri dextris, aut contra sinistri dextris instar ponderis incumbentes bronchia pulmonum (multâ viscida & crassa pituitâ ex destillatione satis superque antea repleta) itâ deprimant & coarctent, ut etiam asperas arterias multò magis quam antea angustent & occludant. Quo fit, ut hunc in modum non solum aëris transitus impediatur: verum etiam calor cordis effervescent, & fuligines auctæ, tanto impetu & anxietate exitum quærant: nobilissimus patiens decubitu ulteriori indulgere nequeat: sed ut suffocationis periculum ac metum devitet, surgere vel erectus sedere cogatur. Neque tamen propter copiam fuliginum collectarum & auctum in corde calorem hujusmodi situ liberiores omnino respirationem semper percipit: sed nonnunquam metum suffocationis tantum sustinet, ut neque recto & elevato capite sedens neque stans aëre tanto, quando pro expulsionem distarum fuliginum & respiratione eventationeque cordis opus est, propter impedimenta pituitosa in bronchiis pulmonum liberè & sufficienter inspirando potiri possit. Quæ quidem difficultas tum maxime exacerbatur, quando catharrus tenuis (cujus paulo ante memini) in tanta lucta suspiriosa anhelationis, & cerebrioris respirationis à capite tanquam à scaturigine, per calorem cordis & concitatum laboriosumque motum pulmonum, tanquam à cucurbitula attrahitur. Quod evidentius evadit iis, qui diligenter, dum talibus ægrotantibus assistunt, animadvertunt. Si quidem experimentoprehendunt, paroxysmum suffocationis per circuitus & anticipantia intervalla ad horas aliquot motum sistere, & vicissim motu ex levi aliqua causâ externâ exacerbato, repetere: medicamentis etiam catharro sistendo idoneis & aliis rebus externis ritè dispositis & institutis salubriter, nonnunquam intercipi & prohiberi.

Dicat hic fortè aliquis, si sic se res habeat, eaque vera periculi suffocationis causa sit: quod cotidie & singulis quidem noctibus, nobilissimo ægro decumbente tales paroxysmos metuere oporteat. Hic si consideret, quod manifestum sit, catharrum à pulmonibus non subinde, continenter aut cotidie attrahi: propterea quod pro victus ratione aeris constitutione & aliis causis externis, materia in pulmonibus majori vel minori copia coacervetur, atque sic minus repleantur: exindeque eorum lobi minus graves ponderosique & ad compressionem causandam inhabiliores sint, facile conquiescet. Minus etiam locum habere hic potest ratio, quæ anhelosi suspirii causa refertur, quod scilicet pituita magis nocturno quam diuturno tempore moveri soleat. Id enim si liquidò verum esset, de die

nullus suffocationis paroxysmus facile metuendus foret : quod tamen asthmate conflictati, nimis crebro experiundo refutare possunt, & nobilissimo patienti subinde accidere in historia commemoratum est.

DE SECUNDO.

QUoniam motus pulmonis depravatus est propter angustiam, idcirco necesse est, causam efficientem eamque continentem istius motus depravati, esse angustiam, eamque ortam ab obstructione, quæ accidit in bronchiis pulmonum : verum cum hæc angustia aliundè dependeat, nempe à materia pituitosa eaque syncera (nulla enim fit mentio in historia alicujus qualitatis nonnaturalis) nihil etiam indicet utile, non opus est de angustia plura verba facere, sed de materia & causa hujus : quod sublata materiâ cessatura sit angustia : & quod in consideratione subjecti, videlicet pulmonum aliquoties efficientis causæ mentio facienda erat, adeoque satis superque & quidem abundè de eâ ibi sit dissertum.

DE TERTIO.

MAteria autem quæ bronchia pulmonum obstruendo morbum in via producit, & symptoma est in genere excrementi pituitosi, consideratur dupliciter : primum quidem, quatenus alibi genita in pulmones decumbit : deinde quatenus in pulmonibus generatur. Hoc modo non producit asthma : sed morbum exasperat & saviolem reddit, adeoque paroxysmos suffocativos promovet : illo modo, causa est morbi materialis, à quâ angustia (motum pulmonum depravatum efficiens) dependet. Quatenus igitur aliundè in pulmones destillat : generatur hæc pituita in cerebro, labefactata scil. ejus alteratrice, primum ob intemperiem frigidam & humidam, eamque nativam, quemadmodum ex historia, quæ affirmat, temperamentum totius esse frigidum & humidum manifestò liquet : deinde propter externum errorem desumptum à causâ internâ, nempe ab alimento pituitoso, crudo & crasso. Cum enim vitium primæ coctionis non emendetur in secunda, multoque minus in tertiâ : necesse est ventriculum, qui officina est pituitæ, cibos ingestos non probè concoquere, inde chylum crudum ab epate imbecillo in sanguinem pituitosum mutari : qui sanguis deinceps cerebro objectus imbecillo, facit, ut actio ejus magis frustretur : & pro bono alimento excrementum : illudque pro copia sanguinis copiosum : quatenus autem ultimam coctionem sustinet, crassum generetur : tantaque, crassius & copiosius, quantò magis hæc internæ causæ ab externis adjuvantur & foventur : nimirum quando lenti, crudi

& frigidi succi cibi, & potus crassi ac turbidi copiosius absque ordine & observatione temporis modi preparationis, promiscue & sine discrimine, & sæpè non probè masticati (quæ inter cæteras causas non ultima est) ingeruntur.

Quibus non minus adjumentum adferunt, ocium & intermissio exercitiorum: quod inde calor nativus ignavior ad agendum reddatur: somnus debito longior, evacuationes intermissæ, excrementorum negligens excretio, & maximè aër frigidus ac humidus, austrinus, aut ex austro in aquilonem repentè mutatus, cæteræque res necessariò occurrentes. Accedit augendæ pituitæ in cerebro & hoc, quod vitio ventriculi depravatè coquentis maxima copia vaporum crudorum continuò sursum feratur, ibique collecta & in humores versa, excrementum pituitosum augeat, & deinceps expultricem nonnunquam copia, interdum pro conditione ingestorum, qualitate ad excernendum stimulet, & catharrum ad subito & confertim irruendum exuscitet & præcipitet. Vaporibus succedunt flatus, qui ex errore aliquo externo in victu sæpè hypochondria tendunt, & pulmones adeò comprimunt, ut malum quasi ex improvviso in asthma terrificum & suffocatorium degeneret. Non minus etiam intemperiem cerebri in hoc nobilissimo viro fovere & expultricem irritare puto, quod aerem sive calidus sive frigidus is sit, à capite non usque adeò diligenter arceat. Solent enim in aulis viventes frequenter capita nudare, nec eam diligentiam, quæ à catharrois requiritur semper adhibere: undè aëre frigido substantiam cerebri efficaciter alterante & quasi comprimente, facile cogitari potest, multos paroxysmos periculosos ab hac causa frequenter commoveri.

Cæterum hunc in modum genita & à capite partim transmissa, partim propter declivem situm & calorem cordis ac pulmonum, ut supra relaturn est, attracta ruit per cava spacia choani & infundibili ad foramen palati & secundum latera asperæ arteriæ ad ipsos pulmones & obstruit leves ipsorum arterias, ipsaque bronchia. In quibus cum naturâ sint molles, & ad expellendum debiliores, moram trahit, & postea calore tum pulmonum ex motu, tum cordis ob prohibitam ex obstructione aëris frigidi attractionem aucto, tenuem & subtilem portionem dissipante, lentorem acquirit talem, qui tanto majorem difficultatem excretionis, & consequenter inspirationis & expirationis producit, quantò visciditas ista est pertinacior, & sic pituita obstruens difficilior à bronchiis pulmonum liberari & excerni potest.

Ex quibus omnibus manifestum est pituitam crassam à cerebro ex alimento ob vitia ventriculi, epatis, ac nonnullas causas externas, pituitoso, diminutè conquente genitam destillare ad pulmones (& naturâ & ex diuturnitate fluxionis susceptæ imbecillos) & in illis ob calorem tum cordis, tum pulmonum ex metu crebrioris respirationis causatum, viscidam & pertinaciter adhærentem, parere angustiam & depravatum motum pulmonum, qui vitæ periculum, interventu ablatae respirationis, aliquando afferre possit.

Hisce igitur ut maturè occurratur necesse est, primum, ut totum corpus à saburrâ pituitosa liberetur, deinde intemperies capitis siccantibus & calefacientibus emendetur: Tertio pituita quæ à capite ad pulmones destillat, derivando & revellendo intercipiatur. Quarto materia pituitosa, quæ in pulmones fluxit, incidentibus, attenuantibus, detergentibus & expectorantibus educatur. Quinto virtus & tonus pulmonum (cum virtute totius) corroborantibus confirmetur. Etsi autem morbus est vehemens, quod non modo caput, utpote membrum principale, sed etiam pulmones tanquam instrumentum respirationis, cujus actio ad vitæ conservationem est necessaria, maximopere sint læsa, adsit etiam copia pituitæ crassæ & viscidæ, nonnunquam magno impetu ruentis: difficultas non contemnenda sese offerre videatur: num scil. curando tam diuturnum pertinax & magnum malum superari: scopique commemorati expleri perfectèque absolvi possint: attamen si opponamus virtutem nobilissimi patientis, quæ satis est robusta, & ætatem, in qua calor est vegetus, & ad conquendum materiam morbi maximè potens & efficax: tandem etiam promptitudinem nobilissimi viri ad usurpanda remedia & ad toleranda auxilia habilitatem: non video, cur de successu medicamentorum usurpandorum salubri dubitare, non potius optima quæque sperare debeamus.

Quod verò ad remedia attinet, sunt illa in triplici ordine: quædam enim referentur ad universum corpus, quædam ad partes, scil. caput & pulmones: nonnulla verò ad insultum horrificum, quando scil. suffocationis periculum imminet.

Ad universum quod attinet, neque scarificationem, neque venæ sectionem in præsentī casu plurimum adjumenti ferre posse arbitror: quod habitus corporis in nobilissimo patiente sit frigidior & humidior, venæque cacochymia pituitosâ abundant.

Cauteria maximâ ex parte subcutanearum defluxionum materiam fructuosè vacuare multipliciter & sæpe expertus sum: excrementum vero cerebri rarò salubriter expurgare deprehendi. Scio Hippocrati, Rhasis

Haliabbathi, Mesueo hos secutis, Tralliano, Herculano & Montagnanæ, admoventibus cauterium futuræ coronali, ut affluens copiosius, sive alimentum sive excrementum evacuando minuatur, Galenum 9. de usu part. contradicere, & potius per alias vias, quas natura expurgando cerebro destinavit, materiam pituitosam ducendam & evacuandam, & revellentibus atque divertentibus medicamentis intercipiendam: capiti verò, ut parti nobili, maximeque sensibili, jam acerbo dolore, qui unctione excitatur, parcendum esse: & assentirer Galeno simpliciter, nisi defluxio in præsentī casu esset nimis atrox & periculosa. Quare si necessitas urgere videretur, nec medicamentis id, quod sollicitè speramus, proficeretur: non diffiderim supra futuram coronalem cauterium efficaciter & fructuosè, ut ad satis longum tempus fluat, applici tum iri. In insultu suffocationis cucurbitulæ siccæ, ligaturæ & frictiones maximum fructum adferre experientia multiplex edocuit. Præter chirurgica auxilia opus est, prius totum corpus à materia pituitosa, quâ totus habitus venosus scatet, liberum reddere: quod quidem vel fieri debet antecedente præparatione, vel eâ intermissâ, mox institutâ evacuatione. Non volo hîc aliorum medicorum rationibus adversari, sed hoc saltem monere: metuendum scil. esse, si multâ coctione materiæ, sub initium curationis uti velimus, ne materiam tenuatam præcipitemus: & paroxysmum suffocativum exuscitemus. Vidi enim aliquoties materiam talibus medicamentis à quibusdam Medicis commotam, summo impetu ruinam in pulmones præcipitasse. Quare securius futurum puto, si mox materia etiam electivè purgantibus, ut per pilulas cochias, de hierâ cum agar. vel electuar. diaphœnicon. aut aliquâ potiunculâ ex Turbith, agarico & foliis senæ factâ commoveatur: postea tali syrupo, de quo ℥iij aut circiter, pro bonâ tolerantia cotidie, aut alternis diebus exhiberi possent,

Recip. Rad. Cichorii ℥j

Pimpinell.

Tussilag.

Gentiana

Elenzi

Angelica

Fœniculi ā. ℥ss

Iridis ʒvj

Glycyrrhizæ ʒx

Sem. cartham. conquass. ℥j

Citri ʒiijss

Polipodii ℥j
Anisi ℥j
Aquilegia ℥ijs
Urtica ℥js
Fœnugraci ℥ß
Passular enucleat. ℥j
Fujubar
Sebesten ā. n. viij
Caricar. ping. n. v.
Fol. tussi laginis
Hyssopt
Botyros
Pimpinella Ital.
Scabiosa
Prassij ā. Mj
Ttini pjs
Herbar. capill. ā. Mß
Cichor. Mj
Flor. Stæchad. Arab.
Anthos
Melissa ā. pj
Coq. omnia in s. q. aquæ pro ℔ij in qui-
bus colatis iterum coquantur ut decet,
Turbith. opt. ℥ijs
Zinzib. ℥iiij
Sub finem addendo, ut ebulliant
Fol. Sennæ sine Stip. ℥ij
Epithym. Cret. ℥j
Stent in infus. per 3. horas, & colentur sine
expressione. In colatura ferve facta ite-
rum infunde per noctem agarici trociscati
℥v. & si forte opus sit ratione bilis Rha-
barb. opt. ℥j spica odorat. ℥j. Expres. ad-
de Syrupi de hyssopt, de succo cardui bened.
De marrhub. alb.
Oxymel. squillit. ā. ℥js
Sachari q. s.

F. Syrupus coctus ad mediocrem consistentiam. Possunt autem cuivis dosi, ne ventriculus flatulentius offendatur, duæ vel tres guttulæ vel Ol. anisi, vel macis, aut nucis guttulæ vel similis facultatis affundi. Soleo ante usum hujusmodi Syrupi statim post primam evacuationem per pilulas factam, sequentem sacculum vel in vino vel in cerevisia ita per noctem infundere, ut quatuor aut quinque digitos superemineat: postea expressione, ut decet, factâ singulis prandiis haustum satis magnum defundere, & ubi prandio mediocriter peracto potus desideratur, primum haustum præbere, quo facto jubeo vel vini vel cerevisiæ haustulum superbibere, ut ingratus sapor evanescat: postea prandium ut decet peragere. Possum affirmare in tali casu ad evacuandam nullam occasionem efficaciorē mihi datam esse, nec felicius quicquam successisse. Cum enim in Asthmaticis inferior venter flatibus & cruditatibus undiquaque sit refertus: mirum dictu est, quantum harum, & pituitæ in membris nutritoriis diu latitantis & retentæ, felicissimè & cum summa tolerantia patientis sit excrementum: adeò ut non solum cæteris medicamentorum purgantium modis prætulerim: sed etiam sæpè sub cœnam usum ejus, ut scil. materiam deorsum magis promoverem, flatûque educendo coercerem imperaverim. Est autem materia sacculi talis.

Recip. Rad. Cichoriij ʒvj

Gentiana

Angelica

Pimpinella ā. ʒiij

Glycyrrhiza ʒiij

Sem. carthami ʒvj

Aquileg. a ʒij

Card. Maria ʒj

Fol. Senna ʒij

Epithym. Crec. ʒj

Agar. trociscati ʒvj

Rhabarbari (si opus sit) ʒj

Spica gr. viij

Fol. Tussilag.

Anthr. alb.

Hyssopi

Card. bened.

Scabiosa

Botrys ā. pjs

*Beton. Mj**Flor. Stæchard. arab.**Ambos ā. pjs*

Pulsa omnia ligentur in sacculo.

Cum autem materia ex alto trahenda sit, non incommode accipiuntur

*3ij Turbitib.**et Znzib. 3j*

etiam pulveri sata ea in sacculo ligata: primum coquuntur vel in cerevisia, vel vino: & postea refrigerata affundantur vel vino vel cerevisiæ prioris sacci & cotidie exprimantur. Priori autem biduo, dum æger ex sacculis bibat, consuevi tantum potus affundere, quantum defusum erat: deinceps verò nihil, donec totum ebiberent. Hunc in modum materiâ mediocriter evacuata, iterum per pillulas satis fortes existimarim satis commodè materiam electivè evacuari: de quibus non opus est prolixius monere, cum paulò antea dixerim.

Verùm cum morbus sit longus, & non facile cedat remediis: habitus etiam venarum, haud dubiè, multo sero pituitoso abundet, non opinor magis quicquam ex usu nobilissimi patientis futurum esse: quam si ulteriori evacuationi materia prius adequetur & ita coquatur, ut & exquisitius totus habitus venarum à pituita retundante purgari, & integritas temperamenti, quoad ejus fieri potest, restitui possit. Fieri autem coctio poterit, per medicamenta ea, quæ non solum concoquendi, attenuandi, incidendi & detergendi facultate prædita sunt: sed etiam per ea, quæ materiam per sudorem dissipandi & mediocriter exiccandi vim obtinent, & pectori appropriata sunt: quale est sequens decoctum, cui lignum Guaiacum causâ exiccationis magno successu admiscetur.

Recip. Rad. Cichorii 3j

*Irid. Illyr. 3vj**Pumpinella 3v**Gentiana**Aristolochia rot. ā. 3ij**Polypodii 3vj**Herb. Pulmonar.**Scabiosa**Card. Bened.**Marrub. alb.**Hyssopi**Beronica ā. Mj**Ligni*

Ligni Guaiaci limâ triti ℥iiij

Passular. Corinth.

Iujub. ā. ℥j

Sem. fœnugraci ℥ss

Aquilegia ℥ij

Coq. in libys aq. Cichorii & lib. js aq. betonica, & ℥j aq. russilag ad medietatem lento igne. Colatura adde

Syr. de Hyssopo ℥iiij

De succo Cardui bened. ℥ij

Mis. f. potio. de quo dentur ℥v pro vice bis de die.

Exhibent nonnulli Medici lignum Sassafras decoctum cum rad poly-pod. ex jusculeo carnium vel galli antiqui, cum carminantibus, sicut describit Mesues: cujus usus jam dicto decocto instar succedanii esset. Sunt nonnulli ægrotantes eâ temperamenti proprietate præditi, ut à potionibus omninò abhorreant: iis prodesse solitus plurimum pulvis ex jusculeo carnium, vel ex decocto hordei ex brodio pulli factò, & croco aromatizzato, ad ℥j pondus, manè & vesperi loco digestivi exhibitus.

Rec. Rad. Glyzirkiza ℥iiij

Gentiana

Aristoloch. rot.

Irid. Illyr.

Enula ā. ℥j

Pulmon. vulp. præp. ℥js

Fol. Hyssopi

Marrubii sicc. ā. ℥ss

Sem. Pœonia

Fœniculi

Anisi ā. ℥j

Aquileg. ℥js

Cinamomi acuti ℥ij

Croci orient. ℥s

Spec. Diaireos simpl. ℥s

Salomon. ℥j

Sachari candi ℥s

Post hæc syrupus supra scriptus, nodulis prius usurpatis, exhiberi, & tandem electiva evacuatio per pillulas fortiores subjungi: denique uni-
verso

verso corpori ; partibusque singulis confirmandis ʒj Theriacæ veteris cum ʒj Spec. Diatrag. frigidi exhiberi posset.

Universi hunc in modum ratione habitâ, capitis robur exuscitari, & materia in pulmones illapsa talibus medicamentis attenuari, extergi & per tussim expelli tutissimè videtur. Sunt autem primum Tabulæ sequentes, quarum de die sæpè duæ vel tres, ut sensim liquecant, in ore tenendæ.

Recip. *Extracti Irid. Illyr. gr. xij*
Ext. glycyrrhizæ gr. vij
Sem. melon. excort. ʒj
Specier. diatrag. frig. ʒij
Ol. nuc. moschat. destill. gr. vj
Sachari albiss. solut. in aq.
Scabios. & cinamom. ʒiys
F. confect. in rotulis.

Deindè non minoris efficacix est Looch sequens, si frequenter portio nucis avellanæ ore excepta paulatim liquefcere, & per tracheam defluere sinat.

Recip. *Looch sani & experti*
De pulmone vulpis
De pino ã. ʒß
Emula condita, contusa & hume-
ctata aq. card. bened. ʒij
Spec. diatreos simpl. ʒj
Sem. fariculi
Anisi ã. ʒß
Aquilegia ʒj
Glycyrrhizæ ʒß

Cum Syrupo de hyssopo q. s. F. Looch liquidum. Quando autem materia pertinaciter hæret, Looch tale sæpè plurimum profuit.

Recip. *Looch de pulm. vulpis,*
sani & experti
De pino ã. ʒij
Pul. emula
lreos
Gentiana ã. ʒjs
Cum syr. violar. & de hyssopo a. q. s.
F. Mixtura.

Commendant Itali & Galli Looch ex radice dracunculi, ari & gen-
tiane cum amigdalīs & melle factum: item illud quod ex Therebinthina
cum melle, sacharo, aut butyro recenti paratur. Mesueus utitur Looch ex
squilla, quod crassam & lentam pituitam non solum ex bronchiis, sed
etiam ex parenchymate pulmonum potenter liberare affirmat.

Electuarium diabutyrum ab Italis vocatum, ut maximi à multis fit,
itā etiam mirificè pituitosos humores ex pectore liberare multoties magno
successu vidi: hisce annumerari potest oleum sulphuris therebinthinatum
ȳs, quæ modò retulimus, admistum, aut nonnunquam ad guttulas x.
ex cerevisia bibitum.

Quibus eclegmata talia displicent, ȳs syrupus sequens frequenter ex-
hiberi potest ad ʒß vel ʒij vel circiter.

Recip. *Extract. card. bened.*

Scabiosa ā. ʒß

Extr. hordei gr. vj

Glyzyrrhizæ gr. v.

Sachari albiss. ʒij soluti in aq.

Scabiosa.

Quibus adde Syrup. de hyssopo ʒj

De prassio

De jujubis ā. ʒs

Aq. Cinamomi ʒj

Mis. Efficacissimum est remedium ad referandos obstructos pulmonum
meatus, & liberiolem respirationem promovendam. Et cum sitis pro-
pter crebriorem respirationem vehementer urgeat, illi demulcendæ pro-
dest sæpè exhibere cochlear unum vel alterum ex aqua sequenti.

Rec. *Rad. Enule condita ʒjs*

Cort. citri,

Arantior. ā. ʒß

Incisa confundantur in mortario, postea affusa aqua card. bened. ʒij
scabiosæ ʒiij. Colentur fortiter exprimendo: aquæ claræ adde aq. cina-
momi ʒj. Non experientur tantum sitim sedare, sed etiam liberiolem
aëris frigidi attractionem & pituitæ excretionem promovere.

Decoctum hordei ex brodio pulli & glyzirrizæ cum croco arimati-
fato similiter anhelitum liberiolem reddit & sitim sedat. Eadem intentio
promovetur etiam medicamentis forinsecus admotis, quibus os pectoris
inungitur, ut nimirum materia in pulmonibus facilius, libereretur & ex-
cernatur: quale est unguentum sequens:

Recip.

Recip. Ol. amigd. dul.

De croco

Cbeirin. ā. ℥iij

Pingued. cap. ℥js

Pul. iridis

Hyssopi

Enula ā. ℥ss

Croci gr. v.

Cera parum. Mis. f. liniment.

Plurimum Asthmaticis emolumenti adferre vidi, ad expectorandam materiam pituitosam tale cataplasma.

Recip. Caricar. ping.

Dactylor. ā. ℥j

Herb. malva

Bismalva

Flor. melilot.

Chamomel. ā. ℥j

Farina lini

Fenugraci ā. ℥j

Rad. malva

Althea

Lilior. alb. ā. ℥j

Herb. Hyssopi

Marrub. albi

Pulegij

Scabiose

Tussilaginis ā. ℥j

Rad. ari ℥iij

Decoquantur ad mollitiem, postea adde stercoris columbini. ℥j, pul. sem. fenugraci ℥j pingued. anatis, gallina ā. q. s. ad sufficientem pinguitudinem, f. Cataplasma molle, applicandum pectori.

Sunt qui ex rapis exiccatis & in aq. card. bened. coctis & contusis cum pulvere hyssopi & pinguedine gallinae cataplasma factum maximo & laudabili successu admovent. Præter hæc etiam opus erat medicamentis, quæ virtutem cerebri & pulmonum peculiariter determinantem adjuvarent, proportionem scilicet mistionis formarum elementorum.

Verum cum talia iis medicamentis, quæ hæctenus usurpanda præscripta sunt, semper admiscere oportuerit: supervacaneum esset, de iis peculiarem sermonem instituere.

De catharri à capite diversione & revulsione nihil arbitror dicendum, suppono enim antea facta esse à Medicis præsentibus: & posset usus Theriacæ supra consignatæ frequenter repeti, & ex oleo nuc mosc. destillato & speciebus rosatæ novellæ, item diamoschi dulcis, & diambra tabulæ continuari, mirificè utiles, quales sunt sequentes:

Recip. Spec. Diambra

Diamoschi dul.

Aromat. ros. ā. 3ß

Diatrag. frigid. ʒij

Margarit. preparat. ʒj

Sach. cand. albiss. soluti in aq.

cickorii, tussilag. & beton. ʒiiij

F. Confect. in rotulis.

Extrinsècus convenient sacculi sive cucuphæ & pulveres bregmati inspersi, & odorata, item capitis lotiones, quæ omnia abundè facta nequaquam ambigo.

Accedo ad ultimum caput, nempe ad ea medicamenta, quæ paroxysmum impediunt, leniendo, & alvum apertam retinendo, materiam in pectore detergendo, & per urinam blandè & moderatè ducendo quales sunt pillulæ ex therebinthina & hyssopo concinnatæ ad pondus ʒij exhibitæ.

Parantur autem hunc in modum:

Rec. *Therebinthina Cypria, diligenter lota ex aq. hyssopi ʒj*

Ebulliant affusa aqua hyssopi lbj in vase vitreo mundo ad consumptionem aquæ, postea infunde in vas frigidum repletum aq. hyssopi frigida; & cum incepit aqua tepescere, manibus probè malaxetur therebinthina, add. rad. Ireos pulveris. ʒj subinde manus immit-tendo in aq. frigidam hyssopi, fiantque pillulæ ad formam siccum rubeorum.

Cui intentioni plurimum profunt clysteres ante coenam frequenter usurpari.

Quando autem omnibus ritè hunc in modum peractis, nihilominus suffocatio nobilissimo patienti molestiam facessit: ad duo respiciendum esse supra monui, nempe ad calorem in pulmonibus, ex lobis ipsorum (dum nobilissimus patiens decumbit) mutuò sibi incumbentibus & expul-sioni fuliginum, aërisque attractioni viam præcludentibus exortum, & materiam pituitosam, crudam ac tenuem attrahentem: deinde ad materiam in bronchiis adeoque parenchymate pulmonum contentam. Illud quan-do fit requirit medicamenta humectantia partim & refrigerantia atque ad-stringentia sistentiæque affluxum materiæ tenuis, Qualia sunt spiritus sul-phuris

phuris acidus per campanam factus, mixtus cum aqua fontana. Infunduntur autem tot guttulæ, quot sufficiant cyatho uni aquæ fontis, ut manifestum acorem præ se ferat: & sæpe exhibetur cochleare unum: sanctè affirmare possum, me, cum primum viderem exhiberi, quasi obstupuisse. Nam statim rediit liberior respiratio: & paroxysmus non modo infrequentius reiterabatur, sed etiam quotiescunque repetere velle advertēbatur hoc remedio compescebatur: tantò autem citius impetum humoris tenuis refrenat, quantò aqua magis ex isto spiritu est acida. Præstat item rhob ex berber. ad quantitatem cerasi paulatim deglutitum.

Non minus est efficax, quam ex spiritu sulphuris medicamentum. Veteres ~~aut scabiosam~~ squilliticum saluberrimè commendant: nam & ratione aceti catharrus sistitur & materia in canis pulmonum inciditur, attenuatur & detergitur, & aëri transitus paratur. Vidi aliquando virum magni nominis ad decem horas, asthmatico paroxysmo conflictari, ita ut planè de vita desperaretur: cui cum fortè ab astantibus mulierculis offerretur spongiola in aceto rutaceo intincta, ut vires colligeret, subito fluxus interceptus, & ita paroxysmus quasi miraculo quodam sedatus est.

Hoc verò cum accidit, nempe quando paroxysmus asthmaticus ex pituita pertinaciter hærente & aëris inspirationem efficaciter impediēte, oritur, necesse est medicamentis validè aperientibus, materiam dissipantibus & discutientibus uti: tale est sequens remedium de quo frequenter exhibentur cochlearia duo: potenter dilatat pectus & respirationem juvat.

Recip. Extracti cardui bened. ʒʒ

Sachari albiʒ. soluti in aq. scabiosa ʒjss

Syr. de byssopo ʒjss

De prassio ʒʒ

Aq. cinamomi ʒʒ

Misce.

Si extractum gentianæ veræ in parato esset, similiter solvi & exhiberi posset, non minori successu. Quod si neque ratione paroxysmus debellari posse videatur: pro panacæa erit sequens potiuncula in duas partes divisa & exhibita.

Rec. Rad. fœniculi

Asari

Iridis Illyr. ā. ʒiij

Glyzyrrhizæ rasæ ʒij

Cog. in aq. fontis ad causam tertie partis Colatura Rec. ʒviii, in quibus dissolve, Ammoniacy ʒj, oxymel. compes. ʒʒ. Syr. de prassio ʒij.

Misce.

D d 3

Vidi

Vidi aquam ex floribus raporum cum croco & paucō moscho miramur tam miraculosè Asthmaticis restituere respirationem liberam.

Nonnulli accipiunt Ammoniāci ʒjss. Malaxat. addantur pulveres glycyrrhizæ & sachari penidii q. s. formantque pillulas n. xx. ad deglutien-
eodem fine quatuor vel quinque exhibent.

Extremum & nunquam fallens habetur potiuncula subsequens

Recip. *Ammoniāci ʒjss*

Aq. hyssopi ʒiiij

Vinirhevanū ʒij

Misce ut decet

Tantā efficaciam à suffocatione liberat, ut præclarissimè remedium noster viderim.

Accedo ad victus rationem, quæ virtutem ægri & robur naturæ conservationem, & morbi profligationem non minus quam medicamenta omnia procurare potest: adeò quidem, ut non frustra ab Arctæo dictum sit, turpem calamitatem esse victus rationem in morborum magnorum & longorum curatione negligere.

Et si autem non dubitem nobilissimum ægotantem de substantiæ qualitate & quantitate ciborum, ordine & tempore abundè commoveri fieri, ut planè actum agere vel videri possim: tamen hoc adjiciendum putavi, quod pluralitas ferculorum, in hoc casu maximum momentum obtineat ad paroxysmum terrificum causandum: quemadmodum & comestiones, quæ in multam noctem extenduntur.

Contrà verò abstinencia à cibo & potu sub noctem, securitatem paroxysmi interceptionem certam pollicetur.

Cerevisias etiam nobilissimum patientem bibere, puto limpidas nimis refrigerantes, qualis est Einbeccensis, nec nimis etiam caput plentes & turbidas.

Vinum sit recens & subdulce.

Si posset hydromelite Litvanico potiri, esset non modò potus convenientissimus, verum etiam medicamentosus, & concoctioni ventriculi & emendandæ cacochymiz pituitosæ utilissimus. Quod si Litvanicum hydromel præstare non posset, fieri poterit ex aquâ mulsâ, capillorum. Veneris, hyssopi, thymi, cardui benedicti, glycyrrhizæ passularum decoctis.

De reliquis rebus non naturalibus nihil addam, nisi ut nobilissimus patiens palustria & ædes aquis undique circumdatas aut vite

ut aërem suffragigis calefacientibus & siccantibus maximâ curâ altere studeat.

Quibus omnibus misericors Deus pro clementiâ suâ felicissimum largatur successum. Quod ut fiat, toto pectore oro.

CONSILIVM XXXV.

IN PERIPNEUMONIA, ET INCIPIENTE TARTARO PULMONUM.

MOrbus tuus, Illustris N. N. est initio ad Tartaream pulmonum διαθεσιν.

Materia hæc pulmonum, è capite illac depluit. In caput ea expirat è ventriculo, cujus orificium superius (ita cant) post assumptum cibum nequaquam clauditur.

Præsentes tui Medici aulici vehementer occupati, in regione pulmonum undiquaque fovendâ, ungendâ fricandâ. Sed (ut dicam quod res, & δόλος καὶ ἀπάτης) nil quicquam solennitatibus iisdem proficient.

Hoc enim pacto, vasa pectoris dilatantur, frictiones & linimenta torosa major sequitur affluxus, sicque copiosior materia aliundè illuc versitur, eidemque aliundè accersitæ via panditur, fenestræ aperiuntur. Id ergò quicquid est, pro tempore missum fiat. Quin potius de orio ventriculi tenaciter repagulando sint solliciti.

De nocte nihilominus lambitiva, quibus momenta quædam auri potius immixta sint, salubriter offerentur.

Caput quoque sequenti sapone quandoque demulceatur.

Recip. Sapon. Venet. opt. ℥ss

Agarici ℥js

Irid. florent. odoratis.

Caryophyllor. ā. ℥ij

Ol. majoran. gr. vj

Spica gr. ij

Inde duplici vase, sine empyreumate fiat sapo cephalicus.

CONSILIUM XXXVI. IN TUSSI ET SANGUINIS SCREATU.



Nobilissimus Dominus, postquam ex febris maligna laborasset, incidit in tussim cum screatu sanguinis quandoque rubri, quandoque nigricantis & grumescentis.

Si in pectore colligitur sanguis, fit id aut per *Ἀγπήδησις* transudationem: aut per *ἀνασφάλαις* osculorum venarum aut vasorum resolutionem, aut per *Ἀγίρεσις* seu solutionem unitatis.

Sed neque tanta est in hoc corpore vel sanguinis tenuitas, vel tunicarum in venis raritas, ut *Ἀγπήδησις* habeat locum: neque vel interna vel externa causa præcesserunt, ut cibi vel medicamenta acria aut calidiorum balnei &c. quæ vasa referare atque aperire potuerint. Nam vinum quod utitur, præterquam quod familiare ei est, non adeò est potens, ut *ἀνασφάλαις* inducere queat. Quid? quod maximâ ex parte data sunt medicamenta contrariis prædita viribus, emplastica nempe & adstringentia.

Quod si *Ἀγίρεσις* facta esset vasis alicujus & soluta unitas, necessarium esset fieri propter *Ἀγβροσις* erosâ venâ arteriâve, aut propter *ρήξις* ruptum aliquo vase.

Erosionem nullam subesse ex eo colligo, quod sua dominatio non conqueritur de ulla qualitate acri vel falsa eorum quæ rejiciuntur: à quâ erodi vas posset.

Nihil autem verisimilius videtur esse, quàm continua illa in vehementi tussi, ruptum esse vas aliquod, è quo sanguis ille effluxerit & in grumum concrevit.

Verum enimverò, quo minus hanc quoque adesse statuam, moveor primum paucitate sanguinis excreti: quem quidem multò major cum copia atque etiam impetu in ista diuturnitate & vehementia tussis vena rupta ejici necesse esset. Atqui, inquiet aliquis, effluit quidem sanguis è vena rupta, sed detinetur in thorace, neque propter conformationis defectum excerni potest. Ego verò, etsi concedatur fieri posse quod dicitur, de quo valdè dubito, non video tamen quomodo collecto copioso sanguine, sive in thoracis musculis, sive capitate pectoris, vel non statim succedat tumor, dolor, inflammatio, febris, vel tussis tam posset esse mitis, ut non nisi rarioribus intervallis nobiliss. do-

minum

minum infestet. Facit huc, quod sanguis rejectus non uno semper colore conspicitur.

Concludo, igitur sanguinis sputum non per *πρωτοπάθειαν ἢ ιδιοπάθειαν*, hoc est, morbum aliquem in vasis pectoris, sed potius cum pituita ex capite destillare.

C U R A T I O.

1. Respiciendus Catarrhus.

2. Abstergenda in pectore materia, & studendum ne grumi in pectore putrescant: & in piis abientes vicinas partes exulcerent.

3. Uno oculo ad hypochondiacum malum respiciendum, ne viscerum obstructions augeantur, vel flatus cumulentur. Hujus autem curatio alterius est deliberationis,

Explebuntur hi scopi: Venæ sectione in sinistro brachio, portione leniente & abstergente cum levi adstrictione, vel in forma solida aut elegmatis aut lupinis.

Pro liene electuarium ex Chalybe.

Pro catharro & sanguinis spreto, syrupus ex si liquis vel diacodion Montani, vel rotulæ sequentes:

Recip. *Spec. diatrag. frig.*

Diapenid.

Diaireos

Sem. 4. frigid. major. ā. ʒʒ

Sem. papaver. albi

Urtica ā. ʒʒs

Succi glycyrrhiza

Rad. Elenii

Pulmon. vulp. ā. ʒj

Sachar. alb. q. s. cum aq. scabiosa

dissol. f. Rotula.

C O N S I L I U M X X X V I I .

I N T U B E R C U L O C R U D O , E T S A N -
G U I N I S S P U T O .

Priusquam de hoc casu meum exponam iudicium, candidè, imò ad verbum, ea adscribam, quæ de ægri statu Medici ægro huic nostro domesticæ, singulatim retulerunt.

Sic ergò ad verbum Relatio:

„ Coqueritur Dominus NN. de difficultate Anhelitus, maximè si
 „ concitatiores gressu longiusculum excurrit. Tantum autem illi faceffit
 „ negotii, ut quamprimum confidere cogatur, aut si scalas paulò altiores
 „ ascenderit, proximis inniti apertis fenestris, liberiores auram hauri-
 „ vendi & capiendi gratiâ: quibus inordinatè tamen, succedit improvisa
 „ & inopinata *φλόγῃσις* aut calor febrilis. Omnium verò partium ex-
 „ ternarum totius corporis extenuans macies, suum sibi pectus vacuum
 „ videri refert, crebrioribus est obnoxius destillationibus, à capite ad
 „ gulam delambentibus subsalsis. Unde frequens tussis, absque tamen
 „ ullius, vel saltem cum pauci admodum sputi ejectione. Elapso qui-
 „ dem vere, & jam instante autumno, tussis adeò exacerbabatur, ut &
 „ sub noctem ingestum in coenâ cibum revomeret, & rubicundi sangui-
 „ nis spumosi, quantum binarum manuum volis contineri potest, reji-
 „ ceret. Hinc succedit *ἀνορεξία καὶ ἀποσιτία*, somnus irrequietus, lassitudo
 „ aut potius imbecillitas omnium partium, cum sublevi lypothymia.

„ A purgantibus abstinemus, metu colliquationis virium, nisi, quod
 „ crebrius usu venire solet, alvus durior evadet, tunc enim enemate in-
 „ duratas & adustas feces educimus, de jure galli non saliti, syrupo vio-
 „ laceo solutivo, saccharo Thomæo, diasebesten cum diagridio & vitello
 „ ovi parato. Singulis diebus manè jus pulli cum sacco betonicæ, ci-
 „ chorii & Endiviæ propinamus, vel in eodem nodulum ex radicibus
 „ scabiosæ, floribus Pœoniæ, margaritis & corallis rubeis, atque ejus ge-
 „ neris aliis, confectum aliquantulum maceratum & expressum infun-
 „ dimus. Loch de portulaca, de caulibus, cum syrupo de prassio, ad
 „ pectus consolidandum exhibemus, quod & optimè fert. Ex siliquis
 „ etiam dulcibus, & aliis appropriatis eclegma conficimus, additis aliis
 „ corroborantibus, variâ medicamentorum formulâ subindè immutatis.

Haftenus verba Medicorum domesticorum, historicæ relationis loco.

Nunc quid de proposito mihi videatur casu, meis explicabo verbis.

Symptomata commemorata partim sunt vetera, partim recentia. Illa morbum in via: hæc in solutâ unitate ostendunt.

Morbus in via originem traxit ex materia in ipsâ pulmonum substan-
 tiâ collecta, tuberculumque in eâ crudum efficiente, & respirationem
 adeò impediens, ut æger ad quemvis motum corporis paulò concitatio-
 rem, non modò impeditè, & difficulter respiret, sed & propter fuligines,
 quibus non libera conceditur expulsio, calor præter naturam excitetur.

In so-

In solutâ unitate sit morbus, propter apertionem venarum in pulmonibus, sive in catharro falso eâ exesâ sint, sive ab excussione graviore ruptæ: quamvis ruptionem esse, magis opinemur, quàm exesionem.

De temperamento ægrotantis, cuperemus aliquid additum fuisse narrationi, ut de catharri falsi causis exquisitius differere potuissemus. Et quamvis difficile non sit, quæ illæ sint, ex consignatione colligere: præstant tamen, si aliquid tale fuisset additum, quod putemus, intemperiem nativam visceribus inesse, ad phthiseos productionem proclivem. Curatio difficilis est futura, & egebit solerti diligentique tractatione, tum quod malum videatur habere aliquid nativæ imbecillitatis, tum quod curationes ex parte futuræ sint contrariæ. Si enim tuberculi crudi *ἡεραπιδαν* instituere velimus, necessum erit, ut humectantibus, emollientibus, & temperatè solventibus, maturationem vel resolutionem instituamus. Si econtra venas ruptas respiciamus, glutinantia incrassantia, cum leviter expectorantibus & consolidantibus erunt necessaria.

Intercipiendus insuper venit catharrus incrassantibus & divertentibus, ne amplius ad pulmones defluat, ruptionemque eam periculosiorem reddat.

Quod igitur crudi tuberculi attinet maturationem, ex usu futurum arbitramur cataplasma sub litera A. descriptum, admovendum pectori.

Potio etiam ad aliquot dies exhibenda, pro concoctione materiæ crudæ, nisi simul & consolidatione venarum, sub charactere B.

Postea purgatio ex Manna commodissimè institui posset, quæ literâ C. notata est.

Ut ne interim agglutinatio & consolidatio venarum ruptarum negligatur, potest in cotidiâno usu haberi Electuarium D. vel loco ejus (permutatim tamen) Mixtura E.

Ac si fortè excretio materiæ è pectore sufficiens fieri non posset, syrupo F. procuretur: quamvis ut ne quid dissimulem, loco syrupi jujubar, syrupus è siliquis rectè usurpari possit. Non abs re etiam futurus est syrupus Ferneli ex consolida, qui plerasque intentiones, quibus nobis hoc in ægroto opus est, obtinet.

His ità ritè adhibitis, non dubitamus, successurum lepidè, quod volumus.

Quod si sanguinis excretio uberior eveniat, necesse esset, exhibere trociseos de Carabe, de terrâ sigillatâ, de spodio. Experti etiam sumus maximam vim Olei, non spiritus Vitrioli: si nempe hujus grana sex ex aq. plantaginis $\mathfrak{z}\text{v}$. exhibeantur mire sanguinem è Venis erumpentem sistit.

Catharro sistendo cerota fieri possent exiccantibus: cucurbitulæ etiam non futuræ essent inutiles, ut & syrupus depapevere.

De victus ratione non arbitramur opus esse monere præsentis Medicos: nisi quod existimemus, rectè eos facturos esse, si juscula frequentia cum papavere albo & amigdalibus exhibeant. Bibat etiam emulsiones seminum melonum, cum pistaceis pineis & amygdalis, ex decocto hordei factas. Juscula ex avena depilata plurimum profunt. Inter cætera autem mirificè pulmonibus in exulcerationem pronis prodest pulvis subtiliter G. cujus ℥ij vel ℥iij. immediate ante cibum cum jusculo sumere poterit.

De cæteris præsentis Medici facile constituent.

Recip. *Farina Sem. malv.*

Alibee ā. ℥js

Hordei

Fænigræci

Lini ā ℥j

Herbar. ruffilæginis

Capill. Veneris

Adjacib.

Scabiosa

Hyssoi ā. Mj

Rad. malva

Ireos

Alibee

Glycyrrhiza rasa ā. ℥j

Finnum ping. n. vij

Injubar.

Sebesten ā. n. lx

Uvar. pass. enucleat. ℥j

Fiat decoctio pro cataplasmate, cui add.

Tragacanth.

Gum. Arab.

Boli armeni ā. ℥ss

Ol. amig. dul.

Livr. alb. ā. q. s.

Pingued. Gallina

Anatis ā. ℥j

Butyri rec. loti cum aq. ros. ℥jss

Maf. F. Cataplasma A.

Recip.

Recip. Hordei mundat M^{ss}

Passular.

Glycyrrhiza rasa ā. ʒj

Rad. ruffilaginis ʒiij

Consol. major. ʒj

Fœniculi

Enule Camp. ā. ʒjs

Althea ʒij

Gummi arab.

Tragacanth. ā. ʒij

Amg^{li} ʒjs

Herbar. centummorbia M^{ss}

Plantaginis

Pimpinella Ital. ā. p. j.

Adianchi nigri Lugd.

Scabiosa

Tassilag. ā. p. ʒ

Decoq. vel in bradio pulli, vel in s. q.
aque pro ʒj. Dentur pro dosi ʒiij

S. Potio B.

Recip. Iujubar.

Sebesten ā. ʒ. x.

Glycyrrhiza munda

Passular. enucleat. ā. ʒss

Rad. Ungula caball. ʒss

Sem. citri ʒj

Decoq. in s. q. aq. hordei, pro ʒiij

In quib. dissol. Manna ʒjs.

Sig. Potio C. ad solutionem
alvi.

Recip. Confer. rosar. vetustiss. ʒij.

Corall. rub. ʒij

Boli armeni veri ʒj

Spet. Diarhod. Abbat. ʒss

cum Syr. ros. ex rosis siccis

F. Electuarium D.

Recip. Thuris, masticis, amyli ā. ʒj

Gum. Arab.

Tragacanth. ā. ℥j
Penidiorum ad pondus omnium.
Cum syrupo ex symphyto Fernelij
Fiat. Mixtura E.
Recip. Syr. Fuzubini ℥ij
Deglycyrrhiza. de tussilag. ā. 3℥
De byssopo ℥iij
Mis. S. Gassit F.
Recip. Sem. papaveris albi ℥iij
Acciosa
Endivia ā. ℥ij
Plantaginū
Portulaca ā. 3℥
Som. melonum.
Cucumeris
Cucurbita
Citrulli ā. 3ij
Gum. Arabici
Magacanth.
Amyli ā. 3℥
Pulmon. vulp. præp. ℥j
Succi glycyrrhizæ ℥ij
Penitior. ad pondus omnium.
Fiat Pulvis G.

CONSILIUM XXXVIII.
 IN CORDIS ANGORIBUS, VELLI-
 CATIONIBUS, RATIONIBUS ET PAL-
 PITATIONE.



Onqueritur Illustrissimus Princeps aliquot abhinc septimanis
 de magnis potissimum cordis angoribus, vellicationibus,
 rationibus ac velut palpitazione: iisque primum interpola-
 tis, nunc continuis: quibus jungantur omnium facultatum
 actiones depravatæ, lassitudo inprimis crurum: ac syncopen, pthisin,
 & alia grandiora symptomata metuit,

Quæ sanè cordis molestiæ , ut præsupponantur adesse : neque enim leviter de palpitatione addubitare licet , utpote cujus , si vera sit , motus à pulsu alienus existat : In suæ Cels. autem pulsu , etiam palpitationis tempore , nulla mutatio nisi in altitudine percipiatur.

Suppositis inquam , istis , ex causis suis facile illa pendetur , tam externis , mœrore ; quam internis , melancholia hypochondriaca.

Cum enim Cels. sua ex obitu illustrissimæ conjugis , tantum mœrorem conceperit , atque eundem satis diu foverit : haud mirandum , Cor (in quo affectus veluti in sede consistunt) spiritibus per mœrorem confectis , refrigeratum , hinc calorem ad alia membra influentem , debiliorem multò , illis communicatum , sicque actiones nonnullas imminutas vel potius depravatas fuisse. Ità nimirum Plato , omnes penè corporis morbos ab animo oriri docet , & Galenus à propria cordis temporis universas facultates gubernari , earumque actiones perfici , monet.

Unde ipsum quoque Cor , quod primam sentit læsionem , hujus reliquias adhuc percipit , angustias scilicet quasdam sive interpolatas sive continuas.

Accedit Melancholia Hypochondriaca dicta , cui S. Cels. non leviter est obnoxia : quantum ex symptomatis primum patere , potest pathognomonicis , mœsticia , timore , cum abjectione rugitu hypochondriorum. Deinde ex causis remotioribus , & quidem efficientibus , ventriculo frigido , ut ex copioso pituitæ proventu colligere est , cruditatibus , ructibus insipidis , juvamento ex calidis : & epate ac venis calidioribus , ut ex lentore phlegmatis patet , urinis copiosioribus calore manuum à cibo , oris quandoque ariditate & phlegmatis ibi collectione ; ne alia à corporis habitu desumta signa adducantur : Liene demum obstructo & succis melancholicis referto , ut ex decubito in sinistrum denegato constat , dolore quandoque hypochondrii sinistri , evaporatione fumorum ad superiora , excretionem nigrorum. Materiali rursus , humoribus diversissimis , phlegmata crasso , viscido , vitreo : Bile quandoque vitellina , succo melancholico nigro , ut per excreta patuit : vaporibus quoque atris & malignis , unde symptomata illa tam molesta.

Subjecto præterea apto , mesaræo , pancreate & ramis quibusdam venæ portæ , quæ cum alias sentina statuantur excrementorum totius corporis , majorem illa excipiendi ob copiam scilicet , occasionem adiunguntur.

Externis tandem , in ordinata victus ratione , nimis & in tempe-
tivis exercitiis , & erratis in singulis ferè rebus non naturalibus. Un-
de

de non tantum calor natus imminutus, sed & in æquales viscerum intemperies, cruditatum, consequenter obstructionum causæ principales.

Ex causa quoque illa patet propinquiori, obstructione scilicet crassis illis & inæqualibus ramorum quorundam, venarum, mesaræum pancreas & lienem permeantium: ut ex effumatione vaporum quasi continua, colligitur, rugitu seu murmuribus intestinorum, anxietate cordis & mentis.

Quod sanè obstructionis ratione fit, ut humores ibi tempestivè non expurgati, sed conculcati incalescant, imò quasi per elixationem quandam rarefiant: atque à natura quæ nunquam ociosa est, sed utile ab inutile secernere conatur, agitati, fumos de sese crassiores vel tenuiores spargant unde symptomata postmodum de quibus S. Cels. potissimum queritur, oboriuntur. Vapores enim illi atrii & crassi, soli aut flatibus aut aliis fumis ventriculi & lienis permixti, ad cor delati, pravâ suâ vel etiam alias molestâ qualitate, anxietatem illam & veluti palpitationem cordis, dum hoc, quod molestum sibi est, expellere conatur, producant.

Ac sub finem plerumque primæ coctionis, initium secundæ, intenditur malum: quando nimirum distribui chylus per mesaraicas debet, sed propter obstructiones regurgitare cogitur (unde murmura frequente exaudiuntur) vel quando prima coctione cum labore quodam & imbecilliter (ob calorem nativum imminutum) finita, nova succedit, secundæ coctionis in crudiores illum chylum, à venis & epate, actio. Unde etiam in sinistrum latus decumbere tam facile non licet, dum arteriæ quæ copiosiores (inter omnia reliqua viscera) à corde ad lienem deferuntur, incalescunt, sic humores agitentur, consequenter fumi semper novi, excitentur.

Quæ eadem ratio est, cur ab exercitio vel alio motu concitatio (agitata scilicet materia) symptoma illud ingravescat. Neque verò quod S. Cels. continuò se isto malo affligi conqueratur, per essentiam cor affectum, concludere necesse est: cum neque in pulsu mutatio, vel exigua deprehendatur: neque vellicationes seu rosiones sint incensæ: effumatio autem illa possit esse continua, vel relinquere cineres quasi quosdam, vel acridinem quandam imprimere: vel certè motus iste continuus sedens suam, cor nimirum, per moerorem valde debilitatum, afficere continuaveat. Fumi porò illi ad cerebrum delati, vel etiam quod instar cucurbitulæ illud sit, attracti, dum faciem prætervolant, coloris in illa quodam mutationem gignunt; & spiritibus animalibus tanquam lucidis, il-

ut nigri si objiciantur, varia illa symptomata: melancholica, timor, mœsticia & varia periculorum imaginatio: itemque ex alto & quasi cum gemitu veluti respiratio, exoriuntur. Qui & ipsi fumi cerebro sese insinuant, vigilias aut somnum perturbatum conciliant, cum benigniores fumos somni materiam esse, notum sit. Quemadmodum si in cerebro densentur, deorsum ad principia nervorum ferantur, & leves obstructions pariant, tremores quandoque, frequenter autem lassitudines illæ artuum oboriuntur: unde per sudorem quoque facile discutiuntur: quæ tamen lassitudines ex crassioribus etiam lienis fumis dependere possunt, quemadmodum in scorbuto experimur. Hoc verò malum licet non admodum facile tolli soleat, propter causarum quendam introductum habitum: humorum contumaciam: intemperies viscerum & curandi intentiones contrarias: Attamen constitutio corporis laudabilis: ætas vegeta: facultatum tantum quarundam actiones non abolitæ, sed depravatæ saltem, aut quodammodo imminutæ, optimè sperare jubent.

Tolerantia verò interim præstanda, quod nullus Medicus citò ea sanet, quæ naturæ per se difficulter sunt sanabilia.

Curandi igitur intentiones quod attinet, ex relatis facile patet, obstructions imprimis esse referendas: materiam visceribus & vasis hærentem incidendam & educendam: intemperies viscerum corrigendas: ipsa postmodum per appropriata roboranda.

Quas sanè intentiones aggrediendo, secundum triplicia Medicorum instrumenta seu auxilia. Dietam quod attinet magna illius ratio habenda, quod absque illa reliqua medicamenta nil possint: & secundum Galenum illâ unicâ diuturni ferè curentur morbi, subtracto fomite, scilicet cruditate.

Aër igitur sit temperatus tam in activis quam in passivis qualitatibus: imprimis verò vitandus frigidus & humidus: itemque mutationes aëris subitæ, v. g. à frigido valdè ad calidum, & contrà: vitandus quoque non perflatus vel conclusus, quo non caput oneratur tantum, sed humores qua si colliquantur, hinc destillationes. Possent quoque tempore frigidiori vel humidiori, trochisci parari ex ligno rosæ, thure, succino, styrace calamitide, caryophyllorum, ligno aloes, benzoi, &c. atque ijs fumus in cubili vel vaporario excitari.

In cibo observetur & qualitas & quantitas.

Quantitas quidem ut de mensa surgens S. Cels. appetat adhuc, neque unquam cibo sese repleat, quin illius desiderio adhuc teneatur: præerea ut cœna sit parcior, quandoque etiam nulla.

Qualitas verò ut sit attenuans ex §. de l. a. 2. neque varius, sed quoad licet simplicissimus: cum simplex licet paulò deterior, tamen non noceat, quantum multiplex, licet melior, ob inæqualitatem succi & coctionis. Utiles verò sunt carnes gallinarum, caponum, avium in aëre tantum degentium, vervecina, hœdina tenera, bovina tenera, vitulina satis adulta: & alii cibi facilis digestionis, qui probè noti sunt.

Fugiendi autem crassum & viscidum succum gignentes, quales sunt frigidi suâ natura, pisces & carnes crassioris substantiæ, aves in locis palustribus viventes, v. g. anseres, anates.

Lacticinia, caseus imprimis (si modo illo vescatur S. Cels.) vetustior. Ejusmodi quoque sunt pingua, sale vel aromatis nimium condita, fumo exiccata, frixa, acida, caput petentia (v. g. cape, porrum, sinapi) flatulenta item, ut sunt rapa, legumina, castaneæ. Ex fructibus potissimum conveniunt cappares, limones: & permittantur fraga, cerasa, perfica benè matura.

Affis potius utendum quam elixis (cæteris paribus) quod hæc fluent in ventriculo.

Ordo quoque in cibis servandus, scilicet ut liquidus ex jusculis gallinarum, ptisana, præcedat, solidiores sequantur, & inter hos primum elixi, deinde affi. Justum quoque oportet esse spacium inter prandium & coenam, ut scilicet prior cibis prius digeratur, quam alius ingeratur.

A cibo assumenda, quæ effumationem vaporum quodammodo prohibeant v. g. pyra, cydonia, Confect. anisi, coriandri aut fœniculi: quemadmodum ut dictis confectionibus aut diacydoniate uti liceret: vel pulvere tali peptico.

Recip. Panis albi tost. ℥iiij

Coriand. prepar. ℥j

Cinam. elect. ℥ij

Galenga ℥j

Masticis ʒß

Sach. rosat. tabulat. ad Pondus
omnium, f. s. a. Tragea.

Pani quoque quo vescitur S. Cels. Sem.

carui, coriand. vel fœnic. misceri posset.

Potus magna habenda ratio, cum citò & multum nutriat; neque eo carere possimus. Cerevisia itaque sit rara, limpida, vetustior parumper non focculenta: Vina generosa fugienda, crassa item & adstringentia: quemadmodum omnia alia in nimia quantitate: utendum albo, tenui,
oligo-

oligophoro, quale est Rhenanum tenue, vel neccarinum. Commodum verò valdè esset medicato uti ex borragine vel scolopendria, imprimis verò melissa: parant nonnulli & vinum purgans.

Non statim à cœna dormiendum, sed ad minimum per horam unam aut alteram deambulandum moderatè, aut tempus qualitercunque fallendum. Diurnus verò somnus omninò improbatur, quod excitet quidem & elevet vapores, sed non perficiat, nisi assueverit S. Cels. vel nocturnus brevior fuerit: tunc enim sedendo illi indulgere poterit.

Exercitium sit moderatum jejuno stomacho, & excrementis rejectis, ambulando vel equitando, eousque donec corpus madeat, non autem sudet: vel quando ex anhelitus mutatione, calorem satis excitatum sentiatur. Ac manè quidem validius paulò, quam vesperi: nunquam verò valentius, cum immoderatum noceat, non tantum absumendo spiritus, sed & sanguis & humores agitentur, sic incalescant, hinc effumatio major. Nequè instituatur illud à cibo, cum ità crudi succi per totum detraherentur. Neque cibus ab illo statim sumendus, sed quando corpus à motu non amplius calet, id quod ex respiratione facile patet: ne scil. cibus justo citius ad viscera rapiatur, sic obstructions novæ gignantur, vel priores augeantur. Monent hic nonnulli, vestes haud oportere esse strictas, potissimum circa thoracem, collum, alas, inguina: itemque ligaturas circa genua, non arctas fieri debere: ne scilicet vasis compressis transitus spiritibus & humoribus liber intercludatur, sic incalescant & fumes de se spargant.

Excrementa cotidie deponenda, vel sponte vel arte, passulis scil. purgantibus, enematis vel aliis assueris. Caput (vacuato corpore) manè pectendum ad sua discutienda excrementa, mox frusto agarici crudi primum, post panno asperiori fricandum.

Balneo si S. Cels. uti voluerit, quo vapores melancholicos per cutem dissipari, aut saltem demulceri, certò constat: ventriculus prius inungendus oleo mastichino vel de nuce moschata.

Animi tandem affectus sint moderati, tristitia potissimum, animi mœror, & motus, qui aliis sunt vehementiores, & à cibo meditationes: dum vel ferventiorum reddunt sanguinem, vel interius calorem cogunt, vel spiritus exhauriunt.

Cheirurgiam quod spectat: licet nauseantem, quique debilioris sunt ventriculi, phlebotomiâ minimè uti debere, vulgò statuatur: attamen cum & Epar sit calidius, præterea adsint obstructions, & morbus hic possit fieri magnus (ratione symptomatum partim junctorum, partim sub-

secutorum) consentientibus imprimis viribus & ætate (quæ tria ex Hippocr. & Galeni præcepto, venæ sectionem indicant) vena dextri vel sinistri brachii in vere & autumnio secari poterit: cum præsertim s. de loc. aff. 2. testetur Gal. Omnes qui palpitazione cordis laborarint, venæ sectione adjutos fuisse: ac quemadmodum refert, annuâ sectione malum illud præcavisse: semper tamen illud attendendum, quod 1. ad Glauco. 11. & 3. de loc. aff. 7. diligenter monemur, calorem & substantiam effluentis sanguinis observandum esse, ita nimirum, ut ater & crassus liberius paulò emittatur, tenuis verò & clarus contra.

Hæmorrhoides quoque si aliquando fluxerint, apertioni earundem studendum rursus, per pilulas aloëticas, vel alia auxilia nota. Et cucurbitulæ quandoque affigendæ naribus ad materiæ derivationem, itemque ob emulgentes calidiores.

In paroxysmo quoque vehementiori (post vacationem totius) duæ cucurbitulæ regioni cordis, una parti anteriori altera posteriori affigi possent: quæ statim & vehementer causas morbificas à corde evocare solent.

Neque frictiones omittendæ partium inferiorum deorsum versus, itemque lotiones quandoque pedum ex decoct. hyssopi, absynth. ruthæ, salviæ, abrotani, puleg. chamemel. & id genus aliis.

Possent quoque fonticuli de more in cruribus excitari, cum potiora symptomata ex pravis potissimum & atris vaporibus, qui à partibus inferioribus in cor & caput feriuntur, pendeant: ambigo tamen an S. Cels. illos sit admissura: quemadmodum & dubitatur, an in malo hoc contumaciori & obstructionibus præsentibus commodi simpliciter illi sint futuri.

Medicamenta tandem quod attinet, humores illi crassi & visceri, obstructionum causæ, ex Gal. rursus s. de l. a. 7. attenuandi & incidendi, hinc detergendi, malignitatem vaporum & mæsaræi & viscerum non negligendo v. g. decoto rad. eryng. cichor. scorzonæ. filis. pentaphyll. aperitivar. cort. cappar. thamaris. med. frax. fol. Ceterach. agrimon. spicanth. veron. card. bened. borragini meliss. beton. cichor. endivia sem. carminant. & frig. major. citri, basilicon. flor. cordial. anthos &c. & syr. de pomis, de cort. citri, bisant. &c.

Hinc vacuandi vel continuis vicibus apozema parando purgans: vel interpolatis, infusione (liquidæ enim formæ solidioribus melius subeunt venas obstructas) rhabarb. fol. sennæ, agaric. & paucò elleboro: neque enim fortioribus utendum monemur, ne subtiliores partes vacuentur, relictis crassioribus, vel etiam humor ille melancholicus, utpote rebellis, efferantur.

Vacuato ita corpore; fortioribus obstructions aggrediendæ videntur, quales in officinis prostant Troscisci & confect. aromaticæ illis appellatæ & commendantur valde radix scorzonera à Mercato lib. 2. de morb. mulier. c. 6. ubi etiam modum exhibendi varium diligenter describit: potiores autem sunt præparaciones chalybis, quæ longo ordine ab eodem Mercat. dicto lib. c. 6. & 18. afferuntur: & eligi aliqua ex illis, vel similis huic illustri individuo apta, parari posset.

Simul verò & viscera corrigenda seu roboranda, per Conservas, condita, & species appropriatas, itemque alia partibus principibus peculiaribus (diversis formis, rotularum, morsulorum, electuar. condit. pulverum, ne natura uni assuescat, vel una forma sic tædiola) addendo illis aliquid lapidis Bezaar: quemadmodum & hoc solo uti liceret eo modo quem Gartias docet lib. 2. hist. arom. c. 45. vel Merc. loco cit. cum præter: trui ad melancholicos morbos multum illum facere experientia edocuerit. Commendabat valde Cardanus Chrysolitum lapidem, quo plures melancholicos se curasse gloriatur, & alii præstantissimi Medici illum imitantur exhibentes gr. 6. vel 7. cum aq. scolopend. manè & vesperi.

Mithridaticum quoque ex usu esset bis in mense, ʒß vel ʒij (vel etiam ʒj pro sudore) cum conf. rosar. ʒij permiscendo. Ac sassatras cum cortice ligni (hi enim quod nullam sitim inducant, temperati magis statuuntur) per aliquot dies continuo usurpari posset, non pro sudore, verum digestivo, scil. ut cum gallina vel capone, more solito coquatur, & colaturæ seu jusculi haustus, hor. 2. vel 3. ante prandium assumatur: Quod si quis caliditatem vel siccitatem ejus metueret, facile additis floribus & foliis appropriatis alterari illa posset: quamvis ventriculum S. Cels. satis frigidum & humidum, & tantum aliàs proventum pituitæ adesse intelligam. Cujus quoque ratione non incommodum videretur, si elixir aliquod peculiare ex aromatis & aliis ventriculo & cordi appropriatis pararetur: Itemque cor cervinum cum malvatico & dictis ventriculo & cordi appropriatis (palpitationis ergò) destillaretur: ob pituitæ enim præsentis copiam calor istorum, & incendium mearæi haud timendum videtur, cum præsertim & per sandala, corallo, margaritas, conservas & condita attemperari posset: usus quoque tempore, syrupi si non de corticibus citri, saltem acetos. citri aliquid permisceri posset: tandem in spiritus potius, quam humores illa transeant, qua ratione alii olea destillata exhibere non verentur.

Topica quoque minimè negligenda, ad lienem potissimum, in quem usum Cerotum nonnulli ex ladani & ceræ paribus æqualibus valde com-

mendant : & alias fofus ex aceto vini, extinctionis chalybis vel marchafitæ ignitæ ; vel ex foliis rad. & cort. appropriatis : itemque unguenta & emplafta, lieni quoque peculiaris, nota funt. Ventriculi verò habenda per fua, ratio : & caput dum lavatur, lixivium & fapo peculiaris parari poffent : quemadmodum & errhina, & masticatoria utiliter præfcriberentur. Scuta tandem facculi, linimenta epithemata cordialia nota quoque funt : de fomentis tamen addubatur, cum calidum in frequentiori ufu §. aphor. 16. carniū effaminationem, id eft languorem & imbecillitates inducat : dum fcil. & hoc loco fibras laxat & folvit, quo fit, ut fpiritus per carnes fparfi diffundantur, fic viscus laxius & imbecillius reddatur.

Quæ quidem confignare de morbo illuſtriſſimi Principis nunc potui, aliorum præſtantiffimorum viroꝝ ſententiam expectans.

CONSILIUM XXXIX.

IN MACIE, CORDIS PALPITATIONE SPURIA, ET ARTUUM IMBECILLITATE.



Affectus, puius Generoſus adoleſcens, annos natus novendecim, temperamenti calidi & ficci ad quinquennium moleſtatur, opemque medicam cum ad præſervationem, tum curationem expectat, magni ſunt momenti.

In vitalibus enim partibus motum quendam cordis corruptum, reſpirationem frequentiore, viriumque imbecillitatem ſentit : in naturalibus, intemperies jecoris calidior, indeque corporis macies notatur : In animalibus, ingreſſivæ atque apprehenſivæ debilitatem, poſt quemlibet levioꝝ etiam motum, difficilem ac laſſum ſe ſentiens, percipit : ut benè prudens regimen diligens vitæ ſubſequentis expetat. Quod ut petitioni ejusdem reſpondent, neceſſarium omninò fuerit, ſedulo ſymptomata dicta perpendere, eorum accurratam cauſarum investigationem inſtituere, fontem malorum quærere, indeque curationem convenientem deducere.

Tardior itaque motus artuum cum ſit affectus ſpirituū animalium, hi verò ex vitalibus, vitales autem ex bona partium diſpoſitione generentur : utique in harum læſionem illum referendum veriſimile eſt, cum
nulla

nulla nec capitis, nec partium extremarum principalis affectio appareat. Ac quamvis annuo spacio tumores in collo, cubito sinistro, itemque in præsentia femore dextro exorti sint malæ tamen potius nutritiones quam harum partium imbecillitates causæ horum censendæ veniunt. Cum enim ob temperamentum jecoris calidius & siccius, cui reliquarum partium crasin consentire multa demonstrant, sanguis calidior, ac pro corporis mole copiosior producat (nulla præsertim observata præservativa victus ratione) non mirum viscera, & totum non benè nutriri, lienem ob copiam excrementi crassi, in attrahendo & regulando paulatim deficere; pulmones inepto alimento nutriti, malè concoquere, tardiores ad motum fieri, indeque celeri tractione aëris copiam compensare: spiritus vitales pauciores, eosque impuriore, ratione vaporem calidorum, produci; cor inde æstuarè, ac facultate pulsifica, naturali illa, attractice scilicet & expultrice frustrata; illa quidem ob materiæ copiam ventriculos cordis replentem impedita; hac verò ab eadem materia noxia irritata, ad expellendum insurgente, motum talem, id est, frequentem & velocem, ad similitudinem follium fabrorum edere. Utià actio hæc cordis potius ob errorem externum depravetur, sitque palpitatio notha, quam cordis aliquam medicam intemperiem; quamvis hujus constitutionem cum toto eandem, concausam motionis materiæ eò, aliquali præsertim supra sinistram cordis regionem exuperantia hanc attestante, existere non negemus. Redarguit prætereà harum causarum dictam originem, cum præcedens curationis ratio, qua per frequentia calidiora & sicciora purgantia, alterantia seu confortantia, intelligo medicamenta, parum adjumenti sensit: imò contrariis, temperatis nimium atque humidis melius se juvari percepit: tum quod massa sanguinea limosa, adusta, & absque omni ferè ichore, ex aliquali sanguinis missione innutuerit. Quibus hunc in modum constitutis, jam ex Methodicis Medicorum placitis opus erit, sanguinis massam ac jecoris intemperiem pederentim immutare, simulque cum totum tum partes præcipuas, per temperata (non frigidiora; quæ cum Avicenna ut ramo quidem id est cordi opitulantur, ità radici ejusdem, id est, calido innato officiunt) humidaque; alterare, atque cor ipsum, totalis ejus virtute considerata, corroborare.

Quæ sanè assequi in generoso hoc patiente quamvis arduum videatur, cum cordis affectus ex vehementia dignitatis plerumque multum timoris ciere, ac ex Avicenna ad syncopen & ad mortem permutari soleant: quia tamen non est legitima hæc palpitatio, de quâ prognostica autorem sinistra intelligenda veniunt: cordisque caliditas in habitudine, nec

nec ulla vehementia insignis ratione essentiae aut facultatis totum regentis ex cordis vitio adhuc apparent; ac adsit experientia hominis palpitatione notha (in qua violentia motus ille non est morbi, pro causa eum sumendo, sed solius naturae; ac in praesentia magis expultricis, quam attractricis, quarum distinctio non raro Medicis imponit, ignoratioque aegros abstulit) detentos ad extremum senium pervenisse: non dubitamus, quin affectus dicti & praeservationem & curationem, licet difficilem ac tardam, cum praecipue dicto aeger obedientissimus, admissuri sint. Ut ergo, spe hac concepta, ad notatas Indicationes omnes actiones ejus conspirent, non intempestivum fuerit, cum intemperies hujusmodi non nisi longiori tempore, quemadmodum insurgunt, tutissime auferri soleant, Medicas materias iisdem accommodare.

Venae itaque sectionem materiam remedii optimi censemus: quod etsi annis hisce adolescentiae non frequens sit, semel tamen vel iterum annuatim, sub paucâ praesertim quantitate, eo uti consultum erit: praeterquam enim quod copiosior inde, quam pro partibus excarnibus nutriendis sanguis demitur, melancholicus adustus alteratur, etiam viscera intetiora per accidens commodum sentiunt, refrigerium & allevationem: idque potius saepius à dextrâ parte, quam opposita. Quod si juvenili aliaque aetate hujus loco quandoque sanguinem demere cucurbitulis sacrificatis placuerit, eas potius natibus aut lumbis, quam aliis partibus non convenientibus apponere faciat.

Eadem enim cum parum moveantur, imbecillioresque sint, frictionibus potius mediocribus praesertim crura, quotidie matutino tempore agitandæ, iisque corroborandæ sunt: sic enim venae minores à majoribus melius & plus utilis alimenti referunt, fietque appositio commodior, ac nutritio plenior. Ac quandoque etiam non nocuerit eadem extrema vino bono, odorato, roremarino fovisse: quemadmodum & totum lenissime fricasse, indeque oleo amygdalino absque igne expresso, cum vini muscatellini tertiâ parte commixto, manibus calidis injungere, praequae cæteris colli atque dorsi spinas. Pro cruribus, etiam lotio fiat saepius, eaque ex aqua origano, majorana chamemelo herbis alterata, cum pro corroboratione eorundem (cum praesertim ex refrigeratione aliqua passi) tum verò aliquali à partibus superioribus revulsione.

Cui etiam balneum ex aqua dulci tepida, vel blandè in initio calida, adjungere optimum erit, tum pro caloris attemperatione, tum benigna totius humectatione; in aestuario blandius calefacto, absque ulla

violenta sudoris expressione ; hyeme semel in septimana ; æstatis verò temporibus bis ; reliquisque anni partibus , prout ad eadem accesserunt. Nec aquam multum alterare opus sit ; sufficiat sacculum habere , cui indatur aliquid florum chamomeli , aliquot item manipuli hordei atque tritici ; atque super hunc in labro aquam ferventem primum fundere , dein attemperare , eidemque insidere : atque eum post usum aliquem innovare. Post quem itidem conveniens erit inunctio paulo antè notata.

Cauterii seu fonticuli alicujus usum , ad revulsionem à cordis regione nondum præcipio , quia in aliis lenioribus spem adhuc multam habeo. Quod si verò , quod Deus clementer avertat , iisdem diu diligenterque adhibitis , malum non cederet , utique illud arte excitare in dextro crure commodissimum fore judico ; longeque commodius , quam mole medicamentorum , purgantium præsertim & calidorum alterantium corpus vexare , massamque sanguinis crassam atque adustam detractis partibus tenuioribus exagitare , ac ad alendum ineptam reddere , indeque mala omnia augere potius , quam minuere.

Ob quas rationes & nunc & totius vitæ tempore à calidioribus abstineat , itemque à purgantibus validis. Ut sufficiat alvum leniri cassia , manna , quandoque melle rosato ratione ventriculi ; purgari verò elect. lenit. diacatholizone cum paucissima portione , idque rarissime confessionis Hamech ; tantum enim nocumenti non infert hujusmodi corporibus hisce benignis decies repetita , quam ex validioribus elective ut loquuntur , ducentibus unica evacuatio. Hocque intellectum velim de medicamentis per os sumendis : quantum enim illa fortiora , ut est benedicta laxativa , Conf. Hamech , elect. item diasenæ dictum exhibita nocent ; tantum inferius per clysteres injecta conferunt , idque tam ad evacuandum , ut nec spiritus nec humores totius multum inde alterentur , quam ab sollicitandam naturam , ut nusquam aliò , quam naturalem hanc sentinam excrementa & superflua mittere assvescat , eoque commodissima revulsio contingat.

Præparantia porrò quod attinet , malo eadem desumantur ex alimentis , quam medicamentis. Itaque usus juris ex carne bubula vel Gallinæ sit quotidianus ac diuturnus ; nisi alia necessitas quid diversum postularit. Sub qua tamen svadeo , ut alia hisce jusculis commisceat potius (ut tempore frigidiore pauxillum ex macis pulvere : quandoque in iisdem ebullire faciat pugillum dimidium ex capillo Veneris , aut fol. Endiviæ) quam aliis syrupis aut apozematibus assvescat.

Alterantia alia & confortantia non sint vehementer ealida , cum vir-

cutis substantia seu quantitas indedissolvatur ; nec taliter frigida , cum ejusdem inde qualitas refringatur , nec nimium adstringentia , ne excrementa corporis diutius hærere faciant , cumque attemperare non calefacere hic animus sit , hoc absque his benè licitum est. Ut hinc nil magis laudari possit , quam usus feri caprini optimè more Italico depurati , sub initium veris ad dies viginti vel ultra incipiendo à lib. ß usque ab lb. ij vel etiam iij , idque quandoque purè quandoque cum succo borraginis , dein fumatiæ , iterumque dosin minuendo sincere.

Quantum enim hujusmodi annua alteratio hisce corporibus beneficium præstet , quotidiana docet experientia. Intra illud tempus in usu habeat Morculos inferius præscriptos , deque his cum brodiis continuus usus sit.

Quorum item loco laudare licet Electuarium ex sacharo borraginis , violar. cum ligno vel aloes vel sassafras confectum cujus item forma infra. Itemque (ne naturâ uni tantum assvescat , utque potius sæpè & parum negotio leviori , quam rarius & multum difficiliori ; corporis calor nutrimentum digeret) panem Martium dictum , modo inferius notato , deque eo frustrum loco merendæ sumat.

Cæterum cum parum juvaminis ex hujusmodi remediis pro venire soleat , ubi victus ratio , adeoque omnes consuetæ homini actiones non consentiant , cum consensus harum demum ille sit , qui & bonam sanguinis mutationem & viscerum jucundam , naturalem , eamque facilem alterationem inducere soleat ; propterea & ad subsequentia omni cura attendat oportet. Primum ad Admovenda ; inter quæ cum sit Regio ; patriam ei convenire non dubito , ut puta in ortum & septentrionem extensam. Aër : cum si domus vel particularis habitatio inconvenientem præbet , is utique per suffitus commodos (ut si calidior , humidiorque , ex violis , rosis , santalis , thure) corrigatur. Aliàs sit temperatus & purus ; ac ubicunque degat potius ejus ventilatio in cubiculis , ut ab ortu & septentrione fiat , quam oppositis plagis procuret.

Frigidiorem etiam eidem rariori cutis texturâ prædito infensissimum credat.

Anni tempora ; ex quibus præcederis autumnum ob inæqualitatem & frigiditatis siccitatisque reciprocos motus periculosum , censeat ; ut hinc vestibis corpus benè tegere undiquaque commodum fuerit , iisque mutandis idipsum mundum semper servare. Ac cum hujus rei gratia , tum ad aliquam corroboracionem sacculum tenuem & latum quemadmo-

dum

dum exemplum ejus inferius positum est, sub pectore gestare bonum erit, illumque subinde vino madefactum vel aspersum alterare.

Inde ad gerenda; ad quæ referuntur somnus; qui sit nocturnus, nunquam diurnus seu pomerianus: octo horarum, ac quandoque etiam plurius, si præsertim sub introitum lecti non bene quieverit.

Motus item, qui cum duplex sit, internus seu animi, hic sit moderatus in omnibus affectionibus; inde ab amore nimio, tristitia, ira maximè sibi caveat; potiusque gaudio, musicis instrumentis, colloquiis jucundis sese exhilaret; Et externus, seu corporis; is levior convenit; unde exercitia validiora fugiat, temperatis incumbat, obambulationibus scilicet ante pastum, unctionibus, equitationibusque placidis.

Ipsa quoque Venus moderata erit conveniens, cum refrigerando & revellendo calidam temperiam immutet, corporaque sicciora humectari & pingvescere faciat.

Tertiò ad educenda; per quæ superflua omnia è corpore expellantur, ut quantum licet, ab omnibus excrementis, semper mundum servetur. Hinc manè fiat diligens capitis pectinatio, sordium aurium, excrementorum narium & oculorum sedula emundatio; utque alvus ad minimum semel de die respondeat advertat.

Quæ si quandoque diutius subsideat, convenientissimum fuerit ante cibum pomis coctis sachari portione adpersâ, aut prunis leniter aqua calida tumefactis iisque æstate frigidis hyeme calidis eam emollire.

Ac pro certo credat, se quam diu alvus benè fluxerit, commodè vivere posse; indeque si dicta non suffecerint, clysteribus assvescere discat, ac eos domi (cum alia defuerit occasio) ex aqua alterata per decoctionem chamæmeli floribus, herbis borrag. violar. seminib. carui, fœniculi, vel aliis similibus, aut brodio carniū vel gallinarum confici sinat, cui mellis, olei aut butyri saliti portio; vitelli item aliquot ovorum addantur.

Restant assumenda; per quæ alimenta duntaxat intelligo; in quibus ut & cæteris diligenter animadvertat, ut omnia ipsius intemperiem augentia fugiat, ut puta multum calida & sicca, qualia sunt allium, porrum, cepæ, raphanorum omne genus, piper, plurimisque aromatis condita, nimium salita, ac fumo indurata (nisi oblectamenti gracia buc cellam unam vel alteram cum aliis sumserit) edulia. Dein potius elixi, quàm assi sint cibi, puta plus humectantes, hinc etiam jusculis quotidie uti non desinat.

Quod si aliquando ventriculum laxum & quasi lassum ex usu humidiorum (quod quandoque contingat) sentiat, tum aut copiosiores panem eduliis addat, aut hunc leniter assum per se ita siccum, vel vino madefactum cumque pulvere aliquo stomachali, qualis sub finem Receptarum additus, inspersum eduliis reliquis semel atque iterum superaddat.

Attendat quin etiam in tempora, ac constitutionibus humidis parcius corpus humectet; siccis verò & calidis magis: insignem etenim vim ad corpora nostra alterantia aëris ambientis & attracti esse, experientia diligenti percipiet.

Panis sit pridie coctus, non recens, isque boni saporis ex zea vel tritico, albus, non nimium fermentatus. Pisces saxatiles & carnis durioris, itemque exiccatos, boni nempe nutrimenti, assumere potest.

Carnes omnis generis, præsertim ex juvenibus animalibus, iisque domesticis; sylvestrium itaque & avium sit parcior usus: utque summum dicatur, virtus optimi succi pauci excrementi. Ex fructibus amygdalæ proderunt: poma item dulcia, manè assa sumta, vesperi verò ante coenam cruda ex vino, adjuncta præsertim buccella panis, quandoque etiam pyrum unum vel alterum à cibo, sæpius assa cum notato pulvere, rarius cruda sumendo. Uvas passas minores, quandoque etiam majores rejectis acinis, ut & caricis pingues laudamus. Potum tandem quod spectat, vinum illi ciborum vehiculum esse nolumus, sed tantum ratione ventriculi parca manu quandoque remedium, sequentibus præsertim juvenilibus annis. Nec etiam Melicrati continuum usum svademus, quod etsi abstergat, multum tamen calefacit, ac consequenter exiccat.

Hinc utatur bonâ quadam cerevisiâ eaque paucis lupulo ac bitumine infecta, atque potius ex tritico quam hordeo, cum minus refrigeret & melius humectet, confecta; cui etiam Nodulum ex floribus violarum & pulvere stomachico, æstatis præcipue temporibus, indere optimum est: servatâ in his omnibus convenienti mensura, qua non continuata, etiam diligentissimus in qualitatibus ordo pro nihilo est. Ac postremo notet etiam, ut nunquam cibum vel potum absque appetitu sumat, & priori non perfecte concocto, cum inde quotidie plurima incommoda contingere observemus.

Atque hæc sunt, quæ pro auferendâ malâ Generosi & insignioris indolis adolescentis dispositione & valetudine rogati notare volumus; eaque benedictioni divinæ, excellentiorum Medicorum prudenti judicio, diligenti ac sensuali experientiæ committimus atque subjicimus.

Recip.

Recip, Cassie jam extrahenda ℥ss

Manna electa ℥ij

Aq. borragini.

Violar.

Mentha ā. ℥j

Mis. & add. ℥ss. pul. ligni sassafras s. porium-
cula, detur in fictili calida.

S. Burglerträncklein.

Recip, Rad. althea incis. ℥j

Herb. malva Mij

Meliloti Mjs

Flor. chamomel. Mj

Sem. carui

anisi ā. ℥j

Prunor. ungaricor. n. XX.

F. decoct. in aq. Endivia

Chamemel. ā. ℥j.

Ad consumptionem animidij

In colatura dissolve,

Elect. lenitizi ℥j

Confect. Hamech ℥iij

Syr. ros. simpl.

Ol. lilior. alb.

Anethini ā. ℥vj

Ovi vicell. n. j.

Mis. pro Enemate.

S. Clastier.

Recip, Carnis seu musculor. interior.

Capon. junior. minutiss. incisor. ℥js

Nuc. pineor. recent.

vel amygdal. dul. ℥ss

Pnl. rad. cicbor.

Cinamomi acuti ā. ℥j

Sachari albiss. aq. rosar. dissol.

℥iiij s. Morsuli pond. ℥ss. dentur in scarula.

S. Morsellen.

Recip, Conser. rosar. recent.

Cicborij ā. ℥ss

Borrag.

Violar. ā. ℥jss

Pul. ligni sassafras

Spet. diamoschi dul. ā. ℥ij

Cum syr. de cort. citri f. Elect.

S. Latwerge.

Dosis ā ℥ij ad ℥ss.

Recip. Nucl. pineor.

Pistactor.

Amygdal. dul. ā. ℥ij

Macerentur 25. hor. in

aq. rosar. & Violar. ā. q. s.

Deinde add. pulv. rad. cichor.

Ireos. ā. ℥ss

Sem. papaver. albi ℥j

Sacharē albiss. ad duplum Mis.

Fiatq. pasta seu panis Martius ut
artis, dosis ab ℥ss ad ℥j

S. Marcipahn.

Recip. Flor. rosar. rub. Mj

Borrag.

Bugloss.

Violar. ā. Mss.

Melissa pj

Santali citrini pul. ℥iiij

Cort. citri pul. ℥j

Ex incisis & pulveris. f. sacculus quadratus latitudinis & longitudi-
nis spithame ex linteo molliori, interpastetur diligenter.

S. Herbsäcklein.

Recip. Pulv. ligni sassafras

Santali citrini

Flor. rosar. rub. ā. ℥j

Confection. coriandri ℥iiij

Anisi ℥ss

Mis. propulvere. Detur in scatula.

S. Pulver aufs Essen.

CONSILIUM XL. IN FEBRI HECTICA.

Non hic de essentia hecticæ disputabo : quin potius rectè ad therapeusin convertar.

Constat enim inter omnes affectum huic esse calidum & siccum, in habitu & carne cordis & totius corporis venarum & articularum, id quod ex velocitate & parvitate pulsus indicatur. Quapropter indicationes curativæ erunt, infrigidare & humectare. Non verò absolute frigida conveniunt, sed quæ temperatis permixta sint. Calor id nativus postulat, qui ne unà cum præternaturali extinguatur, sollicitos nos esse monet. Frigus itaque externum, corpus ut ne attingat, cavendum. Inspirationi verò aër competit frigidiusculus. Motus excalescitivi præscribuntur omnes: uti & omnia hydrotica, sitis fames, absque tamen nimia repletionem.

Cibi sint è gallinis, caponibus, agnellis, hordeo, pullis Gallinaceis, cum primis verò horum omnia probantur juscula. Pisces sint bdellæ, lucii minores, funduli, gobii fluvianilis, mustelæ nostræ, id est, bellionii.

Cerevisia sit Belgranensis, aliæque leviulculæ, quæ parum habeant lupuli, & quarum polentæ non nimis sint tostæ, id quod colore agnoscitur. Sorbitiuncula quandoque vini oligophori conceditur. Vitentur sæviores animi affectus, ut & purgantia omnia, nisi fortasse putrida huic hectica non simplici conjuncta sit. Balneum ex aqua fiat fontana tepidâ, quæ nec ebullierit, nec sudori causam præbeat. Neque in eodem incessu diuturnas moras trahas, sed quamprimum egredere, corpore linteolis temperatis benè absterfo & desiccato. Singulis auroris & vespers dorsum linimento præscripto inungatur, ubi & renum regio. Contra tremorem cordis particulam electuarii capiat, castanæ quantitate, hor. 8. antemerid. & hor. 3. postmerid. cum hoc quandoque permutetur Aqua nostra destillata odorata. Si palpitatio incidat cordis, panis triticus in lacte infusus, cum terrâ sigillatâ silesiaca cordi imponatur. Aliàs ferè semper scutum cordiale supra sinistram gestandum mamillam.

Hisce ipsis ferè medicamentis eodem in affectu ante 25. annos nobilem quendam præcipuum felicissime curâram.

Recip. Censer. Bugloss.

Cort. citri condit.

Succi citri non limon. ā. 3ß.

Lactuc.

Recip. Olei rosar. ℥j.

Violar. ℥s.

Nymph. alb.

Amygdal. dulc. ā. ℥ij.

Butyri recent. insulsi.

Medulla cruris vitul. lot. aq.

acetosa ℥ijs.

Pingued. anatis & galline ā ℥js.


Mucillag. sem. psyllii, cydoneor. aq.

violar expressa ā. ℥s.

Cera per aq. rosar. subacta pa-
rum. f. linimentum.

CONSILIVM XLI.

IN MARASMO SENECTUTIS.



Senectus ipsa Morbus est, rectè dictum. Quà propter de radicali curatione nil quicquam polliceri habeo. Causæ senectutis ex sese notæ sunt. Marasmi verò causa est, quod præsens ægrotus lue olim infectus fuerit venereâ, tum ex accidenti, cum à nativitate, eoque in affectu vel non plenè restitutus, vel medicamentis restitutus aliquantum detrimentosis. Cum autem hætenus medicamentis nostris, literis A. B. C. D. E. F. G. notatis, effectum, ut asperrimæ illæ & falsuginosæ in pectus decumbentes defluxiones jam sint inhibitæ, jam nihil prius & antiquius nobis esto: quàm bonâ uti Diætâ, & ne præproperè nimium Marasmus ille legem exequatur falcidiam, magnopere cavere.

Diætâ quippe hoc loco negligenda neutiquam. Rectè enim Hippocrates: Turpissima est calamitas, victus rationem negligere in curandis morbis.

Aere pluviosô & nubilô in publicum non prodeat. Vitet etiam radios Solis de die, & Lunæ de nocte. Cibi non nisi ἀχυμοὶ καὶ ἀπέντοι offerantur ventriculo. Sint ij amygdalata, pineata, hordeata. Pruna portugallica levem habent vim abstringendi, movent appetitum, & resistunt ventris fluxui. Reliqua pruna cave. Cydonia, passulæ, vitellique

ovorum, (ni calor adsit) sobriè usurpari poterunt. Gallinæ limacibus nostraribus depuratis minutimque concisis alantur. Non nimium comedatur, sed cum voluptate desinat. Cancros (gammaros intelligo) non edat, nisi sine affuso liquore cocti sint. Pisces comedat saxatiles: neque etiam eosce cum carnibus commisceat. Potus sit purus putus, & si calor absit, Malvaticum cum pane. Affectus vitet nimios. Consimiliter dominus Licentiatus sibi caveat, ne nimis licentiosè carnes comedat die Veneris.

Therapuescos loco, sequentibus utatur.

Potiunculam A. quinque absumat auroris. Sudet ut par est, post sudorem morsulos & rotulas B. C. D. in usu habeat, quibus ipsis & alias, quocunque placet tempore, perpetim & permutatim frui poterit.

Cubitum se collaturus succulentis liquoribus E. & F. uti & Tragea G. permutatim utatur.

Alvum singulis mensibus vel anni quadrantibus Enemate H. aperiat.

Pulverem I. stuppâ madidâ, vel malsâ quacunque excipiat, verticique sub cucufa adliget.

De Mixtura K. in fluxionibus quantum placet capiat. Spinam dorsi unguento L. nonnunquam inungat. Sacculum M. corporis regioni vino vap. dum applicet. Decocto Tormentillæ utatur in fluxu ventris. Hicce agrotum nostrum annare & perennare jubeo.

SEQUUNTUR MEDICAMENTA.

Recip. *Mass. pillular. cochiar.*

Azajareth.

De hierâ. agar. ā. ℥j.

Cum. Syr. de tussilag.

F. Fill. n. xxvij.

S. Willen. A.

Recip. *Flor. Stæchad. Arab.*

Cordial. trium ā. ꝑj.

Rad. Fœniculi

Petrosel. ā. ʒß.

Pimpinell. Ital. ʒvj.

Cichor. ʒj.

Tussilaginis

Polypodii ā. ʒs.

Glycyrr. h. 2a 3v.

Sem. citri 3ij.

Bombac.

Coroneer.

Anisi a. 3ij.

Ficuum

Dactylorum a. n. v.

Injub.

Sebesten. a. n. vij.

Herb. Scabiosa

Tussilaginis

Pulmonaria utriusque

Cichorii

Endivia

Capill. omnium

Origani

Calamintha a. Mj.

Gum. Tragag.

Arabici a. 3ij ligat. in petia.

Fol. Senne s. stipit. 3ij.

Epithym. Cret. 3v.

Coq. pro 1/2j. in calat. per noctem infunde.

Agarici troiscati 3vj.

Ireos Florent. 3s.

Cinamomi 3js

Expressioni fortiter facta adde

Syr. capillor. Veneris

De succo violar. a. 3ij

Sachari 3vj. Coq. ad consistentiam syru-

pi mediocris aromatificum 3iiij Spec.

Diatr. frigidi.

S. Syrupus B.

Recip. Flor. Stæchad. Arab.

Epithym. Cret.

Violar.

Salvia

Cichorii a. pj.

Rad. Cichorij

Hb 2

Aceto-

Acetosa ā. 3v.
Rad. Consolida
Tussilag.
Pæon. ā. 3vj
Sem. cartbami conquass. 3v.
Rad. Plantaginis
Glycyrrhiza rasa ā. 3ij
Passular. 3j
Fujub.
Sebesten. ā. n. xv.
Dactylorum n. vj.
Sem. Pæon. 3ij
Anisi 3js
Althea 3s
4. *Frigidor. major.* ā. 3ij
Portulaca
Endivia ā. 3js
Herb. Cichorii
Endivia
Scariola ā. Mj
Pulmonaria vulgaris & maculosa
Scabiosa
Tussilaginis
Veronica
Plantaginis
Origan
Capill. Ven.
Adiantum nig. Lugdun. ā. Ms.
Cog. l. a. ad. sufficientiam, in locat. ferventissima
 ebulliant parum sol. *Senna* 3ijs
In colatura sine expressione facta ℞j 3ij iterum
 coquantur parum,
Rad. Elleb. nig. styriac. 3ij
Charyophyll. 3ijs
Post dum adhuc omnia fervent infunde ℞. vij.
Agarici troc. 3vij.
Rad. Ireos 3s
Cinamomi 3iiij

Rhabarb. opt. ʒs

Schamantib. gr. v.

Bulliant iterum quatuor fervoribus & exprimantur fortiter. Ex-
presso adde.

Syr. de succo portulacæ ʒiij

Capill. Ven. ʒij

Sachari opt. ʒviij, f. Syrupus coctus, aromatizandus cum ʒs spec. dia-
trion: santal. sine camphora & ʒij spec. diatrag.

S. Syrupus C.

Recip. Thuris masculi

Sandaracæ

Santal. cintrini ā. ʒjs

Rosar. rub. ps.

Contundantur & incidantur grosso modo.

S. Pulvis. D.

Recip. Sy. de succo violar.

De portulacæ

Capillor. Vener. ā. ʒs

Decocti plantaginis, portulacæ, cichorii & pulmonaria ʒiij
Mis. f. haustus, reiterandus quoties postulabitur.

S. Haustus

Recip. Sem. papaveris albi ʒijs

Portulacæ

Malvæ ā. ʒijs

Cucumeris

Melonum

Citrulli

Cucurbitæ

Cydonior. mundat. ā. ʒjs

Gummi Arab.

Tragag. ā. ʒj

Amyli ʒs

Spodii

Succi glycyrrhizæ ā. ʒj

Sachari penid. ad pondus omnium.

F. Pulvis. S. Pulvis. F.

Retip. Rad. Salsaparill ʒjs

Ligni Guaiaci pul. ʒiij

Cord. ejusdem ʒj

H h 3

Passu-

Passular.

Pinear. ā. ℥j

Pistacior mundat. n. xx.

Glycyrrhiza

Anisi ā. ℥ij

Cinamomi ℥js

Aquar. Cichorii ℔vj

Scabiosa ℔iij

Tussilaginis ℔ij

Fervefactis aquis, cetera omnia contusa & concisa, infundantur per H. XXIV. postea in olla vitreata coquantur ad ignem luculentum sine fumo ad medietatem: ubi per se refrixerint, fiat Colatura cujus dentur ℥v. pro dosi.

S. Decoctum ligni. A.

Recip. Feces prioris decocti & adde

Liquiritæ, passulorum, sem. anisi ā. ℥ij. Cinamomi ℥j aq. bordei simplicis ℔xv.

Coq. ad consumptionem tertiae partis, ubi per se refrixerint Col. & S. Elschtranc.

Recip. Pistacior mundat, ab omnibus pelibus ℥j

Pinear. preparat.

Amygdal. dul. ā. ℥vj

Sem. melonum

Cucurbita ā. ℥s

Spec. Diatrag. frigida. ℥ij

Diarhod. sine camphora

Diatrion santal. ā. ℥js

Amyli ℥iij

Penidii ad pondus omnium.

Sachari q. s. dissoluti in aq. borrag. & Scabiosa s. conf. in Morsulis.

S. Morsuli B.

Vel.

Recip. Penidior.

Bechior. alb. ā. ℥j

Sem. melon. extort. } infus. in aq. tussi-
althea } lag. ā. ℥j

Spec. Diapapaver. alb. ℥iij

Margarit. preparat. ℥j

Extracti scabiosa gr. xv

Succi glycyrrhiza ℥s

Sachari soluti in emulsione sem. melon. & papaver. facta ex aq. tussilag. q. s. f. f. Conf. in oculis.

S. Rotula D.

Recip. Caput papaveris albi n. viij.

Glycyrrhiza rasa

Siliquar. dul. ā. ℥js

Sem. cydonior.

Bombac. ā. ℥js

Fugubar. n. viij

Coq. in s. q. aq. tussilag. pro t̄s, in qua iterum ad consistentiam mellis currentis coquantur sachari penidii, sach. cand. ā. ℥js resat. 3vj.

S. Nachtsafft E.

Recip. Syr. de siliq. & liquirit.

De Fugubis ā. ℥js

Ex succo violar. ℥j

De papavere ℥s

Balsami sulphuris 3j

Mis. S. Gafft F.

Recip. Sem. papaveris albi ℥ijs

Pontulaca

Malva ā. ℥iij

Gucumer. melon. citrulli.

Cydoneor. cucurbit, ā. ℥js.

Gummi Arab. Tragag. ā. ℥j

Amyli 3s

Spodij

Succi glycyrrhiza ā. 3j

Pulmon. vulpis prepar. ℥ij

Pulverisentur & misceantur omnia subtiliter, postea leviter torrefactis admis. sachari penidii ad pondus omnium.

S. Traga G.

Recip. Herb. malva althea. violar. ā. Mj.

Parietar. Mercurial. ā. Mjs

Flor. chamomel. Ms

Sem.

Sem. fœn. graci ℥vj. anisi ℥iij.

Passular. ℥s.

Cog. pro ℥j. in colat. discol. Cassie retens extracta. Elect. lenit. ā. ℥s.
vitell. ovor. n. j. salis ℥j. olei comm. butyri non saliti ā. ℥js.

Mis. f. Enema. S. Clyster. H.

Recip. Thuris masculi

Sandaracæ Arab.

Santal. citrini ā. ℥js.

Rosar. rub. ps

Ligni aloes ℥j

Ambra gr. v.

Pulverisentur omnia grosso modo

S. Pulvis l.

Recip. Mithridat. opt. ℥j.

Conser. flor. violar. ℥iij

Spec. diatrag. frig. ℥j

Cum. syr. violaceo f. Mixtura K.

Recip. Olei amygdal. dulc.

Sesamini

Rosacei

Pingued. gall. ā. ℥s

Cera Cirtine ℥iij

Aceti ℥j

Mis. F. Linimentum L.

Recip. Flor. borrag. buglosse ā. ℥s

Meliss. rosar. rub. ā. ℥ij

Ozumi garyophyll. ℥js

Serici crudi ℥j. helenij ℥j

Croci ℥s. ligni aloes. santali rub. ā. ℥s.

Cinnamon ℥js

Omnibus subriter pulverisatis adde

Ambra, Moschi ā. gr. ij

Mis. f. sacculus aliquoties interbassandus.

S. Sacculus Coraialis M.

CONSILIUM XLII. DE FEBRIBUS MALIGNIS PETE- CHIALIBUS.



Ebres, à Maculis quæ nonnunquam apparent, petechialis dictæ, hoc tempore grassantes, non sunt ex genere earum febrium, quæ interventu putredinis in massa sanguinea, continuo incendio, calori nativo negotium faceffunt: sed ad earum classem pertinent, quæ (quod actiones corporis vitales exiguo temporis intervallo prosternunt) malignæ, à nonnullis autem pestilentes vocantur. Etenim statim atque malignitas cor, & arteriosum genus inficit, omnes virtutes resolvi, & periculum non contemnendum pati depræhendimus.

Cæteræ verò actiones, tam animales quam naturales nihil aut parum ad sensum patiuntur.

Si enim animalem actionem examinemus, & mente constant, neque secundum visum, auditum, gustum, olfactum & tactum male habent aut depravate agunt: neque secundum motum aliter quam natura fere, sunt constituti, solis, iisque exiguis jactationibus (sub initium) cum quâdam inquietudine exceptis.

Neque dolores capitis, perinde ut in alijs febribus mox affligunt: nisi vel ratione plethoræ vel putridæ febris, quæ huic sæpè conjungitur. Accusant enim solam gravitatem, non dolorem. Si verò naturalem examinemus, cibum primis diebus non fastidiunt, & benè etiam concoquunt; nisi ructus & circa ventriculum gravitas quædam sit conjuncta: Excreta secundum naturam habent, inprimis urinæ, quæ sanis plerunque sunt similes, & si recedunt parum tinguntur colore ruffo, idque dum accidit, cum ichorem sanguineum malignitas simul infecit.

C A U S A.

Qua propter existimandum est, harum febrium causam esse malignitatem venenatam, pestiferamque inficientem principaliter omnes spiritus & horum virtutes, quarum mineras statim atque infectio facta est protinus depravat, & actionibus perficiendis inutiles reddit.

S I G N A.

Invaserunt autem hætenus nullo aut exiguo horrore, adeò ut fur-
tim potius quam aperto Marte congrediantur.

Primò enim triduo adeò sunt leves ut maxima pars ægrotantium , morbum vel diffimulet : vel non admodum curet.

Nam exiguum aut penè nullum , quod dixi dolorem capitis , præter gravitatem , quam non nisi interrogati , referunt , percipiunt.

Lassiitudines spontaneæ & inquietudines concitantur : quas si medico exquisitè sciscitari velit , ex jactatione potius & interrogatione , quam spontaneâ ægri querela , sub initium cognoscet. Vultus hominis sani ; soli oculi sublachrymantibus similes sunt.

A tribus mensibus frequens in nonnullis nausea , vomendi desiderium & ructus frequentes , dolorosi , & molesti simul has febres comitari cœperunt. Quos sæpè fluxus alvi consequens sedavit. Pulsus à naturali parum recedens , etiam peritos sæpè fefellit.

Calor magis circa cor (quod propter venenositatem anxietate laborat) quam in reliquis membris sentitur , in quibus est mitis , acrior tamen ad tactum , quam in febre ephemera simplici. Ideoque primo ut dixi quatruiduo non admodum est molestus , nisi malignitas cum alia febre sit conjuncta. Hic suos habet typos & exacerbationes : sub tempus enim somni sensibiliter cum querela ægrotantis augefcit , adeò ut nonnunquam vigilias aut somnum perturbatum producat. Manè vicissim est remissior , & mitescit perinde ac (licet non veniat ad aliquam intermissionem) omnino intermisisse videatur : Quo intervallo pulsus tam naturali est similis , ut sæpissimè arbitratus sim , omnem jam discessisse febrim , quæ tamen sub noctem de novo exacerbari cœpit.

Atque hoc intervallo & cibi & medicamenta ut infra dicam sunt exhibenda.

Sæpè etiam hoc intervallo intermediæ sunt exacerbationes , pro diversitate ægrotantium , nonnullis enim circa octavam matutinam , nonnullis circa duodecimam , nonnullis circa primam aut tertiam vespertinam leviuscule exacerbantur.

Sub his signis blandis morbus ad quatruiduum tam fraudulenter agit , ut sæpè ægrotantes non prius velint periculo fidem adlibere , quâ cum omnia ingravescent. Verum cum ab eo tempore ut plurimum augeatur , usque ad septimum vel undecimum , multiplices in eo intervallo crises eveniunt.

Nonnunquam quarto Natura insurgit , ad expulsionem , & (si ichores sanguinei præter spiritus vitales sint infecti) vel rigore vel horrore præcedente , malignitatem sudore exterminat , ita ut febris omnis cesset , nec morbi aliquid amplius supersit. Interdum tremorem per universum corpus

pus sine horrore aut frigore excitat: nihil tamen aut imperfectè expellit: sed solum materiam venenatam nervis & panniculus intrudit, & talem tremorem spasmosum & dolorem quandoque ingentem propter suam acrimoniam excitat.

Non rarò horrorem cum frigore copioso, febre tamen non cessante incassum movet nuncios si magnitudinis morbi ob infectionem tam potenter factam, ut neque virtus ferre, neque uno impetu ex corpore expellere possit: quo fit ut nono vel undecimo die similem crisin vicissim tentet. Quod si ne dum febris cesset, mors in vicinia insidiatur.

Sæpè cutis tingitur maculis, quales sunt morsus pulicum: in quibus observandum, ut die critico, quarto videlicet, septimo, nono vel undecimo erumpant: si quarto & non sequatur mitigatio febris, infectionis magnitudinem: si septimo & alleviatur natura, virtutis robur, & spem bonam promittit: si undecimo, & nulla sequatur mitigatio, naturæ imbecillitatem, & materiæ multitudinem, morbi que longitudinem arguit: si diebus extra crisin constitutis, inordinantur naturæ motum, & malum eventum prodit.

Ruffæ maculæ cum tolerantia facili, securitatem portendunt: nigræ verò & violaceæ, lethales sunt: virides & flavæ in medio consistunt. Quæ si ad reliqua signa sive bona sive mala regulentur, vel vitam vel mortem pollicentur.

Quibus in hoc morbo urinæ per omnia sanis similes sunt, ij rarò aut nunquam evadunt. Quod malignitas cordi insidens ex spiritibus in partes solidas pereptet, & eas prosternat.

Qui morbum non negligunt, & statim sub initium idoneis remediis utuntur, ij facile etiam liberantur: nonnunquam ante septimum, nonnunquam XI. XIV. vel XVII. Qui verò curationem differunt & acrem liberum non devitant, diutius decumbunt, & sæpè etiam succumbunt.

Desinunt hæ febres plerumque inpestilentes & pestem ipsam: propter augmentum malignitatis, quæ impuritate quorundam corporum transit in pestilitatem.

Curatio consistit in eo, ut statim à principio adhibeamus medicamenta ea, quæ malignitati resistunt, eamque à corde ita amoveant, ne incrementum sumat.

Secundum hanc intentionem caloris remissio molienda est. Et non viceversa, ut plerumque fieri solet.

Si enim magis solliciti simus de sopiendo calore, quam venenositate obtundenda, idem nobis continget, quod iis, qui magis de impluvio tollendo, quam tectis resarciendis, laborant. Rectè igitur rem aggrediemur, si exhibeamus medicamenta ea, quæ membra principalia à proprietate corroborant, venenositati malignæ resistunt, & putredinem in corde & contentis ejus, reprimunt, simul etiam moderatè refrigerant & calori medentur.

Id fiet commodissimè si medicus vocatus, non pretinus ad copiosè & exquisitè, sive per pharmaca, sive per venæ sectionem vacuandum, se convertat.

Sed primum in corporibus multa humorum crudorum saburra redundantibus levi clystere vel supposito alvum moveat, vel si non opus esse, aut tempus ferre opinetur, mox ad ea quæ malignitatem à corde propellant, & extra habitum corporis exterminent, accedat.

Talia sunt pulveres subscripti ad drachmam unam vel sesquidrachmam bis primo die ex aqua cardui benedicti, scabiosæ & borraginis exhibiti, eâ lege ut ad horam dimidiam aut amplius supersudent, & ante coenam & prandium hujusmodi medicationem instituunt: vel loco pulverum aqua bezoarticâ destillata, ad unciam unam vel sesquiunciam iisdem horis ex aqua acetosâ propinari potest.

Recip. Rad. tormentilla

Zedoar.

Diptam. albi

Gentiana

In aceto maceratarum per noctem & iterum exsiccatarum ā. ʒjss

Cornu cervi usti ʒiiij

Succin. albi ʒij

Boli armeni veri

Terra sigillata ā. ʒij

Margarit. preparat. ʒijss

Sem. citri. excort.

Acetosæ ā. ʒj

Cardui bened. ʒj

Mis. f. pulvis

Recip. Rad. & herb. pentaphyll.

Fol. Scorodij

Card. bened. ā. Mj

Calendula Ms

Rad.

*Rad. angelica**Tormentilla**Morsus diaboli**Petasitidis* ā. ʒvj*Sem. citri* ʒs.*Croci orientalis* ʒij*Conserua acetosa* lbß*Theriaca veteris* ʒj*Aceti vini acerrimi*,*Aq. vitæ optimæ*,*Vini cydonæor.**Succi citri (vel aq. acetosa)* ā. lbjs

Stent. in infusione per 24. horas.

Postea adjecto salis Mj. destillentur per cineres igne lentissimo: materia tamen in duas partes divisa, aut tres pro magnitudine vasorum. Possunt eadem per balneum in instrumento capaci simul destillari, sale non adjecto: postmodum fecibus addi aliquid salis, & affusâ aq. acetosæ per arenam urgeri, & prodibit aqua non minus efficax. Aquæ verò destillatæ infunde in nodulo.

Zedoaria ʒiij*Camphora* ʒß*Croci* ʒß.

Absoluto sudore, cibi, quales in hujusmodi morbis conveniunt, exhibendi, & cætera admovenda sunt, quæ venenositatem ab omni parte profligare, & cor atque mineras spirituum & caloris innati roborare, instaurare & contemperando fovere possint. Qualia sunt inter externa epithemata noduli odorati, aut alia odorata moderatè refrigerantia & malignæ venenositati adversantia: inter interna verò pulvis cordialis cum nuce vomica vel sine nuce vomica, qui talis est.

Recip. *Margarit. preparat.* ʒjs*Fragment. smaragdi**Sapphyri**Hyacynthi**Rubror.* ā. ʒß.*Off. de corde Cervi* n. iij

& si conjuncta sint multi ructus molesti, granorum

Paradyfi n. iij*Fol. auri* n. iij

li 3

Mis.

Mis. f. pulvis

Por patientibus verò tenuioris fortune.

Recip. Margarit. preparat. C. C. nsti præp. ā. ʒij

Fol. auri n. ij

Mis. f. pulvis, cui etiam grana 4. paradysi, ru-
etibus molestantibus, admisceri possunt.

De hoc pulvere sæpè & indefinenter de die ʒs vel plus minusvè ex aqua cardui benedicti exhiberi debet: aut loco ejus manus Christi cum periis, vel rotulæ ex hoc pulvere sic factæ:

Recip. Hujus pulveris ʒij

Sachari soluti in aq. rosar. ʒij

F. confectio in rotulis.

Ordinariè autem manè & vesperi circa tertiam ʒj hujus pulveris cum aqua cardui & acetosæ ʒiiij exhiberi debet loco digestivi: aut si æger dulcia ferre possit (quod plerunque in hoc morbo non fit) præparetur digestivum ex succo cardui & acetositatis citri, & una cum pulvere exhibeatur. Possunt similia cordialia ex conservis, si medicis illa conferre depræhendantur parari: solutiones etiam margaritarum, corallorum & aliorum lapidum preciosorum plurimum profunt. Vinum cydoniorum multum etiam, confert, præsertim alvi fluxu conjuncto.

His medicamentis progrediendum est ad quartum usque. Neque vena secanda nisi vel summa plethora vel humorum putredo urgeant.

Atqui cum omnes morbi sua habeant tempora: observavi à quarto usque ad septimum plerunque incrementum morbi esse: in nonnullis ad nonum aut undecimum, pro modo scilicet infectionis, & analogia temperamenti ad venenatam infectionem. Ideoque necesse est, nos in incremento omnibus enarratis strenuè cum ægrotante contra morbum pugnare: & crisin si qua fortè eveniat, solerter juvare. Modo alvum clysteri subducendo: modò signis coctionis apparentibus leniter evacuando per cassiam cum rhabarbaro, vel decoctionem ex myrobolanis citrinis, fol. sennæ rhabarbaro, manna & cordialibus: omnibus scammonitatis & validdè ducentibus diligentissimè vitatis.

Rectè etiam fecerimus, si loco aquarum cardui, tum pro siti (quæ tamen sub initium rarò comitatur) tum pro expellenda malignitate & moderatè refrigerando, exhibuerimus emulsionem sem. cardui benedicti, cardui Mariæ, & si alvi fluxus jungatur, melonum ex aqua cardui factam.

Hisce

Hiscē ita progressus fui ad tempus status, quod plerunque incidit in nonum vel undecimum diem aut decimum quartam: sæpè etiam maturius vel tardius, pro conditione ægrotantis & malignitatis magnitudine ingruit. Atque tum observavi Crisin futuram, ea autem sive bona sive mala fore mihi videretur, eventum prædixi. Interim tamen nihilominus remediis prædictis institi; verum ita, ut pro aquis vel juscula cocta ex carne, pullis aut similibus cum succo citri & cardui, loco digestivi, & pro re natâ, atque symptomatis etiam diversimodè affligentibus, alia atque alia exhiberem.

Tandem crisi factâ, & morbo declinante, imperavi quietem, perrexī expellentibus reliquias criseos aut promoventibus crisin, veluti cucurbitulis, lotionibus & similibus, sæpè etiam evacuantibus.

Symptomata, qualia sunt fluxus alvi colliquativus, dolor capitis, delirium (quod svave & placidum est) linguæ scabries, sitis (quæ in augmento morbi accidit) fluxus sanguinis narium, vigiliæ non aliter atque in aliis febribus pestilentibus aut malignis tractavi. Tria tamen maxime observanda sunt, nempe capitis gravitas, tussis & demum dolor juncturarum: Hæc cum sint supervenientia & comitantia crisin & decrementum morbi, peculiariter etiam secundum artem medicamentis tamen venenositati adversantibus, tractari debent. Maculæ verò erumpentes tali oleo ad superficiem trahuntur:

Recip. Olei chamomelini

Amigd. amar. ā ʒs.

Scorpion. ʒs

Nitri pulverisati ʒiij

Aq. chamomel. ʒj

Coquantur ad consumptionem aquæ, & postea inungatur totum corpus.

Victus ratio conveniet cum victu febrium pestilentium: ideoque hic nihil dicendum, hoc saltem observandum, quod cibus pro temporibus paroxysmi, in hisce febribus contingentibus, bis de die exhiberi debeat nempe manè circiter horam nonam, & vesperi paulò ante quartam: in quo tamen oculi convertendi sunt ad conditionem cujusque ægrotantis, quæ alios morbos cum hac febre complicat. Atqui cum loco digestivi juscula ex carnibus vel pullis contusis, aut coctis, aut hoc oleo paratis alteratisque supradictis remediis sæpè exhibeantur, modus etiam cæteris statui poterit. Vinum nullum stante morbo exhibendum, sed potus aquæ hordei aut Julep tale:

Recip.

Recip. *Aceti vini acerrimi ℥iij*

Acetositis citri ℥is

Saccari ℥iij

Aqua hordei cocti lbij

F. s. a. lulapium, cujus aciditatis pro voluntate aegrotantis ve-
augeri vel minui potest.

Aër sit temperatè refrigerans, vel naturâ conclavis vel arte. Nempe irrigationibus & sparsionibus florum refrigerantium aut similium herbarum. Excedens verò aër in frigiditate neutiquam convenit, adeò, ut neque sine noxa aër apertus, quamvis nobis satis calidus videatur aegrotantem ambiat. Sæpè enim observavi morbum jam declinantem ex aëre ambiente ad suam malitiam rediisse, nonnunquam recidivam excitasse. Cujus rationem si audierimus, tantò facilius rectè monentibus obsequemur, quantò majus est malum, quod inde nascitur. Est autem ratio hæc : in hujusmodi febribus natura malignitatis expulsionem, ut ex petechiis seu maculis liquet, perinde ut in papulis & morbilis ad superiora molitur, quæ excretio, quantum fieri potest, à medico remediis sudorem cientibus promovetur : at aër ambiens contrahit sic poros, venenositate expiraturæ vias claudit, adeoque hoc efficit, ut malignitas retrocedat ad cor, & incendium augeat : ideoque recuperandæ valetudinis cupidi, non minus liberum aërem in his febribus, quam in morbillis & papulis noxium vitabunt.

Quiescant quantum possunt : si dolor sit jucturarum, aut punctiones in articulis, inunctione olei chamomelini & amigdalarum amararum sedetur.

Evacuetur consilio Medici pro tempore morbi, non tamen sit alvus pigra, sed vel levi clystere, vel suppositorio irritetur.

Somnus non erit negligendus, si sit naturalis, quamvis autem in hac febre accidere soleat quidem sopor præter naturam, tamen adeò magnus non est, nec quicquam mali inde emeruisse memini, præter gravitatem capitis & tussim, de quibus supra. Sæpè tamen conjunctâ cum hac febre, synocho putridâ, gravis sopor accidit. Qui pro more isto etiam erit tranctandus.

De animi affectibus omnibus in hoc morbo constat, quod neque tristari neque irasci, sed bono animo esse debeant & firmâ spe.

CONSILIVM XLIII.

DE FEBRIBUS LENTICULARIBUS.

Cum Iterum Febres illæ venenosæ. Quas ob indolem pravam malignas, ob symptomata pestilentes vocant, aliquot ante septimanas tantâ violentia grassari cæperint, ut paucos intra dies ab ultimo puto Augusti, usque ad 10. Septembr. summo cum terrore & stupore ferè innumeros invaserint, officii mei ratio & utilitas publica exigere videbantur, ut febrium harum naturam, signa, nec non præcautionis accurationis rationem perscriberem; eò fretus spe, ansam me scripto hoc brevi & tenui præbiturum doctioribus quò penitus febrium harum naturam introspiciant, & remedia, si quæ fortè naturæ morbi convenientiora ex usu Artis & Methodo teneant, utilitati publicæ non invideant, meque, si alicubi à scopo aberrare visus fuero, in viam reducere non graventur. Etsi autem longiorem de febre hac meditatus eram & pænè absolveram disputationem: attamen præceps & inopinatus mali insultus eam anticipavit. Ex brevi tamen hoc tractatu tantum utilitatis percepturos esse plærosque, ut & malum prævenire, & divina auxiliante gratiâ, maturè ab eo liberari possint, spero. Pleniorum autem disquisitionem differam, donec de aliis morbis contagiosis, maximè autem peste, peculiarem, volente DEO scribam tractatum.

*DE APPELLATIONE NATURA ET ORTU
HARUM FEBRIUM.*

Multi Medicorum in eâ sunt opinione, febres has Veteribus planè fuisse incognitas, ideo novum eas & inauditum morbi genus putant, & peculiaribus nominibus febres lenticulares, pestichiales, & peticulas nominant. Sed diligentius intuenti apud Aetium ex Herodoto, Rhasin, Jacobum item de partibus, earum fieri mentionem patebit. In Germania morbus Hungaricus, cum quo ferè febris hæc convenit, vocatur: Nostri die Hauptfrancst, capitis morbum appellant. καὶ ἰξοχλω, eò, quòd capiti maximè molestus & infestus esse solet. Aliqui puncticularem, das bunte Sieber, ob puncta, quæ extrinsecus, ut in morbilis, apparent plura, appellant. Ut ut autem indigitemtur, venenosas eas malignasque esse febres certum est, à peste tam quoad naturam, quàm symptomata non multum deflectentes, imò sæpè in eam degene-
ran-

rantes, hoc tamen discrimine, quòd non æquè ac pestis, lethales. Si modò rectè eis prospiciatur. Cum nostris a. loquens capitis morbum eas vocabo, eò, quod capitis molestias maxime accusent ægri, & rarò hodie appareant maculæ, longè, quàm alias, terminentur citius, & quod sic, de quo adfectu sit sermo, evadat manifestius.

Scire igitur, quid malum hoc sit, satagenti, respondeo, esse febrem venenosam, contagiosam, quæ invasione præceleri, & symptomatis horrendis pestem imitatur, interdum cum punctis pulicum moribus non absimilibus, variorum colorum rubris, lividis, viridibus, nigris, hærentibus intra cutem & carnem, citra tumorem, exulcerationem, mortificationem, pruritus & sudorem: interdum sine punctis aut maculis, quod hodie ægris accidit plærisque. Minera macularum est in sanguinis ichore & sanguine tenuissimo, in venis tantum exilibus, nisi ipsa massa sanguinea sit impura & ad recipiendum fomitem disposita. Hinc calor ut plurimum in partibus externis, rarò internis percipitur, & caput maxime atque cor infestat.

Causa externa.

Primordia febris hæc ducit ex aëre impuro & infecto, qui sanguinem tenuem & spiritus in corde & cerebro inficit, & putrescere inimicamque induere naturam facit. Hinc iidem operationum & virium ante existentes authores, eas collabascere patiuntur. Aërem inquinatum quod attinet causæ ejus parum ex Astrologorum scriptis petendæ partim constitutioni aëris insolitæ & inæquali sunt adscribendæ. Quæ si cui minus obversatur, is repetat memoriâ frigus illud immane & intolerabile, tempore quadragesimali, quo multorum capita ita læsa, ut etiamnum tussi divexentur, & non parum secutura tabes sit metuenda. Constitutionem etiam aëris inæqualem fructus hominibus pariter & brutis noxios anni elapsi experientia satis nos edocuit, ut adeo mirum non sit, sequi febres pestilentes, morbillos, variolas, &, quam Deus clementer avertat, pestem.

Causa interna.

Inter causas internas primas sibi vendicat ichor portio sanguinis tenuior, quæ ob hausta ex aëre veneni semina eò promptè procedit malignitatis, ut ad alendum corpus planè fiat inutilis. Alias hic recensere causas opus non est.

Differentiâ.

Differentes autem istæ sunt febres, Interdum n. cum ingenti calore interno & ardore cordis infestant, interdum sine insigni aliquo calore inter-

interno. Sed externo, qui quidem hodie adpatet maximè: Aliquando cum jecoris inflammatione & symptomatis aliis gravibus quod videre fuit paucos ante annos in Ungaria, Affrica & hisce nostris regionibus. Hinc haut tardo pede secuta est pestis. Aliquando eundem, quem petechiales sortitæ sunt eventum & terminum. Hodie ut plurimum intra 4. raro 7. dies finiuntur, nisi ob massam sanguinis, propter symbolicam dispositionem, infectam dominari cæperint.

Maculæ non unius sunt generis aliquando exiguæ, ut pulicum morsus; aliquando majores monetam triobolarem æquantes, nonnunquam totum dorsum & artus fædant.

2. Aliquando sigillatim apparent aliquando coacervatim per totum corpus excepta facie disperguntur.

3. Figura aliis est rotunda aut oblonga; aliis angulosa.

4. Color aliis ruber, aliis ex albo aut purpureo flavescens, lividus viridis aut niger.

5. Aliquando una post alteram; aliquando omnes simul & semel se ostendunt.

6. Non certo febris die accidunt. Jam enim in ipso febris insultu; jam tertio vel quarto die, aut tardius, aliquando, in ipso demum statu efflorescunt: aliquando cum natura coctionem aggreditur, sæpe ante, quàm coctionis signa appareant.

Durationis tempus diversum est. Aliquibus enim statim, quibusdam cum ipsa demum febre disparent, nonnullis non quidem statim, ante tamen febris solutionem evanescunt.

Ultimò etiam alia cum his conjunguntur symptomata, alvi profluvium aut obstructio. Item vomitus. Quæ omnia benè sunt observanda.

Signa.

Ut autem sine mora, & ante quàm invalescat, morbo occurri possit, signa, quibus tam in principio quàm reliquis temporibus possit dignosci, tradam.

Signa antecedentia.

1. Adest fastidium 2. totum corpus maximè pedes quasi fracti languent, moerore ac somniis turbulentis divexantur. 3. Accedit his cordis palpitatio 4. adest cephalalgia, vertigo. 5. Respiratio crebra thoracis compressio. 6. Tussis sicca. 7. Pleuridis. Symptomata hæc si hominem ante sanum præhenderint, is maturè sui rationem habeat, aliàs vapores venenosi cor & cerebrum (quæ maximè in hoc morbo adficiuntur) petunt, & inficiunt in eis sanguinem & spiritum.

Principium morbi.

8. Hinc oritur frigus & horror internorum magis, quàm externorum. Hæc excipit calor primò quidem mitior, sed subinde sumens incrementum, qui in nonnullis in externis maximè partibus percipitur.

9. Tum demum cor palpitāt vehementer, vapores venenosi omnia membra penetrant, eaque virium robore spoliata prosternunt, inprimis autem pedes pungendo excruciant. Hinc ægri

10. Plarumque dorso inquietè & incompositè incumbunt, huc & illuc volutantur, manus & pedes tremunt. Inde

11. Cum vapores maligni caput replent capitis dolor augetur, Somnus amittitur.

12. Aurium sonitus percipitur, & ut plurimum quarto die fiunt loquaces, & febris cessat, aut

13. Erumpunt rubræ, lividæ aut aliter coloratæ maculæ, primò in dorso thorace, deinde in brachiis & toto corpore, excepta facie. Figura, ut color macularum eadem non est, ut inferius docebitur. Maculis his interdum totum corpus florescit aut livescit.

14. Oculorum vigor concidit, rubescunt &

15. Quasi aquescent, facies calore intumescit.

16. Lingva & labra fiunt flava, & nigra, impura & rugosa, halitus gravis.

17. Nonnullos sopor tam profundus obruit, ut, nisi excitentur, dormientes expirent.

18. Aliqui parùm, aut planè non sitiunt, aliqui vehementer.

19. Quibusdam alvi profluvium, quibusdam ejus obstructio accidit, quibusdam vomitus biliosus & amarus, aut pituitosus.

20. Urina clara est Sanorum similis. Post turbida crassa & cruenta fieri solet.

Morbi Status.

Aliqua hæmorrhagibus supervenit. multis tumores & bubones sub aliis, & aliis locis consuetis protruduntur. Quanquam hi hæcenus non apparuerint. Aliqui epilepsia corripuntur. Quibusdam die nono, undecimo & aliis diebus criticis sudor largus prorumpit, a. frigus eos invadit. His materia maligna è corpore propulsa disparet.

Non autem omnium, quæ recensuimus, signorum concursu opus est. Sed aliqua & præcipua adesse sufficit.

Signa Prognostica.

Signa enumerata non solum in morbi cognitionem nos deducunt, sed ejusdem evendum præsagiunt.

Bonum ergo.

Ægrum adhuc viribus constare, de morbo, capitis sc. dolore, langvore & artuum dolore non admodum conqueri.

Integra uti ratione.

Sumto medicamento corroborari & malum mitigari.

Vomitu aut alvi profluvio allevari.

Maculas subito prorumpere, sine virium lapsu, & cum febris mitigatione.

Macularum eruptione alvi profluvium aut vomitum sisti.

Maculas esse rubras, & non admodum magnas.

Post 4. 7. 9. 11. & reliquos dies criticos remissionem quandam ægrum percipere.

Urinas ante turbidas, crassas sine nubecula, clarescere & habere nubeculam.

Pulsus fieri validum, æqualem, nec adeo celerem.

Malum.

Maculas coacervatim prorumpere die non critico.

Diu persistere.

Alvi profluvium aut vomitum cum febre aut maculis durare.

Ægrum delirare, & strata vellicare.

Profundè dormire, ut vix possit excitari.

Pessimum.

Ægrum concidere, & frequenti syncope corripì.

Etiā mitia medicamenta sequi alvi profluvium.

Vomitu, ventris profluvio, maculis non allevari, sed ulterius prosteri.

Hæmorrhagia larga nihil juvari.

Maculas sigillatim pordire.

Eisdem subito evanescere.

Maculas esse lividas purpureas, nigras, virides pallidas, sigillatorum vestigia colore referentes.

Esse datas, magnas, ut dorsum aut artus contegant.

Post rubrar. macular. eruptionem morbum ingravescere.

Supervenire epilepsiam.

Bubones & tumores sub aliis & in cruribus, item parotidas gigni.

Urinam supprimi,

CURATIO.

Difficile est scripto adeo brevi mali tam acuti perfectam tradere curationem ob circumstantias & accidentia complura. Videndum enim est, an æger vir aut mulier, puer aut virgō, gravida aut puerpera: an morbus in principio, augmento, statu aut declinatione: an expulsio aliqua à Naturâ facta, & quomodo. Quæ circumstantiæ singulæ curationem variant.

Prolixitatem ergo, quam hæc parere poterant, ut evitem, paucis curationem tradam, non dubitans, me & sic adjuturum plurimos.

In his tribus autem consistit curatio.

Primum est, Rectus medicamentorum usus.

Secundum, Venæsectio.

Tertium, Recta victus administratio.

Cum autem morbus hic malignitate suâ cordi & cerebro insidietur, sine morâ ei occurrendum est. Sic enim maturè profligari potest, cum alàs diuturnus, periculosus & molestus esse soleat.

Si ergo quis dicta in se deprehenderit signa, is statim alvum, si obstructa, aperiendum curet clystere mitiore, quod sic parandum.

Recip. Jusculi galin. insulsi cochlear. XXIV.

Sacchari Thom. ℥ijß

Olei Rosar. aut violar. cochl. vj

fiad clyster.

In defectu jusculi carnis.

Recip. Folior borragin.

Acetosæ.

Eradicæ & Mj.

Rad. Perasiræ ℥ijß

Coqu. in s. q. aqua ad XXIV. cochl.

fiat enema.

Si æger ab enemate abhorreat, sumat potionem lenientem è foliis fenæ, officinar. horis tribus ante cibum. Sequens etiam potio non tantum lenit sed & veneno resistit.

Recip. Pulp. Thamar. ʒvj.

Mirobal. ci rin. Ind. an. ʒß

Semin. Ci ri ʒij

Zedoar ʒj

Folior.

Folior. scordii. cardui ā. p. ij.

Flor. cordial. ā. p. j.

Coqu. in sufficienti quantitate aq. acetos. ut commodè sub finem parum incoqui possit fol. sen. 3ß.

Colatur. ʒiiijß adde

Syrup. rosar. solut. ʒij

vel

Manna ʒiß

M. fiat haustus.

Cui potio displicet, utatur glande supposit.

Cui nec hæc arridet, is sumat Cassiam Elect. lenitiv. diacathol.

Compressiones & compunctiones circa cor & thoracem sentiens, maximè pleurisin, loco potionis sumat Olei amygdal. recens. cochl. ʒʒ. cum aq. card. bened. coch. ʒʒ. Bibat calefact. horis tribus ante cibum.

Apertis ergo naturæ viis, venenum à corde & cerebro omni studio avertatur sudoriferis.

5. Ergo aut 6. horis ab enemate, aut sequenti die, post exhibitam potionem lenientem, potio sudorifera offeratur.

Recip. Torment. ll.

Dictam.

Pimpinell. an. ʒj

Coquantur in s. q. aq. Card. bened. & Acetos.

Hujus

Recip. Cochl. ʒj

Succi Card. bened. aut Scordii coch. ʒj Aceti optimi (præfertur rutaceum) cochl. ʒ

M. sc. fiat potio.

Addatur Mithrid. optim. 3ß.

Aut Theriac. Venetia 3ß.

Sumat calefact. & sudet.

Potionem averfans sumat pulveris sequentis ʒj aut plures pro ut naturæ robustioris, aut imbecillioris est. Ex aqua Card. bened. aut Scordii, aut si adsit calor major cum aqua acetos. Quanquam & supra scriptam potionem absque Mithrid. sumere queat, Pulvis hic est.

Recip. Rad. Tormentill.

Pimpinell.

Dictam.

Terra sigill.

Boli Armeni.

Corn. cer. preparati ā. ʒʒ.

Attendat quilibet, ne usu potionum sudorifer, incalescat nimis. Cum enim urina ægri non turbida aut admodum rubra est. Venenum nondum ad cor penetrasse indicio est. Et tum omnia proposita remedia profunt. Potio etiam purgans secundo & tertio die repeti potest, idque propter celerem morbi motum. Morbus n. in his quarto die finitur.

Urina turbida, crassa, rubra indicio est, non tantum ichorem sanguinis sed ipsam massam sanguineam esse infectam, & unā Epar aut aliud viscus inflammatum, & tum sudoriferis refrigerantia sunt miscenda, ut.

Recip. *Rad. Tormentill.*

Acetos.

Dictam. albi.

Pimpin.

Zedoar. ā. ʒʒ

Sem. Endiv.

Acetos.

Berb.

Citri. ā. ʒʒ

Santali citrini. ʒj

Herb. Card. bened.

Scord. p. j.

Capill. Vener. Mss.

Lent. bis coctior. ʒʒ

Lacca ʒiij

Flor. Borrag. Viol. an. Mss.

Coq. in s. q. aq. Card. bened. & Acetos. ad Conthar. ʒ.

Hujus Rec. cochl. vij Adde

Succi citri

Acetos. an. coch. ij

Boli Armen.

C. C. preparati. ā. gr. X.

F. potio sudoris.

Antequam potion. sumat. Diascord. Fracastorii ʒʒ aut ʒj cum Camphor. gr. j. (aut hujus loco Mithridatii vel Theriaca veteris) in portione dicta, aut hujus cochleari j. solvat & bibat.

Potionem sumat. 4. dieb. continuis Mithridat. verò aut Diascordium alternis misceat diebus. Interim aut morbus evanescere videbitur aut macu-

maculæ adparebunt, quod tamen hodie ob minorem malignitatem rarum; aut alia morbi apparebit facies.

Pauperiores sumant succi ex acinis sambuc. ʒij in aqua flor. sambuci. Aut coquant semen rapar. albar. cum aq. rap. alb. bibant coch. aliquot calida.

utiliter etiam ʒj

Mithridat.

Theriace aut Diascord.

Fracast. ex aceto lilior convall. admisto pauco C. C. usu uti possunt. Ditionibus unicornu præscribi potest.

Inprimis autem Lapidis Bezoar gr. iij. iv. aut v. cum aqua acedosæ exhibita egregie sudorem provocare & vapores malignos reprimere observavi.

Si quis dicta remedia vomitu rejiciat, secunda aut tertia vice, donec deinceantur, exhibeantur.

Hujus generis remedia alia sunt complura quibus quis, pro ut Experientia est edoctus, uti poterit.

Sudor ubi sat diu stetit detergatur, aër autem frigidior prohibeatur. Æger confortantibus & vapores malignos à corde arcentibus reficiatur, Huic rei inserviunt. Rotulæ confortativæ, quæ sic appellatæ in officinis reservantur, quæ semel aut bis quotidie exhiberi possunt. Si siccas respuat, dissolvantur in aqua Card. bened. acetosæ aut scabiosæ.

Profunt etiam manus Christi perlatae, Diamargar. Elect. de gemmis. Loco rotular possunt etiam sacchara corroborantia, sic officinis præscripta, dari. Aut ex saccharo rosaceo acetosæ, borrag. violaceo. Cerasis conditis succo berber. Coral. Cortic. Citri conditis confortans concinnari potest, adduntur Margaritæ præparatæ. Magnates smaragdum contusum addere possunt. Hic enim a multis in morbo hoc commodatur.

Vehementer sitientibus aqua caponum cum saccharo rosar; acetosa condita, destillatione extrahi potest, aut etiam Julepus parari.

Recip. Succi Citri cochlear. ij

julep. rosar. cochl. iij

borrag. cochl. iij.

Margarit. præparat. ʒjss

Aq. Borrag. & acetos. ā. cochl. xx.

Huc pertinent omnia confortantia, quæ in febribus pestilentibus calidis exhibentur, & à pluribus descripta habentur.

Inter reliqua hoc pro corde mihi placet. Si recipientur.

Margar. preparat. ʒj.

Smaragdigr. v. aut. vj

Cum aqua Scabiosa aut si femina sit, cum aqua Melisse & Acerosa.

Quod si maculæ (ut hodie fit plerumque, dum & febris ipsa intra quatuor, septemvè dies ob malignitatem minorem terminantur) absint consultum esset, calori si augeri videatur, extrinsecus undiquaque valide resistere, quod assequemur aquis pro Corde & Epate præscriptis. Pro Corde autem.

Recip. Spec. cord. temperat. ʒß.

Corallor. rubror. ʒij

Santali rubri ʒj

Croci gr. X.

Vini Matvatici cochl. iij

Aceti Vini acerrimi cochl. jß

Aq. Scabios.

Rosari

Horrag.

Italica & Germania ā. coch. viij

Misc. pro Epithemat. Cordis & puls.

Pro Epate sic hæc.

Recip. Santali rubri. albi, citrin. ā. ʒj

Spodii de Ebore ʒß

Spica gr. X. Aq. Portulacæ

Cichorii.

Endivie ā. cochl. viij

Aq. absynthii Roman. coch. j

Miscæ.

Intingatur pannus cæruleus, imponatur lateri dextro sub costis nothis.

Qui aquam hæc ob precium majus habere nequit: is recipiat cichorium recens, incidat minutim, conterat in mortario cum aq. cichorii, succum exprimat.

Hujus accipiat coch. x. & addat aceti Vini coch. j. intingatur pannus, & applicetur, ut dictum:

At si propter maculas aquæ hæ applicari nequeant, inungantur præcordia hoc unguento.

Recip.

Recip. *Mithrid. veteris optimi* ʒj

Unguenti Santalini ʒvj

Spec. cord. ʒj

Diamarg. frigidi ʒß

Croci gr. X.

Cum acetosaceo fiat Unguent.

Eadem ratione & pro Epate in officinâ unguentum præparari curavimus.

Et ut undique calori resistatur, inungantur lumbi unguento pro lumbis facto, item dorsum ab osse sacro, ad claviculas usque unguento, dorso dicato.

At si calor internus urgeat, & sanguis ferveat non incommode à prandio hora tertia potio refrigerans offerri poterit, facta ex succo Citri, Endiviæ, Acetos. Nymphææ cum aq. Endiv. Acetos. Cichor. aut aliàs temperamento ægri respondentibus. Addenda est portio C. C. ulsi magnitud. V. pisor. Die sequenti detur potio sudorif. simul refrigerans, quam ante docuimus, quò virus à corde versus exteriora propellatur, & morbus abigatur.

Tempore pomeridiano refrigerans iterum, quam præscripsimus supra, potio propinetur. Tertio die si usus exigere videbitur, eadem administrabuntur remedia. Interim confortantia minimè negligenda sunt; sed subinde aut rotula una, aut sacchari confortativi, aut conditor. dictor. portio exhibeatur. Si morbus tertio aut quarto die non evanescit ad septimum, undemum, aut ulterius protrahitur.

Et tum dispiciendum, an natura maculas expellat (quæ rarius hodie adparent, quòd malignitas maxima ex parte hæreat in tenuissimo sanguine, qui putrefactus ratione tenuitatis non adipiscitur lentorem adeo tenacem, ut cuti adhæreat.) Quod si enim natura id conetur, adjuvanda est, ut inferius docebo. Quod si intra quartam diem nullæ adpareant maculæ, calor non remittatur, urinæ sint turbidæ & rubræ, non in conveniens fuerit, ægro venam secare. Iis tamen observatis, quæ inferius tradam, aliàs Venam secare in malo hoc acuto lethiferum potius quàm salutiferum est.

Cum vero naturam morbo acriter resistere videmus, non securi interim esse debemus, sed operam date, quo reliquiæ sanguinis infecti, quæ tussim, compunctiones & quasi contusiones in artubus, destillationes item foveant & movent, purgante mitiori exturbemus, quod singulari cum judicio faciendum. De eo heïc tractare supersedeo.

Venæsectio.

Cum morbus hic mineram in sanguine tenuissimo habeat, non ipsa autem tota massa sit infecta, admonitos volo quosvis, ne facile sibi venæsectionem persuaderi patiantur. Hac enim attestante Fracastorio plurimi in hoc morbo jugulati sunt, attracto sc. veneno per venæsectionem ad cor.

Quando autem urina est turbida, & tota massa sanguinea infecta, jecur etiam inflammatum, tum Venæsectio differri non debet, maxime in homine sanguineo. Cum autem hic errari facile possit, cum Medici consensu, Venæsectio ? instituenda.

Loco Venæsectionis cucurbitulæ cruribus, genuum flexui & femori cum scurificatione applicari possunt.

Symptomata.

Supra, non solum morbum curandum, sed & Symptomatum (quibus pestem febris hæc imitatur) diligentem habendam esse rationem dixi. Absque hoc enim, quod unâ manu extruitur, altera destruitur. Breviter ea ergo recensebo.

Macula.

Hæ cum apparent, promovendæ sunt : intrinsecus potione sudoriferâ & simul efrigerante : extrinsecus oleo sequenti, in quo pannus madefiat, eoque totum corpus bis de die fricetur. Oleum sic paratur.

Recip. Olei amygd. amarar. dulcium, aut
chamomæli cochl. vj

Nitri contriti Zij

Aq. flor. chamon cochl. viij

Coq. ad aquæ consumptionem.

Interdum oleum amygdal. dulc. & chamomæl. miscetur prout usus requirit. Aliqui ad faciliorem Veneni extractionem addunt oleum scorpionum, quod idem præstant cucurbitulis pluribus corporis locis adhibitis. Textura serica rubea strate imposita etiam maculas promoves. At, cum rarò appareant, non plura de eis scribo, redituras tamen eas metuo, si præsens aëris constitutio aliquandiu duraverit.

Cephalalgia.

Huic medentur cucurbitulæ scapulis admotæ, ut femori & genuum flexui. Sic enim dolor manifestè trahitur deorsum. Hoc qui facere veretur, aqua pro Epithemate in officina præparata utatur, aut sequenti emulsione dolorem potenter sistente.

Recip.

Recip. *Aq. Verbena. Betonica.*

Flor. sambuc.

Solan.

Rosar. a. coch'. V.

Amygdal. am. ar. aut nucleor.

persuor. ʒjss

Papa veris albi 2. capitib.

F. Emulsio & capiti circumvolvatur.

Multi brassicæ albæ caput diffecant, & cervici applicant, tollit calorem & dolorem. Potentius idem præstat raphanus contusus, cervici, plantis pedum & brachiis impositus.

Vigilia.

Somnum ut concilies, exhibe lac amygdalar. dulcium, aut papaveris aqua rosacea abluti aut sequentem potionem soporiferam.

Recip. *Caput. papav. albæ integrum.*

Lactus. Ital. Mj

Acetos. Mss

Dactylos enucleatos n. ij.

Coqu. in s. q. aq. ad cochlearia viij.

Adde si adsit tussis, Succ. Violar. pro succo papav. propina agro calefact. dormituro.

Consultius autem est exhibere jus gallinar. in quo lactuca bullierit, loco potion. refrigerantis. Possunt & folia lactucæ Italicæ capiti imponi. Extrinsecus adhibentur unguenta opium habentia, quæ tamen cautè usurpanda. Hæc in officinis habentur.

Inservit etiam scopo huic lotio pedum & capit. *papav. alb. n. XX.*

Solan.

Fol. viticis

Salicis rubr.

Populi an. M. ij

Flor. Chomomel.

Anethi an. Mj.

Coq. in s. q. aq. repleatur vas, cui ager pedes ad genua usque immergat.

Lotio hæc somnium conciliat, & dolorem deorsum trahit.

Paretur etiam nodulus, qui in aquam rosaceam intinctus ægri naribus sæpius admovetur, talis quidem.

Recip. *Cortic. Rad. Mandragoræ ʒj*

Semin. hyoscyami albi ʒj

Fol.

Fol. rosar. rubr. p. j.

Nuc. mosch.

Caryophyll. an. 3ß

F. nodulus, quem in aq. rosar. intinct. olfaciat.

Multā aquam hyoscy. capiti circumvolvunt, quod, si acutè fiat, i calore ingenti concedi potest.

Sopor profundissimus.

Sæpè accidit, ut æger sopore profundissimo obruatur, & tum modis omnibus excitandus, alias dormiendo exspirat, aut tumor frigidus, nisi jam adsit, oritur in capite. In hoc casu omnia soporifera amoveantur. Econtra piper tritum cum aceto Vini naribus instilletur, ad sternutationem provocandam. Aut,

Recip. Colocynth. gr. X.

Castorei ʒj

Capillor. humanor. combuster. gr. XV.

Adde aq. Sampsuchi. in qua bullieris calamintba

Instill. egrī naribus.

Prodest etiam vesicator: ex fermento cantharid. & aceto Vini, & sinapi juxta aures. Glandes etiam & clysteres acres injiciantur, ut materia à capite revellatur, aut fiat fomentum pro capite. Sed de hoc alias. Et si eo opus, consulatur Medicus.

Angina.

Lingva & fauces à calore interno & vaporibus flavescent. nigrescent siccantur, rugantur & squalida fiunt. Vulgus symptomat. horum concursum anginam vocat, quasi peculiaris esset morbus, cum tamen symptomata sint morbi hujus maligni. In hoc casu ferè omnes se medicos profitentur. At cum experientia testetur, quàm miserè cum multis, dum hæ oris sordes erant detergendæ, actum sit, hoc tantum monebo, linguam cautè esse radendam. Multis enim lingua rubescit, non quod naturâ talis, sed quia cautis detracta. Optimum ergo est sal ammoniac. lingvæ affricare: & aqua atque aceto Vini os colluere. Aut paretur gargarisma.

Recip. Succī Moror cochl. iij

Vini è Punic. cochl. iß

(pro hoc substituitur moror, succus)

Rob. de nucib. cum tussiant,

Aq. rosar.

Plantag. an. coch. vj. M.

Com-

Commodè etiam tum lingua unguento hoc inungitur,

Recip. *Oxymel. cochl. iß*

Sinapis albi crasso modo contusi gr. v.

Glycyrrhiz. rasa gr. X.

It. facculus cui nuclei cotoneor. infusi, aqua imbutus ori indatur.

Scapulæ scarificentur, Venæ sub lingua, urgente necessitate, aperiantur. Satiùs tamen erit calori interno recurrere, à quo symptomata hæc pendent.

Epilepsia.

In morbi vigore, dum periculi omnia plena, epilepsia, maximè pueris supervenit. Hic etiam periculum in morâ. Plærumque enim apoplexia & tandem mors sequitur.

Sequentia ergo remedia ægro instilletur.

Recip. *Succi Peoniae cochl. ij*

Aq. è flor. tilia

Cerasis nigris an. cochl. iij

Mis. & bibant.

Parentur etiam unguenta gingivæ affricanda.

Recip. *Oxymel. scyllit. coch. ij*

Speci diamos. dulc. Zij

Succi ruta parum.

Aceti rutacei coch. ß.

M. & inungv. linguam & gingivam.

Pentaphyllum etiam omnibus ægri cibis incoquatur.

Sitis.

Siti vehementi medetur lactuca Italica condita & ore detenta. Cerasa, Persica, Aurantia, Granata, Ribes conditi. Succus cerasor. in aqua Card. bened. & acetosæ dissolutus.

Inprimis tussi validè hæc resistit potio.

Recip. *Aqua acetabula vj. & Zij. & Zij*

Aceti Vini acetabula ij. Zij. & Zij

Sacchari lib. ß. dissolvatur & bulliat,

despumetur, & refrigeratum coletur. Re-

servetur in cella & bibat.

Si alvi profluvium adsit offeratur emulsio melonum de nucleis melonum, & aqua acetosæ.

Prodest & aqua hordei, cum succo citri.

Qui gelidum bibere consuevit, aquam fontanam puram in qua portio panis tostii macerata, & cui parum aceti vini admixtum sit, bibere posset.

Pauperes serum caprini, aut alius lactes bibant.

Infantibus concedit Aetius lib. 4. c. 140. lac, cum quo tertia pars aquæ ad dimidii consumptionem cocta sit.

Pleuritis.

Propinetur oleum amygd. dulc. cum aq card. bened. aut Vesicam oleo, chamomæl. aut aliis oleis impletam lateri impone.

Tussis

Ferina, sicca & difficilis est. Dentur ergo materiam incrassantia, ut syrupus de papavere, de Ros. ficcis, succus viol. succ. de jujubis & spec. Diatraganthi frigidi. cum C. C. usto & Bolo Armeno. It. rotula de succo Scabiosæ, & similia.

Alvi profluvium.

Hoc non statim sistendum, sed per biduum, aut diutius etiam, nisi vehementius sit, finendum. Sic enim materia maligna evacuetur, purgante aliàs educenda. Attendendum autem an æger hinc allevetur, nec ne. Quod si enim ulterius prosternatur, fluxus Symptomaticus est à colliquatione viscerum, inprimis epatis.

Post materiæ ergo malignæ evacuationem statim est cohibendus. Omnes ergo aquæ, quibus ægri cibi coquuntur, aliquoties chalybeentur. Edat ptisanam hordeaceam percolatam, addatur emulsio melonum facta aqua chalybeata.

Posset in eundem finem lac papaveris albi admisceri.

Paretur etiam nodulus è seminibus Sumach. Berb. acetos. (& ervi) bulliat in cibus, qui ægro coquuntur.

Cum cibo apponatur succus cotoneor. liquidior, in quem panem intigat, item succus berber. Potus sit aqua hordeacea chalybeata, in qua aliquid succi cotoner. Citri Granator. acidor. aut Syrup. de myrtillis Italicis. Syr. de Tormentilla vel Bistorta sit dissolutum, nec noceret haustus largior Vini cotoneor. quod non tantum obturat, sed & fluxum sistit.

Cibo aspergatur pulvis diamargarit. frigidi, tormentilla trita, Bolus Armenus, terra sigillata, succinum. *Profunt rotula è succo torment.*

Electuario cotoneor.

It. C. C. usti 3j

Trochis.

Trochif. de spodio. ʒj.

*Cum aq. Acetos. Card. bened. plantag. myrtillor. fragar.
aut portulacæ.*

Satius autem est fluxum per Urinam revellere ejusmodi potione.

Recip. Rad. Acetosa.

Petrosel.

Gramin. an. ʒß

Nucleor. Melon. ʒj

Glycyrrhiz.

Passul. an. ʒiij

Papav. albi,

Semin. portular. an. ʒj

lujubas.

Sebesten an. N. viij

Citer. rubr. Mß.

Cog. in suff. q. aq. ad canthar. ß.

Recip. Hujus coch. vi. adde Syr. de capill. Ven.

coch. ij. Succ. Citri coch. j.

Utatur potione hac bis quotidie, manè hora quinta,
& à meridie hora tertia.

Totum corpus antèrius & posterius inungatur oleo rosaceo, co-
toneor. Masticis, & imponatur Emplastr. diaphœnicon.

Vomitui.

Nec hic statim est sistendus. Quia natura sæpè materiam veneno-
sam vomitu evacuat. Si autem diutius perseveraverit, ex fermento, ace-
to Vini, & mentha crispacum paucò oleo Mastic. fiat Emplastr. & cum
stupa præcordiis imponatur, sistitur vomitus sine mora.

Quò autem materiæ venenosæ naturam ad vomendum irritanti re-
sistantur. Sæpius ægro de pulvere hoc ʒß ex aq. acetos. in qua Rob.
ribium sit dissolut, exhibeatur.

Recip. Margarit. prepar.

Corallor. rubr.

Bol. Armen.

Terra Lemnia an. ʒj

C. C. usti ʒß.

Si hæc non profunt cucurbitula magna umbilico applicetur.

Satius esset, vomitum abesse, nisi die Critico id accideret, natura
ab humor. malignor. copia sese exonerante. Aliàs vomitus ut plurimum

malum est signum. Observetur: materiam flavam, viridem lentam & albam vomitu rejici, bonum, modo fiat prædicto modo.

Si ne sic quidem vomitus sistitur, materia medicamento lenienti per inferiora educatur. Et si nec sic inhibeat ad Emplastr. è fermento est redeundum.

Singultus.

A materia malignâ Epatis aut lienis inflammatione ortus, utplurimum mortem portendit.

Curatur Margaritis. corall. rubris, Bolo. Armen. pulveri satis cum paucis succo Rib. Citr. Berber. & Vini cotton. propinatus. Alias sumant succi Menthæ crispæ cochl. ij. pulv. supra scripti 3j aut boli Armeni 3j. Si nec sit cedit, materia venenosa clystere revellatur. Later calefactus è ventriculi regione collocetur, ut jam docebo. Si etiam tum perseveret, periculosum est.

Dolor ventriculi.

Sæpè in his febribus ægros de dolore ventriculi conquerentes audi vi, & indecenter sese gerentes vidi. Præstantius autem remedium non inveni, quam laterem leviter coctum, ignire, & aceto vini opt. ac pauca aq. Menthæ extinguere, eundem 2dâ vice ignitum, & solo aceto Vini conspersum & linteo involutum ad dorsum aut etiam ante è regione ventriculi collocare.

Syncope & cordis palpitatio.

Hic occuratur confortantibus supra præscriptis, it: aquis cordialibus & pulsibus dicatis. Paratur etiam nodulus, quem assiduè aquæ rosaceæ optimæ immersum odoretur. Nodulus sic paratur.

Recip. Rosar. Violar. an. pj.

Cinnamon. Agallochi opt. Macis.

an. 3j. incidantur minutim.

F. Nodulus.

Si his non cedat syncope, offeratur ægro portio panis similacei ex vino rubeo, ut & jusculum è caponibus destillatum.

Hæmorrhagia.

In Hæmorrhagia duo attendenda. I. an fiat stillicidium, an verò largum sanguinis profluvium. II. an 1. 2. 3. 4. 5. aut alio die accidat.

Stillicidium bonum non est, maximè quarto die. Indicio enim est, Naturam non sufficere materiæ malignæ expellendæ: aut materiæ copiam, & morbi longitudinem significat.

Quod

Quod si fluat sanguis, & quidem die Critico, 4. 7. 9. & simul adsint signa coctionis in urina, fiat insuper in statu, bonum est, nec sistenda hæc hæmorrhagia, donec æger imbecillior fieri incipiat. Sistitur sequenti Emplastro.

Recip. Cretam pulverisatam, adfunde succum agrest. & acetum rosaceum, ana. F. Emplustr. imponatur recens fronti, aut etiam collo, si opus fuerit, pro exsiccatis recentia substitue. Dissolvatur etiam camphora in aceto rosaceo addatur aqua rosacea, intingatur linteum, cujus odorem excipiat æger.

Recip. Pilor. leporis ustor.

Sangu. Diacon.

Boli Armen.

Gallar. immat. pulveris.

Fiat nasale, quod aqua rosar. agrest. imbutum & pulvere conspersum naribus indatur.

Assumat etiam putionem hanc frigidam.

Recip. Succu Myrtill.

Acetosa an. cochl. iss

Adde aq. portulac.

Plantag.

Equiseti.

Bursa past. an. cochl. iss

At si primo aut secundo die hæmorrhagia oboriatur Stillando aut fluendo malum fit enim symptomaticè. Nam Venæ à sanguine ob venenum & bilem effervescentem acri eroduntur aut propter calorem & exagitationem sanguinis in capite rumpuntur: aut denique ob fractas naturæ vires elabitur. Conjicitur symptomaticus hic effluxus sanguinis inde, quod allevationem æger percipit nullam, calor fit vehementior, augetur delirium, amittitur somnus, & æger moritur, nisi robustioris sit naturæ, & tum morbi longitudo indicatur.

PRÆGNANTIUM CURATIO.

Prægnantes imprimis sui rationem habeant, aliàs facile in extremum vitæ conjiciuntur periculum.

Alvum ergo ut liberam habent, dentoperam, obstructam liberent clystere è jusculo gallin. & aqua, aut glande benigniori.

De Venæsectione hic nihil dico, consulant Medicos, cum hæc etiam aliis vix concedatur. Propinetur ipsis.

Pulvis hic ex aqua Card bened.

Recip. Rad. Tormontill.

Bistort.

Zedoaria.

Margar. præp. an. ʒj

Addatur. Sacchar. cand.

Aut, si nolint pulverem, paretur hæc potio.

Recip. Zedoaria.

Bistorta.

Tormentill. an. ʒj

Coquantur in aq. Card. bened.

Rec. hujus cochlearia vj.

adde Mihradat. ʒj

Margarit. præpar. ʒʒ

Sumant & fudent.

Diæta sit ea, quæ aliis præcipitur ægris, nonnulla tamen præ aliis ipsis indulgentia.

Potiones refrigerantes. Purgantia & reliqua medicamenta, etiam ut reliquis, cautè tamen & cum consilio Medici ipsis sunt exhibenda.

In pueris ætas maximè attendenda est.

Infanti unius anni propinetur nonnihil C. C. usti cum margarit. præpar. ex aqua Card. benedict. aut detur ipsi aliquid pulveris supra dicti. Duorum annorum pueris aut adultioribus detur ʒj cum saccharo cando, & fudent. Ad arcendam sitim bibant Aquam Card. benedict. in qua rotul. confort. una aut duæ sint dissolutæ, caveatur obstructio. De reliquis agendis consulatur Medicus.

DIÆTA.

Diætam morbus hic requirit accuratissimam. Facile enim fieri potest, ut Natura aut cibo obruatur, aut morbi concoctione ad cibi coctionem avertatur. Econtra si Diæta justo tenuior observetur, Natura & à morbo & fame prostermitur. Medium ergo omni studio observari debet.

Ut autem victus rectè administretur, sequentia diligenter attendenda sunt, quando & quoties, quid & quantum sit offerendum.

QUANDO ET QUOTIES CIBANDUS ÆGER.

Supra dictum est. Statim à deteriso sudore aliquid ægro esse offerendum, quod hic non repeto. Attendendum autem, quoties sanus cibari

cibari consueverit. Id enim & jam observandum est. Ut plurimum autem bis id factum est de die.

Et si autem febres istæ continuæ sunt & ad infebricitationem non deveniunt, suam tamen habent remissiones. Hæc nonnulli sentiunt circa meridiem, nonnulli vespertino tempore & sub ingressum noctis. Ministri ergo manè hora sexta, post hora undecima cibum ægris offerant, ut, cum horâ secunda aut tertia febris exacerbatur, Natura morbi concoctioni vacare possit. Hora nona aut decima sub noctis ingressum, cum calor nonnihil deferbuisse videtur, iterum cibetur, sit enim cibus & ægro gravior, & naturæ utilior evadit. Cibi sint concoctu faciles, & ad nutriendum, cum refrigeratione aliquâ, efficaces. Ex horum genere sunt juscula è ptisana hordei; avena, gallinis, carne boum juniorum excocta, aut aqua parata, quæ ægro primis quatuor diebus sufficiunt. Intra hos enim morbus plerumque terminatur.

Si calor sit ingens, ex usu ægri in his bullire poterunt, borragin. acetosæ, Endiviæ folia. Sic enim juscula & nutriunt, & potentius refrigerant. Exhiberi etiam potest jusculum ex amygdalis sine passulis paratum, maximè, si adsit alvi profluvium.

Juscula item efficacia ex carne bubula laudabili, aut carne caponum in vase stanneo parata, (quod artificium faminæ callent egregiè) in syncope & vigore morbi benefaciunt. Ova etiam in aquam affusam, & aceto Vini imbuta (ob tussim tamen acetum vix admittitur) ut & ptisana hordeacea percolata benè & refrigerant & nutriunt. Sic Caro boum, gallinar. junior capon. & avium montanarum, succo Citri, aurantior. aceto Vini, imbui & cum Endiviæ foliis apponi possunt. Gallinar. insuper, aquaticar: caro haut difficilis coctionis. Ova nocte una prius in aceto macerata donec tremula fiant coquantur, eisque guttæ aliquot aceti aut aqua rosarum instillantur.

Cum Ventris adest profluvium, detur jusculum gallinac. cui radices tormentillæ incoctæ fuerint.

Succo item Cotoneor. cum Cerasis cecidis, prunis silvest. exsiccatis prunis acidis. coctis pro embammamate utantur.

Ex usu etiam esset, hic morbi tempora discernere, ut victus iis accommodari posset. Sed tractatus desiderata brevitas prohibet: satis sit monuisse, ægro in morbi vigore sufficere jus gallinar. aut è ptisana avenæ, factum.

Potus.

Sit aqua hordeacea cum glycyrrhica & uvis passis.

M m 3

Potus

Potus è rapis passis & lentibus coctis virus è corpore promovet. Gelidæ, cui aliquid aceti admixtum, aut in quâ panis maceratus, eam bibere assveto, haustus concedi potest.

Divites utantur aq. acetos. Card. bened. dissolvant in his rotulas confortantes, aut parent ex iisdem & aquis Julepuma efficax ? & caro caponum destillata.

Cerevisiæ Eimbeccensis usum mediocrem non improbamus, ac potus diversitatem & copiam planè dissuademus : Aquam tamen hordeaceam bibere solitus inter prandendum haustu cerevisiæ viribus prospicere poterit. Vinum autem planè est vitandum.

Aër frigidus diligenter cavendus, ne pori claudantur & venenum ad cor repellatur.

Conclavia aqua rosacea optima conspergantur sæpius, fiant & suffimigia.

Præservatio.

Hæc poterit eadem esse, quæ in peste ad frigidum tamen magis inclinans. De Victu non multa dicam. Annonæ enim caritas multos multis, à quorum usu aliàs abstinere uti cogit. Divites autem de cibis salubribus etiam non moniti sibi prospicient.

Hoc tamen monebo acidos ut plurimum parari debere cibos. Aspergantur C. C. usto aut bolo Armeno. Assa præferantur elixis. Cum carne tamen elixa & aliis cibis ribes, berber. & uvas immaturas incoquere poterimus.

Medicamenta quod attinet, ea primum aëris requiritur constitutio, quæ vapores vœnenosos cœlitus & aliunde emanantes & exhalantes exsiccet, Cerebrumque & Cor virtute vivificat & odorata recreet. In quem finem in officinis pomum ambræ præparatum asservari curavimus, Nodulum item, cujus odoratus in publicum prodeuntes præservet.

In domo fiant suffimigia tempore pestis usitata. Eadem utiliter fient ex pulvere à me præscripto, cujus ℥j., cum aqua rosar. & acetos. in ollam infusa super carbones locetur. Hinc enim gratus per totum conclavo spargitur halitus.

Eodem modo etiam ex santulo. Item tabulis è rosis, Benza & aliis fiunt suffimigia.

At si vapores venenosi jam ad cor penetrarint, medicamentis internis dissipandi sunt. Quod assequi poterimus morsulis è C. C. quos præ-

præscripti. Dimidium unius manè, & portiunculam, cum alias in publicum prodeundum ?sumendo.


Morbulo, vicem, die altero, tempore eodem, subeat Elect : mei contra venenum portio magnitud. avellanæ major. aut castanæ. Et sic deinceps morsuli & Elect. per vices sumatur. Gravidæ eodem modo utuntur morsulis, pro gravidis, inscriptis. Pueris dentur morsuli & rotulæ liberantes. Os colluatur aqua & aceto Vini, in in quibus bullierint cortices citri, sub lingua teneantur rotulæ.

Proderit etiam per octiduum semel C. C. usti, boli Armen. an. 3ß ex aq. Card. bened. sumere & sudare.

Brevibus hisce plebeculam rudem, cum tam subito lues grassari cœperit, sine cunctatione erudire volui. Plura eademque elaborationa à me alio expectent tempore. Deus nostri misereatur, & benedictionis suæ inexhaustæ imbre largo remedia licita rigare dignetur.

CONSILIVM XLIV.

IN DOLORE CIRCA VENTRICULUM, COR ET PRÆCORDIA.

 Onqueritur Nobilis & Magnus Dominus N. de dolore circa ventriculum, cor & præcordia, adeoque sinistrum hypochondrium. Dolor iste non est simplex sed comitem habet anxietatem quandam vertiginosam, qualis usu venire solet iis, qui cordis, palpitatione nonnunquam simul infestantur.

Etsi verò S. M. non usque adeò eò affligatur, tamen cum malum gravius metuat, maturè præcavere volens, Medicum Cæsareum consuluit. Qui de affectionis essentia & causis adeoque de ratione curandi eâ doctrinâ & solertia scripsit, ut vix amplius aliquid desiderari posse videatur.

Quia tamen Magnus Dominus N. N. arbitratus est, me etiam hac in parte inter cæteros aliquid in commune consulere posse, vel quod plus videant oculi, ut inquit Aristoteles quam oculus, dicam quid mihi videatur, non quod meum iudicium tanti Medici doctissimis decretis anteponere aut opponere velim, sed ut & voluntati Domini N. gratificer, atque etiam muneris mei rationi ejusq; expectationi satisfaciam.

Primum autem dolor dependet à morbo nempe à solutione unitatis, id est à tensione & lancinatione partium circa cor & mesenterium

eâ parte qua situs est ventriculus & splen & sursum ad diaphragma & cor tendit. Dein morbus non solum est intemperies Epatis calida & ventriculi humida & frigida, cruditates & consequenter flatus producens sed etiam fovetur ab intemperie splenis calida, & in esse conservatur morbo in via. Est enim conjuncta obstructio in venis mesaraicis, tendentibus ad splenem, in quibus materia partim melancholica partim cruda & pituitosa, mixta, hærens, incallescere & effervesce caput: cujus caloris actione, præsertim accedente siccitate splenis, perpetuæ fiunt ebullitiones, quas tandem attenuationes & resolutiones in flatus sequuntur. Flatus verò tales, cum proximè accedant ad naturam humoris melancholici, crassiores sunt, & propterea alicujus qualitatis acerbæ & abstringentis participes. Consequenter etiam propter alienam istam qualitatem adversariam cordi, non modò palpitationem qualis hypochondriacâ laborantibus frequens & familiaris esse solet, introducunt, verum etiam intensiones manifestas circa cor, orificium ventriculi & hypochondrium sinistrum exuscitant. Magis autem sinistrum hypochondrium affligitur, quod splen ut dixi, simul affectus sit. Nam cum flatus siccitate magis producantur nemini dubium esse potest, calorem extraneum ex obstructione mesaræi in splene exortum, siccitate splenis flatus frequentiores & copiosiores gignere. Qui facilius eo in loco colliguntur, quo magis ob externos errores est ad suscipiendum laxior & promptior: nam ex effrenibus vomitivis partes circa ventriculum, mesaræum & splenem vehementer tensæ & lacinatæ sunt laxiores factæ, atque proinde flatibus facilius transitum, & transgressis hospitium præbent. Hæc prout vel alienâ qualitate sunt præditi magis vel minus affligunt cor prout verò copiosi sunt, vel crassi & obscuri paroxysmum graviorem longioremque producunt caputque simul perturbant leviq̃ue vertigine tentatur, imò metum atque tristitiam introducunt. Anxietatem a. circa ventriculum graviorem, quanto majore impetu ad eum feruntur: minus verò anxietatis causant, faciliusque omnia symptomata evanescent quando facilius se ventriculus ructuum interventu exonerare potest.

Nec dubium est intemperies istas unâ cum obstructione tam mesaræi, quam obstructione splenis, quæ & à caliditate immodica renum non parum adjumenti nanciscitur, ex errore externo à causa interna profecto, nempe febre maligna primam originem traxisse. Sicut & externæ causæ non modo flatus præbeat initium, sed & in esse eys conservant & foveant.

Hinc indicationes magna induitria à Magnifico Medico commemoratæ

rata, facile suum finem assequuntur, si iis adjiciamus eam, quæ apertionem obstructionum in venis mesaraicis complectitur, atque etiam intemperiem splenis calidam emendat. Nisi enim simul eò oculos diligenter convertamus, cætera frustra tentabuntur, & mitigabitur quidem ex parte affectus sed mox recidiva suos veteres periodos afflictionum vicissim repetet. Inter cætera autem splenis rationem maximam & primariam haberi oportere, inducor rationibus sequentibus.

Primum quidem quod Magnus D. Medicus Cæsareus affirmet in prognosticis suis, melancholiam hypochondriacam metuendam esse; adeoque medicamenta omnia ad ejus curationem dirigat: Melancholia verò hypochondriaca nunquam molesta esse soleat, nisi simul etiam splen afficiatur.

Deinde quia dolor in nulla parte nudè & simpliciter insidet, sed semper vel parti communicatur, vel ex ipsa parte, si diutius duret, fomentum & conservationem sui acquirit. Unde & splenem à generatione flatuum, propter alterationem ex obstructione mesaræi productam, non alienum concludere cogimur.

Tertiò quod crassi flatus ex epatis caliditate & chylo crudo, tenui & aqueo rarò generantur: sed ex materia crassa & lenta & subterrestri cum multo humido tenui & aquoso mixta, quæ in splene & sinistro hypochondrio continetur.

Quartò quod Experientia nos cotidie docet, palpitationes & tensiones hypochondrii sinistri semper ex splene & arteriis vicinis tanquam ex equo Trojano promanare.

Quintò, dolor ipse splenem magis accusat quam Epas, quod magis molestus sit in sinistro quam dextro hypochondrio, quod nunquam futurum esset, si potius à caliditate epatis & frigiditate & humiditate ventriculi ortus sui principium duceret.

Unde indubitato concludi oportebit, non solum vitio primæ, sed & secundæ coctionis, hunc dolorem flatulentum exuscitari: Quippè si primæ coctionis errore solummodo contingeret necessario inflationem ventriculi cum dolore, vel etiam sine dolore, adesse oporteret, atque quidem eo tempore magis, quo prima coctio perficitur. At hic nequaquam tunc temporis molestiam exhibet, sed potius absolutam primâ coctione & plerunque tribus vel summum quatuor horis à prandio, vel manè ante prandium, quando videlicet splen secundæ coctionis excrementum vel attrahit, vel melancholicum humorem ad ventriculum eructat. Tum n. materia in venis mesaraicis per obstructionem retenta,

corrupta & calefacta, movetur, & flatus tùm in vicinia tùm in ipso ventriculo copiosiores exuscitantur, symptomataque omnia de quibus Magnus Dominus patiens conqueritur, pullulant.

Interim tamen inficiari non possum, hujusmodi flatus nonnullis etiam paulò post prandium commoveri, sed tum alii morbi conjuncti, & diuturnitas mali, cum magna copia materiæ ejusdemque corruptione uberiores & singularem requirunt contemplationem & medicationem.

Fiunt igitur pro felici curatione sequentes scopi nobis explendi.

Primum dolor auferendus per ea quæ flatus discutunt.

Deinde obstructions aperiendæ per ea, quæ materiam frigidam flatulentam temperat, attenuent, discutiant, incidant, detergant, expellant tàm in splene, quam in Mesaræo.

Tertiò Intemperies viscerum læsorum emendandæ, inter quæ coctio ventriculi, quæ moderatè calefacientibus, ut rectè monet Medicus Cæsareus, promovenda: caliditas verò epatis & splenis ita attemperanda, ne calor hypochondriorum & venarum mesaraicarum exacerbatus obstructions novas producere, aut aliqua ex parte residuas exacerbare & augere possit.

Quibus ritè administratis & peractis, non dubium est malum ita mitigatum iri, ut vel penitus evanescat, vel si radicitus propter errores externos, qui à S. M. cotidiè per vitæ rationem, (quæ in victu & aliis rebus non naturalibus consistit) funditus tolli non possit, ita tamen atteratur & enervetur, ut ad afficiendum parum momenti sit habiturum.

Quomodo id per Diætam institui debeat, abunde à Magnifico Medico Cæsareo disertum est. De medicamentis nonnihil attingendum videtur.

Nam in Hypochondriaca singularis ratio observanda est in iis quæ purgant. Cum enim obstructio in venis mesaraicis primariam rationem causæ flatuum antecedentis obtineat, nec materia obstructionum mater in venis remotis sed proximis ventriculo sedem obtineat, usu longo didici, quantum fieri potest, abstinendum esse ab iis, quæ ventriculo melestia esse possunt. Sunt autem huic molestiora ea, quæ manè ipsi jejuno offeruntur, cum quod pro sua natura aliundè humores attrahant tum quod ventriculum suâ qualitate imbuendo vehementer perturbent, ut nauseam commoveant: præsertim si sint purgatoria. Nec obstat quod mel rosatum solutivum inter benignissima recenseatur: nam præterquam quod humores pituitosos ex ventriculo feliciter educat, simul etiam

etiam plurimas aquositates ex toto mesaræo trahit, obstructione in venis mesaraicis, propter adjunctam adstrictionem, qua rosæ præditæ sunt, non aperta, sed potius vel relictæ & auctæ, vel materia in venis quidem commota sed non promota. Syrupus similiter de Rabarbaro solutivus aut diasereos solutus cum decocto senæ feliciter quidem aperit obstructions, sed tamen cum ventriculo inde molestia exurgat, minus præstat, quam unicè & anxie satagimus, nempe obstructions in venis mesaraicis non perfectè aperit. Pilulæ aloephanginæ & mastichinæ, ut materiam è ventriculo blande educunt, ita suas vires ad venas mesaraicas & splenem vix extendunt. Sum igitur in eà sententia: fructuosius obtineri posse quod quærimus si præmissis pilulis sequentibus sub lit. A. descriptis, imperemus usum sacculi B. cui affunditur tantum vini vel cerevisiæ, ut sex digitis superemineat; dum stat in infusione, exprimimus bis de die, manè scilicet & vespere. De quo cotidie in prandio exhibetur mediocris haustus, bibendus tum, cum cibo mediocriter assumpto primum siti satisfacere instituimus. Tale medicamentum non solum educit materiam ex ventriculo & epate, sed etiam obstructions in universo mesaræo majore efficacia aperit, attracto sci. à mesaræo potu medicamentofo, qui & sine nausea assumitur, & à natura avidè attractus altius penetrat, & sine violentia propter cibum commissum obstructions expedit, & viscera blande expurgat.

Dum hæc fiunt, tertio die ab usurpata infusione ex nodulo, interponatur dies dictus venæsectioni ea conditione celebranda, quo Dn. Medicus Cæs. consignavit. Erit n. ea pro temporis ratione & instituenda & adornanda. Post venæsectionem sequentibus diebus continuetur usus infusi ex sacculo facti, donec quicquid liquoris superfuit, absorptum sit. Tunc n. iterum dies feriis indicendus: & sequenti manè purgatio instituenda, vel per pillulas ad epar, ventriculum, splenem & venas mesaraicas simul directas, vel per infusionem senæ, rhabarbari, agarici & rad. helleb. nig. styr. quorum descriptio ex subjectis cognoscenda sub literis C. & D. Id tamen diligenter animadvertendum censeo: quod pillulæ nunquam in talibus affectionibus exhiberi debeant longo intervallo ante cibum, propter causam supra à me commemoratam. Unde fit ut semper præferendas putem pillulas potioni vel si istæ non gratae sint ægro, bolum sequentem præscribam. Quæ medicamenta duabus ad cœnam vel prandium horis impero, ut à cibo valida ipsorum attractio (quam plerique in hoc morbo per ignorantiam temporis, qui hujusmodi cathartica exhibent, improbant) & humorum com-

motio perturbatioque inhibeatur, solumque id (quod in ventriculi & venis mesaricis collectum est, obstructions procreavit continetur, & flatus generat augetque educatur.

His ritè peractis, jusculum, in quo species sub litera E. descriptæ, coctæ sunt, ad aliquot dies potandum suæ Magn. dari poterit. Quod equidem intemperiem epatis calidam, ventriculi frigidam & humidam, splenis verò accidentaliter siccam & calidam vim maximam habet: sed cum explurium simplicium concursu, plerumque sapor ingratus & ventriculo admodum nauseabundus resultet. Sum in ea sententia, majore cum commodo & promptitudine D. N. N. nos exhibere posse serum caprinum cum pilulis F. præsertim si ventriculo intrinsecus offeramus Tragæam G. exuscitantem calorem nativum & discutientem flatus. Sic enim futurum esset, ut & quod cupimus obtineamus, & Dominus N. usum medicamentorum minus aversetur.

Si tamen videretur apozema ex radicibus & herbis aperientibus detergentibus & temperatè alterantibus, carminantibusque, præscribendum, illum suo ingenio frui faciliè patiar. Id tamen affirmo infructuosius eum quod cupit effectum daturum. Et quoniam hæmorrhoides semel fluxerunt, opera danda est, ut promoveantur, si non sponte fluant. Est n. earum fluxus adeò salubre remedium ut harum consveta evacuatio sola possit, quicquid hoc est mali, è medio tollere: hoc solum unicè observandum, ut & debito tempore & justa quantitate fluant: Poterunt a. promoveri usu pilularum H. ex aloë sola. vel factarum ex speciebus hieræ aut aloes ʒj cum gr. iiij vel v. euphorbij.

Aqua Mastichina, etsi Manardo adscribitur, ejus tamen inventio non est, sed citatur à Gentili de Fulgineo, ex Magistro Francisco. Quod si aliam habet Manardus, mihi descriptio ejus ignota est. Opinor autem Manardum incidisse in idem exemplar. cum gentili. Hoc autem certum est, quod ista aqua mirificè confortet ventriculum, qua de causa eam in nostra officinâ antehac parari curavimus. Inter cætera verò remedia, quæ forinsecus ventriculi calorem confirmando admoventur, poterunt esse unguenta, quale est quod litera I. est notatum & sacculus K. atque adeò scutum L.

Quæ intrinsecus usurpanda vir Magnificus Consul, ventriculo satis sunt idonea, & poterit ipsorum usus ad tempus continuari. Inprimis autem maximam vim roborandi ventriculum habet Mithridatica confectio, eâ quantitate quam Magnificus vir annotavit usurpata.

Ego

Ego ex oleo piperis & extracto zedoariæ rotulas sub litera M. & N. descriptas alternis diebus usurpandas exhiberem.

Inter omnia autem Medicamenta, quæ hypochondriacam affectionem, radicitus tollere posse videatur, est acidularum cum vino & extracto cardui benedicti: idem enim præstant quod serum caprinum: & memini me multas ad acidulas bibendas ablegasse, qui feliciter restituti redirent. Id tamen unice observandum est in iis, qui non assueti sunt potui aquarum frigidarum, ut scilicet illis stante usu acidularum exhibeantur modo commemorata, quæ ventriculum calefaciunt. Alias enim actuali acidularum frigidityte, ventriculus adeò afficitur, ut aucta intemperie frigida & siccitate, quam acidulæ introducunt, patientes in marasimum ventriculi per imprudentiam præcipitentur.

Pulvis annexus temperatè exiccat & calefacit, maximâ autem ex parte cordialis est, nec vim habet principaliter roborandi ventriculum, multò minus flatus primariò discutit sed secundariò: nimirum materiam tenuem & crudam in ventriculo suâ siccitate cogendo & figendo, quo minus ab extraneâ caliditate epatis, splenis & mesaræi flatus eâ copiâ generentur, ut tensiones & lancinationes causare possint.

Opinor autem S. M. majorem rationem cordi muniendo, & flatibus (à corde per hoc repagulum flatuum & vaporum augmentum, ascensumque cohibens) arcendis habuisse. Ego verò eundem scopum observans, pulverem non modò flatuum discussorium sed & apertorium simul obstructionem, & cordis confirmatorium quantitate ʒj exhibere solitus sum, non minori successu.

Relinquo tamen Domino N. N. aut medicis quibuscvis, quibus hæc legenda exhibebuntur, exquisitiori limâ expolienda.

Epatis alteratio, & venæsectione & jussulis vel sero caprino, perinde ut jam commemoratum est, facile perficitur, ita unguento P. extrinsecus admoto non insalubriter poterit tentari.

Cæterum quæ de confectione Alkermes confecta ex lapide lazuli & lapide Bezoar addunt, cum magis ad melancholiam confirmatam respiciant, nos autem in præsentî casu, in initiis, nequaquam verò in augmento, multò minus in statu versetur, non arbitror ex usu fore. Præsertim cum fluxus hæmorrhoidalis, superioribus mensibus initium curationis felicissimum fecerit.

Quæ cum tantæ sint efficacix in vel curanda vel mitiganda hypochondriaca (veluti supra etiam recensui) ut sæpius solæ sufficiant ad curationem, sum in ea sententia, cordialibus commemoratis non prius

utendum esse, quam fortè (quod tamen nequaquam metuimus) ea, quæ hætenus ex rectâ ratione & natura morbi, solerter & doctâ à Medico Cæsareo præscripta sunt, in cassum exhiberentur.

Imò non opinor unquam opus fore cordialibus singulari studio excogitatis, cum palpitatio in præsentiarum, non sit affectus per idiomata, sed per accidens ex flatibus mala qualitate in mesaræo imbutis & genitis originem ducens.

Ut igitur symptomati non debetur curatio, nisi vim morbi aut causæ præse ferat: Facile manifestum fit, quod non tam laborandum sit de comprimendo corde & arcendo palmo, quàm de tollenda causa puta flatibus in mesaræo genitis.

Laudanda tamen est Magnifici viri sollicitudo qui etiam diligentem symptomatum rationem habere voluit, ut nihil non satis abundè, pro salute Magnifici Domini N. in medium afferre voluisse ostenderet.

Hæc ut satisfacerem voluntati Magnifici Domini N. in medium afferre voluisse ostenderet.

Hæc ut satisfacerem voluntati Magnifici Domini N. N. addere iussit: liberum relinquens unicuique suum iudicium. Id solum affirmans, me nihil aliud spectasse, quàm firmam & stabilem suæ Magnificentię sanitatem: quam ut ei constantem & firmam Pyliamque à Deo optimo maximo precor: ità secundum usum medicamentorum secundam Pancraticamque fore prædicendum esse omninò, statuo.

Recip. *Mass. pil. de biera c. agar.*

Aggregat. ā. ʒss

Dacryd. gr. j.

Cum aq. cicbor. f. pillula A.

Recip. *Rad. cicbor. ʒij*

Scorzonera

Eryngii ā. ʒij

Fenic. ʒjs

Cort. fraxin.

Thamaris. ā. ʒij

Sem. dauci

Anisi ā. ʒijs.

Herb. Veron.

Adiant. nig.

Chamedr.

Ling. cerv.

Card. bened. ā. ℞β.

Fol. Senna Alexand. ℥j

Rad. polypod. quer. 3vj.

Epithym. Cret. ℥ij

Rhabarb. inter. & opt. 3ij

Agar. rec. trocis. 3jss

Cort. helleb. nig. styr. præp. 3iij.

Cinamomi 3jss

Garjophyll.

Zinzib. ā. ℥ij

Ex incis. & contusis f. cum syndone duplici.

Sacculus B.

Recip. Mass. pill. aggregat.

Rhabarb. inter. & opt.

Agar. rec. trocis. ā. ℥j

Ol. anisi gr. j.

Cum aq. Veron. f. pill. n. XLX.

S. Pilula C.

Recip. Rad. Endivia.

Apij

Cichor. ā 3β

Herb. cichor.

Endivia

Agrimon.

Epat. nobilis ā. Mj

Flor. borrag.

Bugloss. ā. pjs

Rosarum rub. pβ.

Sem. anisi.

Fœnic. ā. 3iij

Myrobat. chebul.

Indor. ā. 3jss

Ligni sassafras 3ij

Aloes ℥ij

Cort. lig. sanct. 3β

Spec. rosar. novell. ℥ij

Cinamoni elect. 3j

Ex incis. & contusis

f. species f. pro-lusculo.

Recip.

Recip. *Extract. card. bened.*

Veronica ā. ʒß

Spec. diambra ʒj

Fiant pilula F.

Recip. *Balsami aloes* ʒß

Spec. hiera simpl. ʒj

Euphorbi gr. iij

Cum aq. pimpinell.

F. pillula n. lxx.

S. Pilula H.

Recip. *Nuc. mosch. pul.*

Calam. arom. ā. ʒj

Ol. piperis gr. viij

Anisi gr. iij

Sach. albi soluti in aq. cichor. ʒijs

F. Confect. in rotulis.

S. Rotula M.

Recip. *Extract. Zedoar.* ʒj

Calami arom. ʒß

Ol. carui gr. iij

Corall. rub. ʒj

Sach. alb. soluti in aq. mentha ʒijs,

F. conf. in rot.

S. Rotula N.

Recip. *Ungti ros. Mes.*

Infrigid. Galeni ā. ʒj

Ol. rosac. compl. ʒvi

Camphora gr. iij

Mis. F. Unguentum P.

Reliquorum medicamentorum descriptiones, ut potionis D. Tragæ
 G. Ungventi I. sacculi K. & succi stomachalis L. ex reliquis de Hypo-
 chondriaco malo conscriptis consiliis depromi possunt,
 ideoque hic repetere nefas
 esse duxi.

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD


STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

CONSILIUM XLV.
IMMODERATI FLUXUS SANGVINIS
MESTRUI CAUSÆ.



CONSILIUM XLVI.

IN HYPOCHONDRIACA ET MAGNA
VENTRICULI IMBECILLITATE.

DE Perillustri Domini Comitum adversa valetudine unanimis inter nos est consensus, affligi videlicet illum Melancholia hypochondriaca cum summa ventriculi imbecillitate: hanc a. multis annis, partim quidem à prima origine, partim ex errore in victu: & quia etiam in omni hypochondriaca officium ventriculi per consensum compati solet: illam verò ex causa externa, luctu nimirum & animi moerore immoderationi manifestum initium sumsisse. De curativis intentionibus & remediis etiam nulla inter nos dissensio existit. Utrique n. arbitrati fuimus, Dominum Comitem nullum convenientius auxilium, post viarum communium & pituitæ ex ventriculo evacuationem pillulis vel alio medicamento consveto & familiari factam, usurpare posse, quam aquam chalybis. Quæ cum vim habeat attenuandi, detergendi & expurgandi, tum ex splene quam venis Mesaraicis, humores adustos & melancholicos, & simul etiam vi adstrictoria ventriculum confirmare, alteratrice vero caliditatem in hypochondriis ex diuturna obstructione introductam emendare possit: omnes scopos explere posse existimata est, quibus in curatione Melancholix hypochondriacæ indigemus: adeò ut nullo remedio nec efficaciori nec suaviori talem affectionem debellandam putaverimus.

Quoniam autem ea aqua unâ aut alterâ vice, tam pertinax malum profligare non potest: per intervalla materiam melancholicam medicamento ex rapis & brodio pulli cum intestinis mundatis cocti præparandam, postea usum aquæ chalybeatæ, iterum ad aliquot dies puta octo vel plures continuandum, donec videlicet nulla materia nigra amplius excernatur, existimavimus. Nec metuenda esse symptomata aliqua ex usu hujus aquæ: multiplex experientia & tuta usurpatio multorum, quibus optimè contulit, nos securiores reddet.

Additur insuper & hoc: si fortè quod tamen non veremur, tam efficaci & tuto atque salubri remedio malum rebellius fore & non omnino cessare velle videretur: usum acidularum, tandem quicquid superfluum sit imbecillitatis vel mali hypochondriaci prorsus exterminaturum esse.

Inter cætera roborantia quæ & humori melancholico ejusque malitiæ adversantur & cordi magnum robur addunt, numeratus est lapis Bezoar orientalis, bis vel semel in hebdomate ad grana quinque sumendus.

De Topicis nihil addendum esse visum est: quod prædictorum auxiliorum usu, malum prorsus extripatum iri non dubitamus. Si tamen circumstantiæ præsentis requirere viderentur capitis irrigationem, posset illa pro judicio præsentium Medicorum adornari: præsertim cum Dominus N. N. scripto suam sententiam ante hac ostenderit.

Emplastrum etiam loco affecto videlicet hypochondrio sinistro cum adjecta cautela ne ventriculi orificium attingamus applicari posset. Quibus omnibus ut feliciter & salubriter æternus Deus benedicat, totis pectoribus oramus.

CONSILIUM XLVII.

IN APEPSIA VENTRICULI, FLATULENTAQUE HYPOCHONDRIORUM CONSTITUTIONE ET OBSTRUCTIONE CHRONICA ET CONTUMACI.

Anta est Morbi, quo cum conflictaris, contumacia, generose Domine N. N. ut ejusdem Therapeusis longiusculum omnino præsupponat tempus. Effectum medicamentis nostris hætenus, ut & mitiora jam sint symptomata omnia, caputque (quod aliàs non factum fuisset) summi Dei beneficio vaporibus iisce non impetum fuerit. Medicamentis propterea instandum ulterius. Usus autem medicamentorum competentem efflagitat diætam. Ne singula singulatim exequar, tria eam ad rem audi verba. Cibi sint *ῥῆπτωτοι*, *εὐχυμοι*, calidi. Caveas, caveas tibi in quam ab iis ferculis, quæ frigora concreta, aut aliàs congelata & conglaciata quasi, aula mensis vestris subministrat. Peracto cibo, particula capiatur Trageæ stomachalis nostræ, neque quicquam post ejus usus bibatur amplius.

Recip. Coriand. præp. ʒjß

Anisi, fœnic. præp. ā. ʒß

Cort. citri ʒiiij

Cinam. glycyrrhiz. mentha ā. ʒj

Flor. borrag. ʒß

Sach.

Sach. ros. tabul. ad pondus omnium.

Mis. f. Tragea stomachalis.

Similis adhibeatur in potu cautio. Alvus semper sit aperta. Sin minus de massa pilular. sequent. portio capiatur in quantitate avellanæ manuque ex eâ formentur pilulæ, hor. i. ante prandium sumendæ.

Recip. Spec. biera simpl.

Agaric. trocisc.

Rhabarb. electi ã. ʒij

Aloes succotrin. ʒjs

Epithymi Cret. ʒiij.

Cum syr. bizantino f. Mass. pilular.

Ut & ventriculo suus restituatur calor, qui tamen Epati ardorem non conciliet, singulis auroris Morsulorum piperinorum capiatur unus sequenti aurorâ (& ita permutatim) Aquæ aureæ cochlear sesquialterum.

Recip. Piperis albi, nigri, longi ã. ʒij

Anisi, thym. ã. gr. iij

Zinzib. alb. gr. is

Sach. alb. lib. ʒ. in aq. mel. ss. dissol.

F. Morsuli piperini quant. ʒj.

Recip. Cinam. elect. agrimon. cererach.

Flor. borrag. Tamaris. ã. Mß

Sem. plantag. portulac. ã. ʒiij

Santal. citrini, gall. mosch. vera ã. ʒß

Mosch. gr. vij. Vini terstill. lib. jss.

Ponantur in vitro cum custodia, per 15. dies. quot idie bis agitando. Die 16. colentur multoties, colatura add. Syr. de cortic. citri. miva cydonior. ã. ʒiiij. Mis. f. Aqua aurea.

Insimul vitare velis acerba cuncta, & savos animi cavere morsus.

Singulis septimanis domi ex aqua, quæ non ebullierit, sed tantum calefacta, infessus paretur. Ante infessum ventriculus oleo caryoph. & nuc. mosch, inungatur. Post egressum lectum petas, & si qua erumpentem sudorem impendas cave. Septimanis quoque singulis, binâ vice diebus intercalaribus, hora ante prandium tertiâ, tria sumas cochlearia Julepi sequentis.

Recip. Ligni aloes, cinam. cyperi. doron. ã. ʒj

Coriand. præp. anisi ã. ʒiij

Santal. citrini ʒiiij

Sem. acetos. endivia, portulac. plantag. ã. ʒiij.

O O 2

Aq. mes.

Aq. meliss. lupul. absynth. ā. ℥j

Bulliant ad consumptionem medietatis. Colat. infund. per noctem flor. Tamaris. flor. cordial. omnium. fol. Senna ā. ℥j. Bulliant unicā bullitione, & colat. add.

Succi pomor. Borstorian.

Vini granat.

Syr. ros. ex infusione simpl. rosar.

recent. ā. ℥v.

Iterum bulliant pro Iulapio mediocriter cocto.

Et cum constet affectum hunc esse chronicum, variis quidem, ad unam tamen intentionem directis, oppugnandus erit. Quapropter & interdum septimam pulveris sequentis partem horā una ante coenam capiet in vino leviusculo, in quo absynthium ponticum leviter ebullierit. Sapor absynthii si nimis ingratus, simplicissimum vinum esto αὐτὶ βαμόμενον
Recip. *Ceterach. Sem. plantag. portulaca, flor. Tamaris. cort. rad. capparor. flor. borrag. ā. ℥j Mis. f. pulvis pro septem dosibus.*

Hujusce loco, interdum (permutatim tamen ne uni natura assve-
scat) particula juglandis quantitate de seq. sumatur Electuario.

Recip. Conser. bugloss. ℥j. Diarhod. Abb. ℥vj.

Flor. Thamaris. ceterach. ā. ℥j

Coriand. prap. anisi ā. gr. xv.

Cum. syr. bisant. f. Electuarium.

Singulos intra 14. dies utatur Enemate, Pilularum superiorum ℥ij usurpentur intra singulos decem dies, sequenti verò die Bolo utatur saccharino, horā 4. matutina & ejusdem diei vespērā applicetur Enema lenitivum.

Recip. Mithridat. elect. ℥j

Conser. borrag. bugloss. rosar. ā. ℥ij

Mis. f. bolus Saccharinus.

Optaram quidem, usum horum medicamentorum institutum fuisse præterito vere. Id si actum, certè jam res omnis salva esset: nihilominus subsecuturo vere sequens electuarium A. capiatur manè hor. 3. ante prandium. Sequenti die sub aurora potio lenitiva B. capiatur. Paulò ante prandium, vena secetur Basilica vel interior ad ℥iijs, vesperi horā tertîā portio ejusdem lenitivæ potionis ut & sequenti biduo planè similiter capiatur.

Postquam lenitiva hæc potio absumta fuerit, purgans C. sumatur
horis

horis 5. ante prandium, post ejus usum ad horam sudetur, sine labore tamen. Horâ ante prandium unâ juscum gallinarium sine sale & butyro, sed tamen cûm sacharo albissimo præparatum, capiatur: post horam esto prandium. Nocte hujusce diei post primum somnum, bolo utatur sacharino cui indormiat, & sudorem promptum non impediat. Dein diebus septem subsequenibus continuis, continuetur potio Hæmatocatarctica E. si continuus potionis hujus usus tædiosus sit, dies quiescat unus, non tamen sine usu Electuarii confortativi F. sequenti continuetur & absolvatur.

His ita peractis inThermas se conferat Carolinas, de quarum usu paulò post.

Recip. *Elect. lenit.* ℥j
Spec. biera simpl. ℥j
Cum sach. f. bolus. A.
Detur cum ostiis.

Recip. *Rad. Cichor*
Polypod. quer.
Plantag. ā. ℥ss
Cort. citri ℥ij
Sem. plantag.
Coriand. præp. ā. ℥iij
Passular. ℥jss
Fol. Borrâg.
Bugloss.
Thamaris.
Ceterach. ā. piij
Abynth. Pont. Mss
Pistacior. mundat. ℥vi
Cinamon. ℥j
luris pulli macri q. s.

Cog. ad tertias, Colat. clarificata servetur usui.

Recip. *hujus* ℥iiijss
Reutereur sexies.

S. Lenitiva potio B.

Recip. *Confect. Hamech.* ℥ss
Elect. lenit. ℥jss
El citri exol. ℥ij
Syr. ros. ex multipl. infus. ros. ℥jss
Decocti anisi & glycyrrhizæ ℥iijss

Mis. f. haustus, Aromatizetur cum ʒi
Aq. cinam. S. Purgans C.

Recip. Mithridat. Elect. ʒj

Cons. rosar. ʒij

Mis. S. Bolus saccharinus D.

Recip. Cort. mirobal. omn. ol. amygd. dul.

Fricat. ā. ʒß

Rad. scorzonera ʒß

Plantag. ʒj

Pistacior. mundat. & incis. ʒjß

Sem. portulacæ.

Plantag. ā. ʒß

Aq. Fumar.

Borrag.

Bugloss. ā. ℥ij

Lonchitidis ℥ß.

Infund. in olla vitreata in loco cal. h. 24. postea add. polypod. quer

Fol. Senna s. stipit. ā. ʒiij

Epithym. Cret.

Glycyrrhiza ā. ʒij

Sem. citri ʒj

Cort. citri ʒij

Cort. elleb. nig. styr. prep. ʒij

Caryophyll. ʒj

Santal. Citrin. ʒj

Flor. borrag.

Thamaris. ā. Mj

Coq. ad medietat. Colat. add.

Syr. de Cort. citri

Ex infus. rosar. multipl. ā. ʒiij

Syr. de pomis Zabor. ʒj

Aqua Cinamoni ʒß

Mis. f. potio.

S. Hemarocatarcticum E.

Recip. Conser. borrag.

Bugloss.

Rosar.

*Cichor.**Charyophyll. nostrat.**Zinzib. in Ind. cond.**Cort. citri cond.**Cort. myrobal. chebul.**Indor. condit. ā. ℥℥**Conf. Citri ℥vj**Syr. de cort. citri q. s.**F. Conditum.**S. Electuar. Confort. F.*

CONSILIUM XLIX.

DE USU THERMARUM CAROLINARUM
PRO QUODAM CACOSTOMACHICO ET
LIENOSO.

Medicamentis nostris, Nobilissime Domine, effectum hactenus, ut malum ulterius nec serperet, nec vires eundo acquireret. Cum autem id mali genus radicum sit, & contumax, tempusque jam adsit vernum, svaserim, ut domi remissis lenientibus, aperientibus & venæsectione, jam tandem in thermas te conferas. Utaris iis pro potu: pro balneo & lotione nequam. Bibatur ergo per dies 9. & 11. continuas summo mane. Menera nota domesticis Thermopolitis. Non enim omnium Thermarum mensura eadem. Non ē canalibus hauriatur, sed ē scaturigine ipsa exoriat, fictili, tegatur, ne spiritus virtutis evanescat. Bibatur insuper solida ad tolerantiam, & alvi onere prius deposito. Locus etiam habitaculi temperatus sit, non nimis calidus. Primo dies tres ebibat mensus vel urceolos fictiles ibidem usitatos. Quo facto, mediocriter in habitatione temperata inambulet, citra tamen de fatigationem & sudorem. Sudor enim hac in parte intentionem planè evertet nostram, quapropter cautè vitandus. Nec nimis præcipitanter omnes urceolos ebibat, sed mora quadam interjecta.

Continuetur ea placidissima in domicilio proprio & temperato inambulatio, vitet tristitiam, colloquia agitet jucunda usque ad prandium. Prandium instituat, cum senserit urinam, quæ primò alba erat, tingi incipit.

Quam-

Quantitates etiam Urinæ & excrementorum observabit semper, ut certò sciri possit, nunquid tantundem vel plus vel minus per alvum & vesicam die 1. 2. & ad summum tertio non benè egeratur : Tertio die Rec. *Elect. hieræ simpl. ℥j affund. aq. thermar. Mis. pro Enemate* applicando adhuc ante cœnam.

Proderit etiam aquæ ebibendæ injicere pugillum salis communis ut vim acquirat penetrantior.

Secundo die quinque urceolos. Si posteriores nimis redditii essent frigidi ob moram, à scaturigine aliam aquam afferri curet.

Die tertio ebibat septem : die quarto novem urceolos exhauriat. Tandem iterum descendat, usque dum ad primum numerum, qui ternarius erat, redeatur. Somnum diurnum eò tempore vitet penitus uti & ova dura, butyracea, lacticia, & mixtos pisces cum carnibus eodem in prandio vel cœna.

Cerevisia sit servestana, Einbecensis :

Vinum sit Rhenanum.

Quod si ab usu Thermarum se incalescere sentiat, lumbos unguento santalino perungat. In itinere conditis utatur chebulis, aquâ aureâ & morsulis piperinis.

Illuc si deveneris, primo die quiescas, altero Haustum aperitivum sumas, sub signo ♃.

Tertio usum potionis Thermalis incipias.

Ardor si affigat stomachi, Trageâ utaris eam ad rem præscriptâ.

Recip. *Passular. enucleatur. ℥iij*

Glycyrrhica rasa ℥ij

Cinamomi ℥j

Flor. violar.

Borrag. ā. ꝑj

Thamaris. lß.

Coq. in justa q. aq. pro ℥iiijß

Colat. infund. per hor. lX.

Polypod. quer. ℥j

Fol. Sennæ ℥iij

Epithymi. Cret. ℥iij

Express. add.

Elect. lenit. ℥iij

Syr. ros. ex mult. insul. ℥ij

Aq. Cinam. ℥ß.

Mis. f. haustus aperitivus.

Rec

Recip. Corn. Cer. usti.

Corall. rub. præp. ā. ʒß

Terræ sigill. ʒß

Balaustior.

Sumach. ā. ʒj

Caryophyllor. matrical. ʒj

Nucl. moscb. ʒß

Sem. anisi

Fœniculi ā. ʒß

Coriand. præp. ʒi

Sachar. rosat. tabulat. ʒij

Mis. f. Tragea.

S. Tragea ad ardorem ventriculi.

CONSILIUM XLIX.

IN INFLATIONE VENTRICULI, VERTIGINE TENEBRICOSSA, &c.

PRæstantissimus vir, cujus natura moresque, totius item corporis filum atque habitus graphicè in missa scheda delineata sunt, jam ætatem habet h. e. in juvena constitutus penè dimidium supra quartum annorum climacterem vivendo attingit, variis admodum & interim diversis corporis affectibus obnoxius est: & primùm quidem τῇ ἐμπνεύματι ventriculi, & huic proximè accumbentis lienis rugitibus: tum quoque τῷ δυνάμει ἡσυχότητι, vertigini non simplici aut meræ, sed tenebricosæ. Cumque flatu in primâ corporis regione circa præcordia, stabulentur, & tempore etiam stabulantur, equidem mirum non est, non solum tendi sed & μετὰ τὴν ἡσυχότητα, quasi attolli in sublime hypochondria, totumque ex continuitate abdomen, quæque anfractuosa serie detexta sunt, intestinorum glomera. Inde postea tam fertilis morborum historia, nasci solet, ut præceptor noster non dubitaverit, nullum non morborum genus inflatus conjicere, & exstat liber ab ipso inscriptus περὶ φούων h. e. de flatibus, materiis scilicet, humoreque prægnantibus.

Ac ne à nostro subjecto longius abeam, quicumque ex flatibus paulò sunt crudiores ac graviores, ij unà cum lutulento & germano ipsis hu-

humore pessum eunt, ac in ima corporis desidunt ad pedes, qui hoc nomine, se ipsis graviores redduntur, non cum nullo sensu tensionis.

Qui verò his leviores sunt, modo per nervorum in sinistrum os ventriculi, è cerebro dehiscantium propagines evolant, atque exæstuant in caput modo prætoriam viâ pergulam faucesque emergentes, sub basi cerebri ad oculos pertingunt, utique horum animali spiritui sese intermiscentes, motum eorum nonnihil turbant, aciemque videndi offusis tenebris quadantenus præstringunt.

Si qui de flatibus in medio corpore habitant, illi partim vicina & consocialia membra aggravant, œconomiamque in illis labefactant: partim huc illuc præsertim per inania intestinorum nimis licenter oberrando seditionem faciunt, nulli non functioni graves atque infesti. Fomes horum malorum & fons primarius, haud dubiè nuspiam alibi rectius, quam infra territorium præcordiorum quærendus est, videlicet in ventriculo & utrinque ei accumbentibus hypochondriacis vesceribus, epate & liene, ventriculi ἀτονία & in chylo conficiendo seu infirmitas seu pigritia in medio est & obvia ipsi etiam ægro. Ut enim calor coctionis δυνατός multò firmior fuerit atque vegetior: fieri tamen non potest, quin in hac ætate, quæ à ὁρμητικῇ non longè abest, & inprimis verò ab errore videndi & delinquendi, in hac consuetudine planè inveterata, multum atque adeò multum elanguerit & occisus sit.

Accedunt institutum vitæ & muneris provincia in quam æger divinitus collocatus est, moles negotiorum penè supra vires. Sed & vacuitas sive intermissio exercitiorum aliquid huc conferre videtur, quemadmodum & lucubrationes prolatae in multam noctem, quibus ægri quies disturbatur. Ventriculo ferè semper aliquid sui afflant vicina viscera, & inprimis epas impendio calidum, quod adeò non potest corrigere, si quæ in primâ cæctione commissa sunt errata, ut potius ea confirmet & pravitate duret prorsus inemendabili. Etsi autem calidæ dysorasiæ epatis plerunque comes esse solet frigidus ventriculus, cui ab illius fervore suus calor subtrahitur: assunt tamen præter hoc, alia fervoris in epate documenta, nimirum ingens illa, de qua jam ante dictum est, etiam per genus venosum sursum in fastigium corporis tanquam quoddam κατὰ πύλινον exæstuantium halituum vis est, & moles immensa, quæ certè aliundè quàm ab ebullitione circum præcordia sanguinis existere, haud quaquam potest. Ad hæc fabulum in renibus quod unà cum latio prodit, indubitatus exusti sanguinis augur est.

Neque mihi prætereundus silentio ater ille humor, qui ad venas
hamor-

hæmorrhoidales abstruditur, cujus plurimum gignitur ab epate & ad cloacam corporis h. e. ad marginem derivatur atque expuitur. Lien antagonista est epatis, & quasi vasallus hujus quemadmodum & ventriculi, cujus naturam etiam propemodum induit, ille igitur atrum fœculentumque limum sanguinis tralatum ab epate intra se condit, qui prægnans gravidusque flatibus κλύδωσι sive rugitibus ventriculo strenuè obstrepens, ventriculo pariter & principi vitæ cordi gravi sua aura molestus est.

Hinc illa mœsticia, quam ab animo ægrè æger potest abstergere, & accessiones tempore ἀμειγνέειν & multum evarians pulsus, sed de fonte jam satis superque.

Causa proxima & quasi matrix est, uber proventus tam vitiatorum humorum, quàm qui ex illis eduntur crudorum flatuum in ventriculo & in hypochondriorum visceribus: his nisi ex permutata vivendi lege, ansa omnis præcisa fuerit, profectò abesse vix ac ne vix quidem poterit, quin subinde magis magisque debilitatis visceribus, flatibusque supra modum adauctis, vel flatulenta hypochondriaca existat, præsertim ubi æstus præcordiorum ex valida viscerum obstructione incanduerit, vel ex violenta φροσὼν καὶ βορβορουργμῶν cohibitione atque circumvolutione aridus hydrops, tandem suppullulet.

Neque verò fervor epatis imminentibus hisce malis obstaculo esse poterit, cum hydropicorum pariter & melancholicorum lotia sæpe numero æstum præseferant, coloreque foris adumbrent. Quid? quod decursu atque inclinatione ætatis, calida epatis discrasia tandem solet defervesce: ut adeò epar spoliū istud, quo ventriculo calorem abalienat suum, & ad sese advocat, minimè impunè ferat, ulciscēte se se ventriculo & ab epate adscitam sibi que impressam frigidam intemperiem, jure retorsionis videlicet crudore chyli sui refundat, suo denique gladio ipsum jugulet, quæ jam est mutua partium συμπάθεια & συνήμωσις, qua unum membrum alteri labem participat parem idque per venarum, quibus intexta sunt commercia. At enim melius hîc ominabimur, quando & ex lege hæctenus vivendi rationem, & illa non naturalia à senatu medicorum nuncupata, singula & universa ἐκ ἡμῶν, nostræ spontis & arbitrii, nostræque electionis natura parens esse voluit, neque dum enim œconomia naturæ magnopere labefactata est: facit ipsa sui quod est officii, & cibum sæpè inculpatè conficit: At hæc τὰ ἐννευρόμυχα vestigium naturæ calorisque insiti efficacitatem repræsentant, etsi interdum cruditatis nuncia sint, & ipsa non evomit ventriculus, sed ructat & eructat solummodo ἀπὸ τοῦ ἐντὸς.

Præterea error, qui animali videndique provinciæ dicato spiritui obrepit, neque dum localem habet sui in cerebro *ῥῆσιν*, sed sursum infernè transfertur è ventriculo & visceribus: interim salvi & incolumes sensus tam exteriores quàm interiores, præsertim ubi hæc symptomata oculorum inducias fecerit. Nec n. continenter fatigat, sed κατὰ ἑκάστην per circuitus temporum revertit, redux nunc jejuno, nunc onusto ventriculo. Haftenus de affectionibus corporis in agro nostro: nunc quibus præsidii obviam iri queat & commodè possit.

Omnes istas curandi unica est ἐνδεδίς: adhibendum scilicet id studii est, ut calorem in partibus nutritioni & œconomix naturæ famulantibus accuratè tueamur: prohibeamus contra, ne tantus pituitæ *ὀυσάδης* in corpore proventus fiat. Ante omnia verò initio destercoranda est alvus iis enematis, quæ in ruginibus Lienis & ventriculi conveniunt: tum aliis opimis & flatus non instrenue discutientibus, è quorum numero erit, quod A. notatum est.

Mox dein liberanda etiam viscera, humore flatulento, lutulentoque obsita: sed cum prævio quodam apparatu. Ratum enim est istud præceptoris, corpora quæ purgare voles, prius εὐροα meabilia reddenda esse. Qua in re appellandum est ad præsentium Medicorum operam. Mihi sequentia hæc visum fuit præscribere, quorum B. litera insignitum, vitiosos & in corpore *πλεταροτῶρω* superfluos humores naturæ obediētes reddit. Alterum cum C. notatum illos postmodum expurgat. Glutiendæ autem sunt pillulæ cum brodio G. C.

Mitrithatium D. ex albo præsidiorum in gratiam jecinoris cum sale absynthii contemperatum, nonnunquam etiam cum Rhob sambuci, minimè excludi debet, cui horâ quarta antelucana cum vini haustulo assumto & indormire & insudare licebit. Hucusque cautum est universo. Descendendum nunc porrò ad τὸ πλεσζ è quorum tribu exautoranda mihi & releganda videntur *ταῖ ἐρρίνα*, quando vis horum, sive per transversum narium tramites hauriantur, sive fenestris earum ille nantur obiter ad oculorum orbitas sursum appelli, etsi paulo sunt fortiora, multum hoc nomine ab infernis partibus allec̃ta, turbamque spirituum adaugeant. Ecquid enim halitu volucrius, quid eo seditiosius est? proinde malim ego ea adhiberi, quæ expirationes intercipient, ne sursum fortassis viam affectent. Hujus autem farinæ sunt, quæcunque hiantem ventriculum obferare, epar adstringere, corroborare cerebrum, & ab exhalitionum injuria defendere apta sunt. Ventriculo ante epulas quidem conferunt Emplastrum E, illius regioni allitum ex mastiche, ladan,

dano. Tacamahaca. Item oleum ladani, aut alba aqua vitæ: post epulas sacharo tenuiter incrustata semina carui, anisorum, fœniculi, coriandrorum preparatorum, aut sal sacerdotibus consecratus, vulgus sepliorum species incisas vocat, aut denique corpus sine anima, ex aqua rosarum molcata aut ambra condita. Hæc omnia primoribus dentibus commansa gratissimo nitore suo in sufflato volæ manus, indidemque naribus sursum hausto, cerebrum & apertos oculos recreant.

Dicam, paucis, à capite quæcunque flatus proffigant & diffigant, in alvum ventriculi devolvunt, neque interim tamen calore suo epar offendunt, omnia huc accersenda, & in usum trahenda esse. Est & mirabolano- rum hoc loco & tempore in clausula ventriculi vis non inefficax. Ast videndum quid cui expediat, sua enim cuique natura est, suus ventri- culus. Hic dulcium patiens est, eaque tolerat, alius contra respuit ea & aspernatur. Manè ad operas iturus æger abluat faciem & oculos cum frigida, instillata ei rosarum aqua fragrantissima interdum insperso pulvere naphæo & sachari candi albi, cui Benevenutus Hierosolymi- anus in clarificanda acie cernendi omne punctum adscribit.

Os elavetur cum austero vino: in eodem & tenendi Trochisci Mo- chardini nominati, quorum ope turba flatuum sedatur atque digeritur. Ante usum balneorum frons perluatur aquato ovi rhodostagmate infu- so, siquidem opus fuerit santalo albo. Sed & collum hac aqua aut con- simili aliqua damascena svaviter adspergi potest: Epati destinatum est ungventum F. quo dextrum hypochondrium unâ hora calidè ante pran- tium vel coenam inungatur.

Fervori æjus restringendo sunt aptæ radices cichorii & saccharum & floribus ejus paratum. Cerebro optimè opitulatur pupula nasalis dorata G. tum Cerotum H. pro futura coronali adversus advenas, & sursum infernè tralatas expirationes, ut prius dissipentur, quàm sedem bi figant. Potentissimè revellunt vomitus sursum emittentes elementa, unctiones pedum & *ἰερουδαϊστὰ* ex simplic aq. calida. Præstiterit autem pau- ante pedes inde usque à femoribus membratim defricuisse calente lintea- ine, quoad erubuerint. Eiusdem efficacitatis sunt & cucurbitulæ ab hume- , deorsum raptu quodam primum tractæ, post natibus impositæ atque in- æ. Ad cunctantes hæmorrhoides proliciendas, non dubitarem ven- sam defigere summæ regioni coccigis. Genubus præsentis Medici con- lent, quodam ex usu futurum sit, lassitudini jam obnoxiiis & fortassis am tumori. Pedum ima detumescent usu aquæ aluminosæ & salis coctis roremarino, salvia. Qua abluendi sunt. Ex usu erit & aqua
Pp 3 illa

illa cineris, & in culina quam *Ufcherradt* vocant & muria rosarum conditatarum ex vino & sale.

Resiccatis conveniet dein istud *Phylagrii* ex oleo rosaceo, omphacino, sale communi intrito. Horum omnium dextra usurpatione flaccor pedum circa malleolos residebit.

Porro à sancto ligno minimè abhorreo vel simplici, si natura fuerit, vel cum foeniculo alterato, *fassafras* dicto, quod cum ventriculo pariter & cerebro cæterisque cum visceribus gratiam init.

Cumque æger habitior sit & abdominis turgidioris, vellem equidem ipsum laconico potius uti quam in lecto non citra magnam molestiam desudare, hora septima & octava antemeridiana primum potum hauriet, *3v*, *vj*, *vij* hauriet, mox dein in labrum descendit papilione tectum & calefactum à vapore filicum candentium quibus aqua decoctionis scilicet ligni superfusa sit. Idem facitandum à meridie hora tertia aut quarta. Diutius in labro quam quadrantem vel semissem horam immorari religio sit. Præstat namque sudando paulò infra modum suffragari, quam ultra procedere, si quid enim sudori tantilla in labro mora decesserit id dein abunde in lecto poterit compensari.

De Thermis consulendi nunc locus non est, nec enim patitur temporis angustia, quare in ver deferenda illa est deliberatio. Est & in calidas delectus necessario instituendus & providendum num potum primum & lavacro, vel alterutro tunc utendum. Potus iis interdu solet, quibus venæpressæ nimisque angustæ sunt, quippe quibus ingurgitata aqua ægrè secedat & naturæ oneri sit. Lavacrum arbitror ægrum citra noxam toleraturum esse. Quo de impofterum ubi cognoverint quemadmodum præscripta à me auxilia responderint & successerint. Successus autem à Deo implorandus atque exorandus est.

Recip. *Fol. malva, pronia, mercurial. ā. Mj.*

melilot. chamomel. stachados ā. Mß

Calament. origani, centaure. min. ā. Mß

Sem. carthami excortic. 3ß

dauci, anisi, fœnic. lini ā. 3ij

Furfuris ligat. in pet. Mj

Prænor. ungar. n. vj

Coq. in s. q. aq. Colatura Rec. 3xij

Elect. biera Nicol. 3ij

Diaphæn, rosar. Mes. ā. 3js

Mellis anthosali 3js

Ol. aneth. rutac. cheirini ā. ʒß

De sale & ovo ā. q. s. F. Enema A.

Recip. Rad. polypod. q. Irid. llhr. ā. ʒß

Cyperī ʒj. liquirit. ʒiiij

Rad. s. aperit. vino albo macerat. ā. ʒij

Sem. 4. frig. corn. ā. ʒj

anisi, pæonie, ā. ʒj

Herb. capill. von byssopi, Thymi, scabios.

Saturia, linaria. agrimon. scolopend. ā. Mß

Flor. matbos, melissa, bug. ā. pjs

Passular. corymb. ʒj

q. in s. aq. sambuci aut decoct. lig. sancti & Col. Colat. Rec. ʒviij. add.

de cichor. c. rhabar. diasereos, de cupator. ā. ʒj aq. cinam. ʒiiij.

Mis. F. Potio B.

Recip. Mass. pill. aggreg ʒij. rad. mechoac. gr. vj

Trocis. Alband. diagridii ā. gr. ij

Cum aq. vite F. Pillula n. xij. C.

Recip. Syr. de cichor. c. rhabarb.

Brodii nuc. Ind. cond. ā. ʒß

Mis. S. Gassit zum Pillen. C. C.

Recip. Mitridat. opt. ʒj

Sal. absynth. gr. iiij

Mis. S. vermischter Mitridat. D.

Recip. Mastic. alb. ʒß

Macis, nuc. mosch. ā. ʒij

Storacis calamit. ʒj

Cort. citri ʒß

Caryophyl. Therebin. ā. ʒij

Laudami ʒj

F. Cerotum Stomachale. E.

Recip. Ungt. ros. Mes. ʒiiij

Squinant. spica ā. gr. v. calami ʒß

Rasur. eboris, corall. rub. C. C. prap. ā. ʒj

ti santalini q. s. F. Ungt. F. quod cum aq. absynth. aliquoties lavetur.

Recip. Sem. nigella ʒj

Ligni aloes & Rhodii ā. ʒj

Gum. Benzoi ʒiiij

Caryophill. spica Ind. ā. ʒß

Ambra gr. iiij

F. laxis nodulus G.

Recip.

Recip. *Ladani* ℥js. *Tacamahac.* ℥ij
Macis, nigella ā. ℥js
Sandaracæ ℥ij
Carabe mosch. redolent. crystallina ℥j
Cum cera & ol. ros.
F. Cerotum pro Bregmate. H.

CONSILIUM L.

IN DOLORE ET COMPRESSIONE STOMACHI,
 CUM DISTENTIONE ET IMPOTENTIA
 ERECTE SEDENDI.



Olor de quo æger noster potissimum conqueritur, est *πᾶθος* ventriculi, qui inflando & distendendo multoties tot & tantos in præcordiis exitat dolores, ut æger rarissimè erectus, plerunque verè curvus sedere cogatur. Hujus affectus parens fuit frigiditas ventriculi ex commensationibus & crebris commotionibus orta, quæ paulò post epar, ut & pulmones adeò refrigeravit, caputque enervavit, ut pulmones per fluxiones subtiles frigidaque perpetuò fuerint repleti, adeò ut præ difficilima respiratione ægri aliquoties suffocari visus est. Epar verò frigidius loco sanguinis temperati aquas producit, & consequenter diaphragma deorsum comprimit, unde difficilis existit respiratio, hydropicorum aliàs propria, pulmonibus quandoque nihil planè læsionis sustinentibus, sed iisdem planè integris ac sanis existentibus. Proinde nisi maturè huic malo occurratur, non leviter impendet metus hydropicæ affectionis, præsertim cum pedes aliquoties jam intumuerint. Febriculam quoque adesse nullus dubito, quippe cum æger patiens quandoque adeò reddatur imbecillis, ut cum magno sudore non raro in animi deliquium incidat.

Cum verò æger sit floridâ ætate, speramus ipsum per sequentia remedia pristinam sanitatem recuperaturum.

Quod si eventus voto non respondeat nostro, generosiora ipsi cum demum sumus præscripturi. Interim utatur semel vel etiam bis pilulis A. quatuor horis ante prandium: sequentibus verò tribus diebus potius D. quam etiam bis in die sumere poterit. Et cum pulmones influxibus istis frigidis & repentinis sæpius corripiantur, suffocationemominus min

inentur, æger per intervalla dimidium cochleare de syrupo B. & C.
on sine fructu sorbilando exhauriet.

Abstinebit à jusculis omnibus & cibis actu potentiave frigidis, pi-
cibus & lacticiiniis &c. & loco cerevisiæ præsertim recentioris, mero
eu multo uti poterit. Hæc pro tempore: daturi alia suo loco,

Recip. Mas. pill. cochear. ℥j
De hiera cum agarico ℥j
Cum aq. cinamomi f. pill. n. XXI.
S. Pilula A.

Recip. Rob. ex herberis ℥js
S. Syrub. B.

Recip. Oxi sachari squillitici ℥js
S. Syrupus C.

Recip. Rad. Ireos Illyric.

Heleni.

Polypod.

Cichor. ā. ℥ß

Sem. citri ℥ij

Fœniculi

Melon. ā. ℥ij

Herb. Tussilag.

Hyssopi ā. Mß

Cardui bened. pñj

Cichorii Mß

Betonica

Pulegii ā. pjs

Coq. pro ℥. IX. Colat. Rec. ℥iij

Syr. de hyssopo

De succo beton.

Oxi sach. squillit. ā. ℥ß

Aq. cinamomi ℥j

Ol. anisi gr. ij

Mis. S. Potiuncula D. reiteranda tribus vicibus.

CONSILIUM L.

IN DYSENTERIA, ANTE 20. ANNOS LINGVA GERMANICA EDITUM PRO INCOLUMITATE REIPUBLICÆ PATRIÆ.



Ubi promiscuè modò grassatur fluxus dyssentericus, ab esu oritur immodico venenatorum pomorum. Cum a. fluxus ille biliosus sit, fellens & acris in morem aquæ chry sulcæ, nequaquam is principio compescendus, antequam minimum viginti peractæ fuerint excretiones, ut ne venenata illa materia fixas sedes agat in corpore. Hoc facto attendendum an tormina sensusque acris percipiatur supra umbilicum, vel infra. Si supra umbilicum, sequens capiatur potiuncula abstersoria:

Recip. *Aq. hord. ℥iiij*

Syrupi ex rosis siccis ℥js

Mis. S. potiuncula abstersoria.

Vel ejusdem loco paretur subsequens:

Recip. *Conser. rosar. vetustiss. ℥js.*

Aq. hord. lib. semis.

Bulliant parum, & exprimatur fortiter.

S. Potiuncula abstersoria posterior. Capiatur manè hora 6. cum custodia. Attendendum verò, nunquid calor aliquis percipiatur præternaturalis. Eo præsentē, per biduum utraque jam ante ascripta, capienda potio.

Calore præternaturali absente, excretisque non biliosis, vel flavis sed mucilaginosus tantum, potiuncula capiatur abstersoria tertia.

Recip. *Mell. ros. col. ℥js*

Aq. hord ℥iijs

Mis. S. potiuncula abstersoria tertia.

Quod si purpurascerent excreta aldi, potiuncula abstersoria quarta vanda seu exhibenda.

Recip. *Lactis in quo chalybs recens candens sepius est extinctus ℥iiij*

Syr. ros. ex ros. siccis ℥js

Mis. S. potiuncula abstersoria quarta.

Ubi præterea, tormina ea sub umbilico sentiantur, tunc & intestina inferiora sequenti abstergantur Enemate.

Reci

Recip. Aq. korderi ℥viij. vel X. vel ℔j. pro arate
agrotantis, sacchari.

Thomasi.

Syr. è ros. sicca ā. ℥j.

Mis. S. enema abstersorium pro intestini inferioribus.

Applicetur hoc enema hor 3. pome. ejus diei, in cujus aurorâ pō-
sumta abstersoria. Hisce peractis materia fluxus evacuanda venit.

Recip. Myr. obalanor. Chebul.

Citrinor. ā. ℥iij.

Passular. ℥j.

Coq. in s. q. aq. plantag. per ℥iij quibus adde rhabarb. opt. sub-
tiliter pulveris. ℥j.

Syr. rosar. è rossis sicca. ℥ij.

Mis. S. Potiuncula evacuans. Capiatur manè cum custodia.

Pro hominibus robustioribus sequens paretur haustus.

Recip. Cori. myrobai. chebul. citrin ā. ℥ss

Coq. in s. q. aq. pro ℥iij, quibus adde

Syr. ros è ros. sicca. ℥vj

Rhabarb. opt. subtil. pulv. ℥iiij Mis.

Postmodò fluxus alvi compescendus ad quem scopum sequens
paretur pulvis.

Recip. Belli armeni ℥ss

Terra sigillate ℥j

Lap. bezoart. gr. V.

Mis. s. pulvis pro adulsioribus.

Pueris sequens detur :

Recip. Belli armeni ℥j

Terra sigil. silis. ℥s

Lap. bezoar. gr. iij. Mis.

Manè hor. 6. die qui purgationem sequitur, capiatur, in lacte,
ut sequitur, parato.

Rec. Cantharum lactis caprini vel bubuli usualet : coquatur ad
restantiam duarum tertiarum, despumetur, & chalybs recens candens
in eo septies extingvatur. Tandem pulvis noster itypicus in hoc lacte
dissolvatur, & caldiusculum exhauriatur.

Paratur autem id lac magnâ copia, cum sitis in hoc affectu vehe-
menter urgeat. Loco superiorum pulverum sequentis ℥j. vel ℥iiij in eo-
dem lacte vel aqua plantaginis calida sumi poterunt.

Recip. *Succini albi.*

Eboris usti

Terræ sigill. siles. ā. ʒiij

Gummi Arab.

Tragant. tast. ā. ʒv

Sem. Plantag.

Rosar. rub. ā. ʒj

Mastich. ʒv.

Sem. berberor. ʒiij

Cornu cervi usti ʒj

Mis. f. pulvis.

His qui tenuioris sunt fortunæ, in usu sit sequens.

Recip. *Rad. Tormentill. ʒij*

Dentium lucior exiccat. ʒs

Cort. C. usti ʒij

Sem. cymini rosti ʒj

Corall. rub. ʒs

Mis. s. pulvis stypticus pro pauperibus.

Cibi etiam, si excrementa fiant viridia, sequenti conspergutor
pulvere.

Recip. *Crystall. preparat.*

C. C. usti

Margarit. præp. ā. ʒj

Mis. f. pul.

His pulvis si quater ad summum sumtus fuerit fluxum compescit.

Id si ita fiat, tandem attendatur, an adhuc adsit calor febrilis. Illi
sequens opponatur potio.

Recip. *Rad. Tormentill.*

Pentaphyll.

Plantag. ā. ʒiij

Acetosa

Fragor.

Endivia ā. ʒss

Passular. ʒvi

Sem. Endivia.

Portulaca.

Plantag.

Acetosa ā. ʒj

Anth

Anthera ʒß

4. *Frigid. major.* ā. ʒj

Herb. plantag.

Mellefolii ā. Mj

Cichorii

Acetosa

Endivia

Agrimonia. ā. Mss

Coq. in s. q. aq. acetosa pro ʒbj. Colaturæ hujus ʒiijs. adde rhob. ribi-
um ʒs. M. s. f. potus Alexipyretus. Detur manè hor. 6. & post mer. hor. 3.

Siti summè urgenti, sequenti contravenitur potiunculâ:

Recip. Conser. rosar. vetustiss.

Acetos.

Rhob. berberor.

Ribium ā. ʒß

Cinamomi, nuc, moscat. ā. ʒj

Caryophyll. ʒj

Aq. agrimonia

Plantaginis

Acetosa

Millefolii

Endivia ā. ʒij

Mis. & exprimi. fortiter. De hoc multoties capiatur haustulo.
Magis tamen ægroti lacte chalybeato quàm hoc potus genere delectantur.
Internis dein doloribus, uti & perseverantibus fluxibus per linimen-
ta occurrendum.

Recip. Ol. Rosar. complet.

Mastich.

Cydon. ā ʒj

Sem. anthera ʒj

Cymini tost. ʒß

Balaustior. ʒj

Masticis ʒs

Cere nova q. s. pro linimento.

Hoc universus inungatur venter, à cavitate quæ sub sterno est in-
cipiendo, usque ad ipsa pudenda. Linteolo etiam gossypino inungatur
emplastrum de crustâ panis, quod calidiusculum ventris regioni appli-
cetur. Efficacissimum semper deprehendi emplastrum quod sequitur,
ventri & renibus applicatum,

Qq 3

Recip.

Recip. Rad. Tormentilla.

Mica panis ā. q. s.

Coq. in vino vel aceto usque dum fiat pulvis.

Hoc inunge gossypinum linteum, ventri & regioni renum antro-
sum & retrorsum applicandum.

Circa rectum intestinum, si Tenesmus suboritur, flores verbasci
in pulverem redacti, super prunis precipiantur, & in sella perforatā fiat
suffragium ad intestinum rectum. Ante usum ve dū hujus ipsius pul-
veris locus nominatus spongiolis aquā rosaceā imprægnatis, multoties
abstergendus. Quod si nec ita dolor ille cesset vel cedat, fume bino-
rum ovorum crudorum lutea, hisce immisceas pulverem verbasci conti-
nuò agitando & subigendo, usque dum fiat massa, quam lateri recenti
ardenti impones, ut coquatur. Detur hæc massa pulverisata in ℥iij aq.
rosaceæ. Si verò nec jam tenesmus cedat, suppositorium paretur sequens.

Recip. Lycii

Croci ā. ʒj

Ceruss. tota ex aq. plantag. ʒij

Pingued. de renibus caprorum

q. s. f. suppositoria.

Quibus alligetur filum, ut post horam elapsam iterum possint eximi.

Quod si Tenesmus contumacissime perseveret.

Recip. Lycii,

Thuris

Croci

Gum. Arab. ā. ʒss

Opti. ʒij.

F. suppositor cum filo, ultra horam in intestino non relinquendum.
Intestinum si exulceratum sit, enemate superiori abstersorio cure-
tur, vel sequenti.

Recip. Decocti rosar. & milleso ii ℥ss

Medull. tritici, id est, amygd. ʒij

Vitell. ovor. n. i.

Sanguinis Draconis ʒj

Mis. f. Enema, multoties reiterandum.

Cibi sunt Oryza & milium lacti chalibeato incocta. Caput vitu-
lum, uti vitulorum pedes benè conglutinant. Caro vervetina & galli-
nacea propinquetur assa, insossa, expersque aromatum. Potus sit lac cha-
lybeatum. Vinum absit. Motus affectus animi iracundiores, terrores, ac-
publicus, hypocaustum nimis calidum absumto.

CON

CONSILIUM LI.

IN AFFECTU QUASI INFLAMMATRIO
EPATIS, à SCORBUTICA *Αλξήσι* ET DIUTUR-
NA HYPOCHONDRIACA OBSTRUCTIONE
SUBORTO.

Variè de hoc affectu, ut &, ejusdem causâ varii hæcenus
disputarunt Medici, aliis enim obstructionem, aliis inflam-
mationem Epatis cognominantibus. Atqui nodus iste
Gordius facili à me labore solvetur. Qui obstructionis
um dignati fuère nomine, ad causam respexère materiales efficientem,
quæ bilis est vitellina multæ pituitæ crudæ permixta, venas mesaraicas
qua epar versus tendunt, obstruens.

Hæc ab obstructione calor oritur præternaturalis, naturalem epa-
is, quod eventatione caruit, temperiem immutans.

Qui inflammationis titulo ornarunt, formam & naturam morbi
respexère. Respexerunt isti procul dubio ad Galenum, qui id affectus
genus quasi inflammationem cum adjectione, non verò sine adjectione
appellavit. Illa igitur obstructio vapores gignit, qui sursum delati, non
olum epar quasi inflammant, sed & vertigines creant jejunis, uti &
stupores nonnullos, sed tantum temperarios.

Observavi ego annis plusculis, stupores oriri ex obstructionibus
mesaraicis & hypochondricis, ex quibus vapor exhalat adustus & aci-
dus, nervos obstruens, & quasi paralyfin inducens. Objiciat mihi ali-
quis, veram etiam esse inflammationem propter magnitudinem caloris.
Atqui sciatur, intentionem eam caloris, non ab inflammatione depen-
dere, sed à maximo morbi motu, & quasi in paroxysmo contingente.
Tunc enim vehementissima est illa quasi inflammatio, & Erysipelatis in-
norem antequam ad extra feratur, totum corpus frigore & calore vi-
brans, non secus ac febris quædam ardens & maligna. Nequaquam ve-
rò inflammationis venit nomine priusquam in externâ se prodât superficie.

Morbus hic chronicus est, cum præpotentem morbi causam & in-
veteratam præsupponat intemperiem. Et nisi à violentis abstinence pur-
gantibus, vel si tractetur segniter, diætâ penitus neglectâ, tandem in
hemiplegiam desinit, ut jam multoties à me observatum.

Diætâ sobria sit, uti alio à me præscripta loco. Cerevisiæ infun-
dat baccas fragorum siccas. Cura

Cura ut instituenda, non præter rem fortasse aliquis quæsierit. Cum enim affectum hunc Galenus quasi inflammatorium appellet, medicamentis refrigerantibus ipsi occurrendum innuitur. Avicennas autem ait: Frigida quidem in hoc morbo consolantur, sed non abscindunt causam morbi. Hæc autem *ἐκαστιόφων* de facili conciliantur, si dicatur, ratione caliditatis requiri frigida, ratione obstructionis aperientia & detergentia.

Neceffe autem est, ut utraque hæc sint temperata. Frigidis quippe obstructio confirmatur, calidis adaugetur calor. Ratione ergo obstructionis utendum purgantibus. Hæc tamen non nimis sint calida quorum locum Bolus A. supplebit. Sumat duabus tantum horis antequam prandium, ut cibus eum deprimat, feliciusque & sine violentiâ materia turgila per subsequentem cibum promoveri queat. Post boli hujus usum, sequenti die hor. 5. matur. & 3. pomerid. uti & diebus sequentibus herbis B. sequenti modo coctis utatur. Pulli quippe gallinacei duodecim exenterati & diffecti more solito, in libris XII. aquæ communis inciduntur, sine sale absque pingvedine. Coquantur ad remanentiam VIII. liberarum. Inde per se refrigeratur. Defunde per inclinationem & inter fundendum: ne pingvedo manus elabatur, cave. Huic ingeras herbas B. coquantur ad minuta fere 30. vel 40. Refrigeretur iterum per se, sed non sine ad moto operculo. Coletur, servetur in cella & singulis diebus ebibatur cyathus. Posteaquam per triduum id ita continuaverit, quarto cesset, & venam basilicam tundi curet, ad effluxum 3iij. Die quinto & sexto pergat: septimò repetat Bolum A. Materiam hæc obstructoriâ ita expeditâ, intemperies calida in mesaraicis & hepaticis emendanda venit, ut & reliquæ quædam viscide. Eâ in re probatissimam habeo medicinam è sero lactis sic parato. Sume lactis caprini recentissimi lbij bulliat, & in summa ebullitione infunde oxymellis simplicis acidissimi & peculiariter præparato ex acidissimo aceto vini 3iij. Lac statim exuberantiam & effluxum minabitur. Id ne fiat, cave. Cyatho argenteo aquâ frigidâ repleto, & in ollam reposito. Coagulum removeatur. Serum reserva. Interim ex aquâ fragorum, & ex corticis melonum seminibus fiat Emulsio. Hujus emulsionis 3ß adde lib. iij. feri misce, & per decendium de hoc calido bibe, manè hor. post usum in conclavi ambulet, dein verò & in publicum prodeat, corpus moveat ad sudorem ferè. Quod si in usu hujus decendialis per obstructionis animadvertatur, materiam quandam viscidam adhuc in corpore detineri, quæ mater sit obstructionis, neque vi hujus feri propelli possit.

set, tunc sanè mox ante usum seri, eâdem horâ & momento, pilulæ sumantur sequentes, quibus statim seri usus subsequatur.

Recip. *Salis absynskii* gr. vj

Extracti chamædr.

Card. bened. ā. gr. v.

Mis. f. κατὰ πόνον.

Quod si quandoque alvus sub usu hujus seri non aperta esset, interea temporis ad diem unum ab eo cessandum, & repetendus Bolus A. vel ejus loco syrupus rosatus solutivus ipsi sero permixtus, assumatur. Objicis: Hæc quidem omnia Epatis intemperieri & mesaraicarum conveniunt, obsunt autem ventriculo. Id verò cavebitur usu pulveris cochleari dimidio post prandium. Sero ita per 10, 12, aut 14. dies continuato, pro extirpandis omnibus reliquiis Bolus A. repetitor. Postea singulis diebus manè, & postmerid. h. 3. Rotularum D. capiatur una, cum jejuniò ad 3. horas, pro confortando epate, ventriculo & cerebro. Epar verò postmodum singulis auroris & sub ingressu lecti linimento è butyro ovillo delibutum reddat, ulteriusque ne iterum incalascar unicè caveat. Quæ omnia clementissimus Deus secundet.

SEQUUNTUR MEDICAMENTA.

Recip. *Spec. electuar. Episcopi* ℥ij

Pulpæ thamarindor. extractæ supra decoct. ferventem Sem.

anisi ℥ rad. liquirit. ʒvj

Spec. Diarhod. Abbat. ℥ss

Mis. f. bolus qui detur sine sacharo, ut ne aboleatur grata ejus acciditas. S. Bolus. A.

Recip. *Rad. Cichorii*

Acetosa

Fragor. ā. ʒs

Rubia tinctor. ʒij

Pentaphylli

Isleis ā. ʒij

Fenic. ʒs

Cort. rad. rappar. ʒij

Glycyrrhizæ

Altheæ ā. ʒs

Sem. melonum ʒiijss

Cicerum rubeorum Mss

Rr

Herb.

Herb. cichorii

Endivia

Scariola ā. Mj

Chamedrios

Agrimon.

Ceterach. ā. Ms

Marrub. albi.

Cardus benedict. ā. pñ

Dentur incisa ad chartam.

S. Herba B.

Recip. Sem. coriandri prep. ʒvj

Anisi

Fœniculi

Cinamomi ā. ʒjs

Galanga ʒi

Sachari solidi ʒys

F. l. a. Tragea.

S. Tragea stomachalis C.

Recip. Spec. aromat. rosat. ʒs

Diarhod. Abbat.

Diatrion santal. ā. ʒj

Trois. de Rhaba b.

de absinthio ā. ʒs

Sachari albi soluti in aqua cichorii ʒvj

Endivia ʒiij

F. conf. in rotulis.

S. Rotula D.

CONSILIUM LIII.

IN HYDROPE



Rnatissime & Doctissime Vir, amice singularis, de causâ
Hydropis tûm alibi à me, tûm præsentî tibi à me dictum,
uti & de curatione. Hæc verò quæ de curatione dixi, hoc
loco breviter & παχυλῶς, καὶ ὡς ἐν τίπῳ καὶ παρόδῳ, ut
melius memineris, repetam.

In

In Hydropis curatione respiciendum est ad tria, 1. ad aquas & flatus, quibus totus venter turget. 2. ad causam 3. ad Symptomata.

I. HYDRAGOGA.

Aqua educitur vel per medicamenta intrò assumta, vel per Exteriora. Introassumta sunt purgantia, hydrotica, uretica. Purgantia sunt pulveres ex radicibus, herbis, floribus, materiis Chymicis, seminibus. 2. Succis 3. Rhobob. 4. Infusa. 5. Decocta. 6. Electuaria. 7. Pilulæ. 8. Trochisci.

Hydrotica sunt vel ab intra, ut decoctum ligni sancti vel similia; vel ab extrâ, cupâ, suffumigiis, lecto.

Uretica sunt infusa, decocta, contrita, pulveres.

Exteriora sunt Emplastra tum aquas ducentia, tum absorbentia siccando, olea, sudores, paracentesis, scarificatio.

II. CAUSAM.

Id est, emendantia partem corporis à qua generatio vel aquæ vel flatuum maximè evenit, & hæ maximè sunt, Epar, splen, uterus, renes, ventriculus, pulmones. Hæc exhibentur confectiones, condita, Electuaria, pulveres. Admoventur ad extra olea, unguenta, cerota, Emplastra, cataplasmata, sacculi, fomenta.

III. SYMPTOMATA.

Sitis & Tumor. Sitis fallitur filicibus in vino infusis, passulis, succo glycyrrhizæ, radice glycyrrhizæ recenti, crystallo in vinum infuso.

Tumor tollitur scarificatione, paracentesi, moventibus sudores tam ab intra quàm extra. Et hoc ad extra fit sacculis, stragulo, infurno, in balneo sicco.

Atque hæc erant, quæ breviter volui repetere, copiosè enim jam ante de reliquis ægrotum instruxi præsens. Præter reliqua verò jussi quoque ægrotum nostrum uti Electuario Chalybis Mercati, vino medicato Muraldi, vino purgante Erasti, unguento, emplastro, sacculo, enemate, & aliis, quæ jam sequuntur:

Recip. Chalybis limati recenter recrementis abjectis lbs, inde in vas vitreum & affunde lbviii vini albi optimi, mox vas igni molissimo oppone, diligenter hinc inde chalybem & vinum sursum ac deorsum agitando: Tandem X. vel XII. ebullitionibus fervere finito, quoad usque ejus spumofum sursum ferri videas, ac mediocriter crassescere conspicias. Tunc spumofam ac pingvofam chalybis partem quæ fervore separatur,

simul cum vino in aliud vas transfunde, idque ter facito ordine prædicto : nimirum aliam vini quantitatem denuò conjice, & eodem modo fervere sine, parique ratione separari, & pro tertio idem facies servato ordine. Demum vinum cum supra dicta triplici spuma, tribus coctionibus à chalybe extracta, rursus igni appone, donec leviter fervens mellis spissitudinem acquisierit.

Electuarium Chalybis præparans.

Recip. Chalybis dicto vino præparat. ℥ss

Sem. Petrosel.

Dauci

Spec. Diacurcumæ

Diarrhod. Abbat.

Epithym. ā. ℥j

Cinamomi ℥j

Ex melle optimè despumato q. s. f. s. a. Electuarium. Dosis ā. ℥ij. ad ℥ss.

Electuarium Chalybis purgans.

Recip. Chalyb. dicto modo præparat. ℥j

Rhabarbari electi ℥js

(Peucerus utebatur soldanella ℥iij &

Turbith ℥iij)

Spec. diarrhod. Abbat.

Diacurcum. ā. ℥j

Cort. rad. rumicis

Sem. dauci ā. ℥js

Charyophyll. ℥i

Mellis despumato q. s. f. Electi.

Dosis ā. ℥ij. ad ℥iij.

Utatur per biduum Electuario præparante.

Tertio verò itidem Electuar. purgante.

Post utriusque electuarii usum, per dimidiam horam in conclavi obambulando.

Vinum Medicatum Murali præparans.

In quo observetur, quod quadragintæ libræ civiles constituent circiter octodecim Hallenses.

Vinum Medicatum Erasti purgans.

Ubi notetur, quod libræ sedecim civiles faciant septem Hallenses.

Nota.

Nota. Per biduum uti potest vino præparante: tertio die vino purgante.

Recip. Olei irini

Rutac. ã. ʒi

Nucum ʒs

Lixivi cinerum sarmentorum ʒi

urinae pueri

Vini albi tenuis ã. ʒß

Rad. ebuli

Cyclamin.

Bryonia

Cucum. asinini an. ʒs

Sulphuris vivi nitri an. ʒi

Bulliant ad consumpt. aquositate & contentur fortiter: Colaturæ ad-
de unguenti Agrippæ

Arthanite major. an. ʒs

Cum cera f. unguentum.

S. unguentum pro inungvendâ totâ hypo-
gastricâ regione.

Recip. Emplastri ad hydropem Augusta-
norum q. s. pro toto abdomine.

Adde.

Emplastri de baccis lauri ʒiij

Pulv. cymini ʒjs

Ruthe ʒvj

Cum ol. rutac. & nucum f. Massa inducenda alutæ, obducenda
& interbassanda.

Recip. Farina fabarum

Milii torrefacti

Furfuris siliginis minutissimè tritorum
an. ʒvj

Pulv. cymini

Spec. de baccis lauri ã. ʒs

Sum. aneth. ʒij

F. l. a. sacculus, ex telo linco qui interbassetur,

Recip. Urinae pueri impub. non

Abstemi ʒ. lx.

Fermenti ʒs

Sem. anisi

Rr 3

Feni-

*Fœniculi**Carui**Cynini ā. ʒj*

Bulliant ad casum quartæ partis.

Recip. *Colat. ʒss. adde vini generosi vel Rhen. ʒiiij**Olei nardini**Rutacei**Nucum ā. ʒvi**Mellis Mercurialis ʒs**Mis. f. Clyster.*

Nota. Raphani radix albo meraco inspersa & in sartagine calefacta & pubi admota, remorata urinam pellit.

Recip. *Succi raphani ʒij**Vini Cretici q. s. idem prestat.*

Atque ista quidem alternatim usurpari poterunt. Unguentum a crura præscriptum est. Sacculus ad scrotum tumefactum Emplastrum ad totum abdomen. Clyster eodem die quo vinum vel Electuarium purgans assumitur, injici potest. Erasus in vino aliquoties extinguit chalybem ignitum, sed fit ingratissimi saporis. &c.

CONSILIUM LIV.

MEDICAMENTA IN HYDROPE CUIDAM
JUVENI PRÆSCRIPTA, QUÆ IPSI PLURIMUM
PROFUERE.**R**ecip. *Mass. pill. de Hierâ**cum agar. ʒij**Aggragar. ʒj**Dacrid. gr. iij**Cum aq. ablynth. f. pill.*

A.

Recip. *Rad. polyd.**Cichor. ā. ʒvi**Centaur. major.**ʒ. Aperitivar. vino malvat.**macerat. ā. ʒs**Cyperis*

Affari
Ircos
Pocor. ā. ℥iij
Sem. Caribami conquass. ℥j
Cort. rad. sambuci
Ebu. i ā. ℥j
Sem. citri ℥iij.
Alkekengin. XX.
Granor. lupperi ℥s
Passul. r. ℥js
Pistator. mundat. n. XX.
Soldanella ℥js
Squamanth. ℥ij
Aloes cruda ℥js
Caryophyll.
Zeduar. ā. ℥iij
Gratiola ℥iij
Fol. absynth.
Chamaepithec.
Chamaedr.
Agrim.
Euscula
Marrub. alb.
Capill. ♀
Celerach
Adiant.
Spicanti ā. Mj
Scariola
End.
Cichor. ā. Ms
Fol. Senae ℥iij
Epith. cret ℥js
Turbit. alb. ℥j.
Coq. in s. q. aq. flor. sambuci. pro ℥XX.
In quib. colatis infunde per noct.
Agar. r. ℥vi
Rhab. opi. ℥js
Spica ℥j
Cinam. ℥js

Manè ebulliant in ca ebullitione & exprimantur forte

Expressi Rec. ℥iij

Syr. anarhod. magistralis de cich.
cum rh. b. ā. ℥iij

Mis. f. haustus aromatizatus cum qt. ol. cinam.
& qt. ij. ol. anisi.
S. Träncklein.

B. Reiteretur sexies.

Recip. Spec. hiera simpl.

Mass. pill. alephang. ā. 3s

Elaterii gr. v.

Cum aq. cinam. f. pill.

C.

Recip. Ligni Guaiaci pulvi ℔j

Cort. ejusdem ℥iij

S. ssafra 3s

Fol. Soldanell. Miij

Visci salicis 3s

Cinam.

Glycyrrh.

Sem. anisi ā. ℥iij

Passularum corinthiacarum 3s

Pistatorum n. XXX.

Schananthos ℥iij

Infundantur in aq. absynthii. meliss. scolopend. & cichor. ā ℔iij
Stent in loco calido in ollā vitreatā per horas XXIV. Postea coquantur ad medietatem & colentur. Dentur pro vice ℥vj.

S. Schweißtränck.

D.

Remanentis decocti prioris adde aq. font. ℔ XXIV. & ubi coxerint ad consumpt. Tertia partis adde sub finem.

Cinam. opt. 3s

Sem. anisi 3vj

Refrigerata per se colentur.

S. Schweißtränck.

E.

Recip. Lign. Guajaci ℥iij

Corr.

Cort. ligni ʒj

Visci folium ʒij

Glycyrrh. ras. ʒis

Sem. anisi

Cinam. ā. ʒiiij

Passular. ʒs

Aq. Fontana ℥XX.

Coq. ad consumpt. Tertiae partis, Colatura refrigerata per se.
S. Tischtrancf.

F.

Recip. Spec. aromat. ros. ʒij

Diacurcuma

Dialacca ā. ʒj

Spodii de ebore

Epatis lupi præp. ā. ʒij

Extr. Ireos gr. XIII.

Sacch. albiß. Sol. in aq. absynth. ʒv, ʒij

F. conf. in rotul.

G.

Recip. Sem. coriand. præp. ʒs

Dicydost. sine quib. ʒij

Sem. sæic.

Anisi

Cinam.

Glycyrrh. ā ʒij

Tunicar. inter. ventris.

gallar. n. iij

Spec. ros. novell. ʒis

Ligni aloes crudi ʒj

Macis

Margarit. præp.

Corall. rub. ā. ʒj

Sacch. ad pondus omnium mis. f.
tragea.

S. Magenpulver.

H.

Recip. Elect. diacartham ʒs

Ss

Rhab.

*Rhab. opt. ℥j**Elaterii gr. ijs**Ol. cymini gr. ij.**Mis. cum Sacch. pro bolo.**S. Batmerg.*

I.

Post pill. A. usurpet continuis 6. diebus vel alternis, si nimis purgent, potionem purgatoriam B.

Inde pill. C. & dein reliqua, ut scis, unà cum tragæa post prand. & coenam.

Si sudor non benè fluxerit aut alvus adstricta fuerit, utatur à prandio h. 3. elect. I. Manè a. prius potionem sudoriferam sumat, in coenà bibat vom Tischträncklein.

CONSILIUM LV.

AN IN TUMORE FLATULENTO ET SUBAQUOSO USUS THERMARUM CAROLINARUM CONVENIA.



Uemadmodum Thermæ quælibet pro qualitatè sua ventriculum, lienem, renes & epar afficiunt, si in potum veniant: ità & thermæ Carolinæ potæ refrigeratos ventriculum & lienem calefaciunt, & exiccant potæ. Hoc respectu thermarum potio concedi posset, ni exuberans humor Melancholicus idipsum simul prohiberet.

Quoad lotionem affirmo, Thermas Carolinas hac vi esse præditas, ut partes exteriores cutaneas & subcutaneas, in iisque existentia omnia exiccent, & confirment.

Cum verò perillustri Dominus Comes, in exterioribus membris, partibusque cutaneis & subcutaneis benè se habeat, eò respectu non erit illa lotio necessaria. Quin imò tumor adest statulentus & subaquosus quem per sudorem & viscerum interiorum reductionem ad suam temperiem naturalem auferre & immutare convenit. Si itaque lotio instituetur, quatuor sequentur absurdissima incommoda.

Cutis

Cutis primò exiccabitur, claudentur pori, adeò ut ne tumor flatulentus & aquosus dissipari queat.

Secundò per illam constipationem materia morbifica non tantum sub cute, sed & in toto corpore agitabitur. Qui sanè *δρεχασμὸς* febrile sufflabit incendium, de quo nil quicquam dubitandum.

Quin imò, quod tertium est incommodum, materia per constipationem à thermis factam repulsa & exagitata partem petet nobilem & principalem, quod non sine evidenti fieret periculo.

Quartò: ponamus ità, lavacro illo corpus labefactabitur, tumorque exiccabitur. Esto. Interim, quod caput rei est, intactum relinquitur.

Est enim in ægroto nostro immediatum morbi principium, infrigidatio quædam ventriculi, Lienis & Epatis, cum quadam duritie horum omnium.

Huic contrà eundum: Id ni fiat, actum est.

Objicitur: Temperamentum ægri calidum est: Thermæ calefaciunt. Temperamentum itaque ægri confirmabitur.

Egregium me hercle: Temperamentum ægri calidum, è gradu caliditatis primo in secundum transferetur, calorque inducetur hecticus, quem Hecticam senectutis nominant, frigidâ intemperie partium affectarum nihil minus interim cessante, quod tamen absolum esset facere Dixi, quæ sensi.

CONSILIUM LVI.

IN TUMORE VENTRIS TYMPANITICO.



Uæ Superioribus Mensibus Illustrissimo Principi N. N. à Medicis tum temporis vocatis, præscripta fuerunt medicamenta, ad naturam tam morborum, quam temperamenti totius & singularum partium, earumque principalium; eâ solertiâ, cura & diligentia directâ, accommodataque fuisse, eventus talis comprobavit, ut verè affirmare possimus, istum Hippocratis aphorismum. Curatio ostendit; argumentum demonstrativum esse, quod

in judicando neutiquam fuerint decepti. Cum enim sua Celsitudo incidisset in timorem ventris tympaniticum talem, ut ob crescentem splenem, obstructum mesarum universum, inprimis verò circa hypochondrium sinistrum, & epatis, ventriculi & singularum partium principalium recessum à tono naturalis temperiei in latitudinem frigiditatis majorem, quam facile suspicari potuissent, incidisset, ut hydrops omnino metuenda videretur: auxilia ab ipsis methodicè præscripta, atque à sua illustri celsitudine, valetudinis suæ amante, diligenti obsequio usurpata, auxiliante æterno & propitio Deo, cum effectum nobis ostenderunt, ut verè gloriari possimus, quod labor noster non fuerit inanis in Domino: Imò vere atque rectè de singulis tam affectionibus quàm earum causis nos judicium fecisse: adeò ut in præsentiarum occasio nobis præbeatur, ab iis non prius (cum medicamenta singula & universa rectè fecerunt officium suum) desistendi, quam suæ Celsitudinis valetudo ad eam integritatem redeat, quam methodica curatio ostendit, & sua Ill. Cels. anxie & magna spe exoptat.

Quocirca nihil innovandum arbitramur, sed iis tantis per insistendum putamus, donec Cels. suæ valetudinem undiquaque ita restitutam & præfidiis debitis munitam animadvertamus, ut verè salvum, incolumem & rectè beneque valentem Ill. suæ Cels. familiæ sistamus.

Cum autem id in posterum nullis aliis remediis præstare possimus, quam iis quæ universalem totius temperamenti S. C. lapsum ad frigiditatem & humiditatem, caliditate debita, & siccitate conveniente, quam simplicissimè ad æqualitatem (quoad ejus fieri potest) temperiei nativam, tam curatorie, quam præservatorie reducamus: diligenter examinatis singulis auxiliis, majus & præstantius reperire potuimus nullum, quam potum thermarum carolinarum. Quæ eâ virtute præditæ sunt, ut non modo declinationem caloris nativi ad integritatis restitutionem referri possint, sed etiam aperiendo obstructions tam in epate quàm splene nunc Dei beneficio ad debitam mollitiem vicissim reducto: educendo materias pituitosas & melancholicas crassas & fæculentas per urinam & alvum, serosas verò, (quæ paulatim deorsum ad crura & pedes destillando, lancinantes dolores & tensiones circa crura & furas excitant) per sudorem discutere, & demum partes singulas multâ humiditate aquea & serosa imbutas inebriatasque, adeoque flaccidas redditas. siccare & firmare, denique alvi fluxum ex venis mesaraicis epatis vitio frigidioribus & imbecillioribus factis prodeuntem cohibere, extra omnem disputationem valeant. Objici hisce nostris rationibus

ibus fortè posset, quod per temporis angustiam hunc scopum hoc
ere consequi non possimus: addi & hoc, quod multum atrii humoris
x adustâ bile generati, in venis mesaraicis redundans, ex caliditate
thermarum inflammari & febrim difficulter curabilem excitare possit?
ad id respondemus, curationem & usum talium thermarum ad autu-
num differendum, interea autem debitis atque iis, quæ suum offi-
cium salubriter hætenus, fecerunt remediis, paulatim & repetitis pro
iudicio medici præsentis vicibus, atque per intervalla, quicquid adhuc
elucescit, demulcendum esse.

Deinde non metuendum, quod caliditas thermarum humorem ali-
quem exasperare, & febrilem, multò minus inflammatorium reddere
possit: propterea quod certum sit, hypochondriacam, quæ suæ celsi-
tudini molesta est, nunquam fuisse factam, sed adhuc in fieri esse.
Nam hætenus nemini nostrum cognitum fuit, hypochondriaca sym-
ptomata eo usque excessisse, ut sua Ill. Cels. de iis, ut fieri in tali af-
fectione solet, sit conquesta. Sed quicquid hujuscemodi mali fuit, id
ex tumore flatulento ventriculi, splenis, & obstructione mesaraica-
rum, non perfectè sublatorum, profectum est. Quæ obstructio cum
potius ex crassa, viscida & lenta pituita, atque ex humore melancho-
lico crasso, originem duceret, tantum abest, ut bilis atræ aliquid
propter toni universi corporis & singularum partium ad frigiditatem
(apsum) ex bile flava generatæ admixtum haberet, ut etiam hætenus
semper aperientium, attenuantium & detergentium temperatorum,
non verò simpliciter refrigerantium admixtionem necessitas requireret.

Ac si instantia detur: Celsitudinem suam solito mœstio-
rem morosio-remque ab aliquot mensibus, quam ante hæc tempora fa-
ctam esse: atque propterea certè statuendum esse, quod hypochondria-
ca non sit in fieri aut incipens, sed in facto esse: hunc rogamus, ut
diligenter secum pensitet & ratiocinetur, an talis metus & tristitia mo-
litasque, non profecta sint, ex diuturnitate tussis, quâ cum S. C.
ab aliquot septimanis est conflictata, præsertim cum accederet sputum
anguinis, ex capite, & inde astantium inopinatus terror atque im-
placabilis sollicitudo & metus recuperandæ valetudinis penè vituperio-
dignus. Sanè si quæ est ex causis externis, quæ mentem perturbare,
& etiam fortissimum quemque virum pusillanimum meticulosumque red-
dere possit, hæc profectò non est minima. Quid enim magis pote-
st tristitiam excitare, & metum augere, quam si quis præ oculis sem-

per collocatam habeat adversam valetudinem, atque inprimis quæ sine nullo caritura sit prius, quam naturæ debitum secundum beneplacitum Dei persolvamus? Frustrâ igitur talia in medium afferuntur.

Possent idem quod thermæ, etiam præstare in curando acidula spaënses in finibus Lucelburgensis ducatus sitæ: & videntur si probè examinentur fortassè etiam perfectius & felicius, propter mineram ferri in illis cætera mineralia superantem, atque propterea splenis duritiæ magis convenientem appropriatamque? Fatemur, & facilius assentiremur, si non hoc nobis obstaret, quod in iis individuis, quæ ad aqua potum nunquam assveverunt, actualis frigiditas adeò alteraret, refrigeraretque ventriculum, & medelam nullam facile admitteret, experientia nobis compertum esset.

De radice verò chinæ, ligno saffrafras & similibus quæ per sudorem materiam impediens curationem, discutunt, & consequenter partes multa humiditate inebriatas, non verò primario sed per accidens exiccant & roborant, frigiditatem emendant, & caliditatem partibus singulis, adeoque universo corpori restitunt, & naturalem tonum temperamenti totius feliciter quantum natura admittit restaurant, non diversum iudicium ferre possumus.

Cum enim omnes vires quas thermarum potus comites habet, non ea naturæ amicitia, & simplicitate in promptu habeant, sed frequenter admixtione aliorum remediorum illis necesse sit, nemo non videt, præferendum esse id auxilium quod est potens, simplex & magis gratum.

Ex quibus omnibus manifestum, planumque est, Celsitudinem suam valetudinis suæ integritatem per nullum remedium facilius perfectiusque recuperaturam, quam per potum Thermarum Carolinarum, quas sua Cels. præmissâ debita præparatione corporis per evacuationes prius facta sub autumnum, æterno & propitio Deo benè & feliciter fortunante adire, & salubriter bibere poterit.

Interim, perinde ut paulò antè mentio facta est, consuetis remediis aperientibus & nodulis purgantibus, roborantibusque auxiliis uti poterit: eâ tamen lege, ut victus rationi diligentissimè imò rigidius observandæ S. Cels. non obliviscatur.

Inter cætera maximè addendum videtur hoc, ne suâ Cels. illi metu & tristitiæ locum cedat, à meditationibus, multâ lectione & laboribus animi, cruditas catharrorum & tussis parentibus, abstineat, & caput adversus frigidum & aquilonium aërem ità defendat & muniat, ne
tussim

tussim de novo recidivam frequenter facientem exasperet. Id enim, nisi, non dicam diligenter sed superstitiosè, factum fuerit, verendum est, ne ex frequenti recidiva catharrus excitetur non facile solubilis, imò ità pertinax, ut à pulmonibus maximâ difficultate diverti aut curari possit.

Æternus Deus nostris ex methodo & rectâ ratione inventis remediis, ità benedicat ut vestra Illustris Celsitudo, etiam cum iis, qui perfectè valere se se jactitant, certare possit. Cujus benignissimæ protectionis, Ill. vestram Cels. cum universa illustri sua familia submissè & debita animi subjectione atque reverentia fideliter commendamus.

CONSILIUM LVII.

PRO QUODAM CACHECTICO ET LIENOSO, ACIDULIS IN THERMIS CAROLINIS USURO.

Nobilissime Heros, cum hætenus in morbo depellendo felices fecerimus progressus, isque nihilominus haud eradicatus est totaliter, verendumque, ut denuò nova ejusdem repullulent semina: svaferim, ut quemadmodum ante annum feliciter usus es aquâ thermarum: ita horum aquâ utaris acidâ, quæ & ipsa eodem in oppidulo habetur. Haudquaquam verò id faciendum præcipitanter & temerè; sed maturis deliberationibus præmissis. Svaferim itaque domi usum præparantium medicamentorum præmitti, eo, quo ante annum id factum modo. Postquam te in oppidulum illud conferas, initiumque, medium & finem teneas, uti ante annum præscripsi. Sed cum grano salis. Manè cum serenitas erit, (extra hanc afferri cures per Ministrum) postque lotio, stercore & lavivâ levatus es, & postquam particulam morsulorum sumseris, ipse pedibus eas ad acidulas, ipse haurias, ipse poculum utraque manu fomentatum & calefactum quasi, evacues. Numerus cyathorum septenarium non transcendat. Hi septem cyathi per 14. dies continuentur, postea singulis diebus, minoretur numerus, ut antea quotidie abactus.

Ab acidulis domum reversus, primo die decumbas & sudes per dimidiam horam sequenti, per 3. horæ quadrantes, à quarto usque ad decimum sudes duas horas, sesquialteram, 3. quadrantes, dimidiam horam.

Post

Post meridiem hora à prandio peracto tertiâ , primâ die iterum generosus Dominus ambulet & acidulas (vel cœlo nubilo curet afferri) bibat duos cyathos : inambulet post usum , sudet sub strangulis per 3. quadrantes horæ. Hosce pomeridianos calices usque ad diem quantum adaugeat usque ad ternarium : & ita continuet & post 18. minuat ut supradictum.

Vesperī commessatiuncula loco primâ die hora 3. post coenam , unum cyathum ebibat , inambulet , cubitum se conferat. Die 4. usque 18. bibat 3. cyathos &c.

Semper etiam utatur pilulis , enemate , purgantibus , morsulis , electuariis &c. more solito.

Solent quidam in prandiis & cœnis vino suo immiscere aquam acidulorum : hunc morem non planè approbo. Consultius fortasse erit, vino bono , puro & puto inter prandendum fruisi.

REGULÆ.

1. Si primo & secundo die bibitionum nil quod copiosum sit , excernatur , ne metuas. Primis enim diebus venæ plusculum insoliti potus attrahunt.

2. Si vis operari eas per urinas , adde mel vel julepum : si per alvum , adde sal.

3. Si per urinam multum operantur , minus operantur per alvum & contra.

4. Cave , unquam unâ die simul laveris , simulque bibas.

5. Comessatiuncula antenocturna penitus prohibita esto.

CONSILIUM LIIIX.

IN IMBECILLITATE ET OBSTRUCTIONE LIENIS CUM INFLATIONE.

Imbecillum , obstructum & inflatum Lienem Dominum habere , apparet ex ariditate oris , appetentiaque frigidioris cibi & potus. Accedit ventriculi debilitas , cui inordinate bibendo & edendo vis illata , & facultas coctrix infirmata : unde etiam quandoque compressio & dolor , quandoque etiam inappetentia exurgit. Utatur itaque manè Bolo A. hora 7. & jejuset ad 10 usque. Mox nodulo B. superfundat libjs cerevisiæ optimæ lupulo abundantis , atque tam diu coquat , quamdiu pisces coqui assolent. Nodulum C. adjungat & tractet ut moris est. Ter-

Tertio die quiescat, & Medianam sinistri brachii aperiat, dum quatuor unciaë sanguinis exierint, altero die & sequentibus pergat bibendo, usque ad superfusi liquoris consumptionem. Iterum diem unum quiescat, & deinde utatur pilulis D. sequentibus verò diebus singulis, lectum egressus, & à prandio circa horam tertiam lienem unguento G. calidè inungat, duplici linteolo superinjecto. Inunctus extemplo morsulum F. comedat, & usque ad tempus consuetum jejUNET. Pergat donec medicinarum nihil supersit. Ad roborandum autem ventriculum cubitum iturus utatur Tragæa E. quantum dimidium ovi putamen capere potest, neque quicquam superbibat, Ita symptomata evanescent. Vitandæ autem carnes infumatæ, pisces exiccati aut infumati quilibet. Carnes quoque ferinæ, præcipuè rancidæ, bubulæ item veteres ac duræ, quemadmodum etiam omnes aviculæ in aquis degentes. Nocent item legumina. Nasturtium verò & cichorium sativum quandoque proderunt. Lacticia & fructus quique vitandi, ut & cibi duri ac pingves. Cerevisiæ cum lingua cervina & carduo benedicto præparata in principio prandii sanitati plurimum conduceret. De reliquis rebus non naturalibus nihil amplius addam. Deus hisce omnibus benedicat.

Recip. Spec. elect. Elefscop. ℥j

Elect. leniti vi ℥ss

Ol. anisi gr. j.

Mis. c. s. icharo, fiat bolus.

S. Electuarium A.

Recip. Cort. rad. cappar. ℥iijss

Thamarisc

Fraxini ā. ℥iij

Cichorii ℥j

Glycyrrhiza ℥ss

Sem. dauci

Aquilegia ā ℥js

Plantag. ℥ss

Rad. mechoacan. ℥j

Rhabarb. opt. ℥iij

Spic. ℥j

Agar. trocisc. 3v

Fol. Sennæ ℥iijss

Epithym. Cret. ℥j

Herb. Betonic. Mj

T t

Cete

Ceterach

Spicantbi

Ling. cervina ā. Mß

Veronica

Cardui bened.

Adiantbi nig. ā. pjs

Pulegii pjs

Cichorti Mj

Pulverisata omnia subtilissimè ligentur in nodulo factò ex sindone rubro duplici, & S. Nodulus G.

Recip. Cort. rad. elleb. nig. styr. præp. Zij

Caryophyllor. 3js

Pulverisata ligentur in nodulo factò ex sindone duplici.

S. Nodulus B.

Recip. Sem. coriandri præp. 3ß

Anisi, fœniculi ā. 3js

Cinamomi 3iij

Caryophyllor. 3j

Sachari rosat. tabulat. 3ij

F. l. a. Tragea.

S. Tragea stomachalis E.

Recip. Mass. pill. aggregat. 3ij

Ammoniacy in aceto scyllitico dissol. gr. xvij

Dacrydii gr. j.

Cum pul. cort. rad. Thamaris.

F. pill. n. xxiiij. S. Catapotia D.

Recip. Trocisc. de caparib. 3ij

Cinamomi 3ij

Caryophyll. 3ß

Spec. diarrhod. Abbat. 3js

Cort. citri cond. & incis. 3ß

Rad. cichor. condit. & incis. 3ij

Conser. capill. vener. 3iij

Ol. macis destill. gr. vj.

Sach. alb. solut. in aq. scolopend. q. s.

F. con-

*F. confect. in morsulis.**S. Morsunculi F.*Recip. *Bdelli, ammoniaci* ā. ʒij. *dissol. in aceto scyllitico.**Ol. amigdal. dul. de capparib.* ā. ʒss*Axung. procin.* ʒv*Ol. laurini* ʒiij*Agar. pulverisati* ʒij*Cori. rad. cappar. rad. elleb. nig. styr.* ā. ʒjʃ.*Cera* q. s.*F. Unguentum G.*

CONSILIVM LIX.

EXOTERICUM CUIUSDAM PSEUDOCHEMISTÆ OUIROMANTICI IN OBSTRUCTIONE LIENIS, IDEO TRANSLATUM ET INSERTUM, UT CONSILIO SEQUENTI ADDITA CONFUTATIO CUM HOCIPSO CONFERRI POSSET.

Illustrissime &c. Ex urinâ ad me transmissa, beneficio *δοκιμασίας ἐρωμαυτιῆς*, deprehendi, epar in obstructions proclive. Hæ si radices egeret profundiores, inflammationes subsequenter & purredines. Quin imò ex ipso jam in promptu, urinâ eâdem indice, adsunt quippe interdum calores quidam vagi erratici & transitorii. Cum præterea epatis officium sit, ut ad torris cuiusdam subjecti instar, in ventriculo concoctionem efficiat, at verò idipsum Epar à temperatura sui caloris justâ in hoc ægro recesserit. Prodit inde, tanquam ex equo quodam Trojano concoctio inordinata. Hæc inæqualem producit appetitum, unâ cum crudo ventriculo. Hinc verò sursum attolluntur contaminati vapores, lumbos & cerebrum impetentes. Pulmones quidem ab iisdem intumescunt, cum difficili respiratione & althmate. Cerebrum humidum nimis, nimisque fit fluxum, quod tinnitus subsequuntur aurium, odontalgia, capitisque gravedines aliæ. Quod si iidem vapores in cerebro resolvantur, ad pulvæ cuiusdam morem decidunt in artus, pulmones & tho-

racem Artubus lassitudines creantur, pulmonibus verò & thoraci repentina anxietas, cum suffocationis periculo, tremore cordis, & animi deliquio. Hæ tamen ægriitudines ad unam omnes transeunt, si defluxiones eadem hinc inde dissipentur, vel per vomitus & expectorationes expellantur. Posset verò casu venire, ut fluxus iidem non nubis sed cataractæ instar decidant, apoplexiamque inducant. quod ut ne fiat divinum numen exorandum. Porro in urina animadverto contineri rubras albasque arenulas, in lumbis vel renibus generatas, quæ dubio procul dolores interdum cieant. Hisce immaturè remedia fuerint opposita, sequetur paulò post affectus Ischiadicus. De liene affirmo, me nihil quicquam in urina deprehendere, quod malam ejus dispositionem insinuet. Cum verò nihilominus Illustrissimus princeps, de gravaminibus sinistri conqueratur hypochondrii, vero est consentaneum, nulla à liene obstructissimo emissi posse excrementa, sed illa ipsa in liene permanere, tanquam matrici inclusa suæ. Multoties enim ita solet fieri, ut in urinis multi morbi permaneant invisibiles, usque dum medicamenta eam ad rem adhibeantur, & dum demum ex urinis iidem agnoscantur. Cum ergò proprium quiddam sit lieni, quartanas putrefactiones oppilationesque efficere, rectè à Paracelso dictum, hominem longè diutius victurum, si sine liene creatus esset, ac si lienem habeat. Et consultum esset utique, medicamenta adhiberi, lieni non tantum resistentia, sed & vires ejus tantum in enervantia, ut ne ultrà tantarum calamitatum fax & tuba esset.

Curam postea quod attinet malis hisce apponendam, svaserim, eparante omnia infractibus expediri suis aliisque liberari symptomatis. Custodiendus quoque ventriculus, uti & cerebrum, ne & illa pessum ire pergant. A malitiâ enim ventriculi existeret Orexis & Arsura : à malitiâ cerebri produceretur Mania, vertigo, Phrenesis, uti & arthetica. Loco medicamentorum, quæ epatis inflammationes extinguunt, obstructionemque referabunt, sit Magisterium Perlarum, cujus ʒjss pro dosibus sumatur auroris continuis : ab usu ejus sudetur ; sic enim non tantum ægriitudines submovebuntur epatis, sed & illæ perlæ sunt summa pulmonis laticia, appropriatumque & præservativum & curativum in asthmate vel phthisi. Pro ventriculi custodia, electuarium paretur de granis Juniperi, cui Maces, galanga & zinziber, prout habet descriptio immisceantur. Sumatur hujus particula juglandis quantitate in fine coenæ & prandii. Pro custodiendo cerebro, posito paretur ex acoro, benedictæ, caryophyllatæ Sambuci floribus, majorana & Euphrasia. Hæ
spe-

species includantur sacculo, & in vasculum inditæ, vino infundantur. Post octiduum de eo bibatur tum in coena, tum in prandio. Hujus electuarii usus, ut dictum per 4. septimanas si continuetur, præcavet & avertit omnes supradictas infirmitates, quæ metuendæ aliàs forent. Satius tamen esset calce herbas & radices, in autumno, vasculo includi, id verò musto repleri, & ita effervesce. Sic enim per integrum annum vini illius copia haberi posset.

Arenam quod attinet, & sabulum, quæ in urinâ Ill. V. C. apparent, svaserim simpliciter, illas arenulas hæc in cura simul egeri. Sin minus, fiat potio è vino & aquilegio spinoso unâ cum suis additionibus. De hac bibatur. Per quam commodum insuper esset, huic potioni addi (certo tamen pondere) magisterium crystallorum, quod universale medicamentum est adversus omnis generis tartareos morbos, uti Paracellus tractatu de Magisteriis loquitur. Ut insuper curetur lien, hujusque rescecetur malitia, destillatum oleum è camphora & opopanace, ad extra inungendum. Removet hoc omnes dolores, & si annuatim usurpetur, lienem absumit secundum vera fundamenta, adeò ut nulla ulterius malitiæ alicujus agnosci queant vestigia. Ut verò, meo quidem consilio, prædicti lienis dolores citius sedentur & aboleantur, destillandus est è tartaro balsamus, qui pro facultate suâ quâ pollet balsamica, omnes avertit putrefactiones nervos venasque penetrat, membra principalia confirmat, omnes Tartari generationes resolvit & expellit: unde Paracellus in contracturis & Podagra mirificis eum extollit præconiis, sicuti & ego eo ipso in aneurismatibus, aliisque venarum, nervorum, arteriarum & ligamentorum dissectionibus, sine omni tumore, sine remanente movendi impotentia vel ex ulceratione, coram meo emplastro fodicativo, quod sine experientia nec ipse credidissem, summo Deo juvante, feliciter & miraculosè curavi, in integrumque restitui.

Hoc de Balsamo, jubente Paracelso, singulis diebus pro una dosi quatuor sumantur guttæ in vino, nimirum manè, circa meridiem & vespere. Aufert hic balsamus omnes lienis ægritudines, obstructions referat, depellit astma, & omnes coagulationes tartareas & molestias, in membris interioribus subortas.

Quanquam autem hæc Medicamenta S. V. C. suspecta esse prævideam, svaserim tamen, ea parari, ne quid negligatur. Experimentum fiat in aliis primo. Ipse etiam iisdem sum usus.

Colophonis loco monuerim, multiplices particulares curas missas fieri, & eorundem loco in usum vocari magna illa confortantia, uti

sunt Aurum potabile, Essentia croci & corallorum. Hæc erant, quæ monere & respondere volueram.

*CENSURA RATIONALIS ET DOGMATICA, SUPER PRÆCEDENTEM
EMPEIRICI PSEUDOCHYMISTÆ EXOTERICUM
CONSILIUM.*

Illuſtr. ac Celiſſime &c. Poſteaquam Tua ſerenitas conſilium Empei-
rici cujuſdam noſtræ ſubjecerat Cenſuræ, de reſolutione ad idem po-
ſtulatam fuimus felicit.

Primò itaque autor illius conſilii ſibi ipſi diſſidet. In principio enim omnes hæce affectiones ad unum conatur redigere principium, nimirum OBSTRUCTIONEM: paulò verò poſt eâ ab opinatione digreditur, dum non tantum ſingulis hiſce complicatis affectibus ſingulas rationes formales affingit, ſed & tot ferè morbos Tuam ſerenitatem affligi comminiſcitur, quot membra in univerſo extant corpore. Momus noctis & ſomni, ſecundum Heſiodum & Lucianum filius, & ipſum Jovem erraſſe aſſeverabit, eo quod in fabricando homine nullum, quod cordis reſſibus cognoscendis inſerviret, condidiſſet oſtium. Eodem modo & noſter Empeiricus, noctis & ſomniorum filius vel rectius pater, Deum carpit, qui pro abrumpenda vitæ tela lienem condiderit, idque tandem divinæ imputat invidiæ. Si ita eſt, ut ais Momule ſomnia-
tor, vera narras. Quod ſi omninò Chymicus, audi & Chymicas condi-
ti lienis cauſas. Ventriculus eſt digeſtionis Chymicæ vel præparatio-
nis cucurbita vel vaſculum ab epate incaleſcens. A. cibus non ſalitis
naufear ventriculus. Succus autem Melancholicus, qui è liene in ven-
triculum pro corroboratione mittitur, acetum eſt, ſal eſt, vitriolatus eſt.
Vides jam ventriculo & reliquis conſequenter membris Lienem per ſe non
obefſe, ſed per accidens. Mirum me hercle, quod Jehova protopla-
ſtum te inconfulto, condiderit. Paracellum allegas, alleges ſanè. Pa-
roemias ille locutus eſt & parabolas, nec mihi undiquaque perſpectas,
à tuis verò oculis penitus abſconditas. Quin imò in principio de cau-
ſâ morbi loquebatur ille phantaſticus, de liene ſilentiffimum erat ſilen-
tium: jam verò univerſam eò dirigit therapeuſin.


Mirè poſtea rhetoricatur, de imbecillitate caloris ventriculi, quam
ex urinâ deſtillata deprehendit. Quantum verò calor ille ventriculi
particularis à calore corporis univerſali reſſerit, non aſſignat, imò
nec poteſt quidem. Atqui illuc in curatione tanquam ad præfixum colli-
mandum eſt ſcopum, non enim ſimpliciter ſciendum, quod calor ven-
tricu-

culi sit imminutus, sed quantum sit imminutus, sciendum. Patescit nitius ipsius inconstantia, dum obstructionem, quam causam, fundamentum & fontem reliquarum ægitudinum statuerat, jam missum ciet, aliosque in curatione sibi præfigit scopos.

Errat præterea in proportionem medicamenti ad morbum. Magister Perlarum, per triduum exhibiro, epas restituet, ut ait, omnesque ætatis affectiones. Errat certè in proportionem medicamenti ad morbum, errat in proportionem temporis, ad morbum verè chronicum, errat in cultate ipsius medicamenti.

Perlæ cordiale sunt medicamentum, non epaticum. Chymicos maiores consulat, ille agyrta. Dicent ii, sat scio, Margaritas præ se fer- signaturam guttulæ spermatis humani, ideoque iis pro corroboran- & promovenda vitali facultate utendum.

Objici hîc mihi posset à quodam saniore : Atqui perlis salubriter imur in affectionibus melancholicis, qui ex obstructione epatis & ve- rum mesenterii oriuntur ? Euge bene est, quam truculentæ & cali- fimæ facultati vitali molestiæ ab affectibus illis melancholicis creentur, usquam notum. Hisce symptomatibus Margaritæ opponuntur per se, æctioni hypochondriacæ *Ἰσχυροβελγνός*. Ejusdem furfuris & reliqua nt, quæ de Balsamo tartari aliisque utopiæ fabulatur remediis. Quæ æterea de Apoplexia, pulvis & catarractis profert seriò, non nisi sva- es sunt joci. Proditur ibidem manifestè, se calidi nativi essentia tur- fimâ duci ignoratione. Certè semet ipsum prodit tanquam sorex : & tacuisset, Philosophus posthac putativus mansisset. Atqui cum cer- m sit, in curatione morbi, quo cum Illust. T. S. molestatur, unicè agendum, ut tum calor particularis viscerum læsorum ad harmoniam ducatur universi corporis, tum ut omnia ejus rei obstacula remove- tur, idque non minus medicamentis idoneis, quam rigidâ sex rerum non naturalium observatione : nequaquam sincerâ mente compilatori huic suffragari possumus.



CONSILIUM LX.

IN HYPOCHONDRIACA, EX TUMORE
SPLENIS ET FLUXU HÆMORRHOIDUM.

Nobilissime & generose vir, quo affectu pro tempore conflicteris, tum ex tua tum ex Medici tui relatione, abundè cognovi. In venis enim venæ portæ, quæ ab liene versus colon tendunt, ibidemque hæmorrhoides, quæ splenicæ & internas dictas, constituunt, jam olim copia adfuit materiæ melancholicæ, pituitosæ & biliosæ inæqualiter permixtæ. Ibidem ob obstructas vias angustissimas detenta, accedente & prohibitâ transpiratione, plus justo incaluit, computruit, inque saniem biliosam conversa fuit. Inde verò per venas dictas, multo suffuso sanguine per alvum excreta fuit. Cum autem fluxus ille Dei beneficio per competentes Medicinas fuerit inhibitus: Tu etiam metuas, ut ne recidivam patiaris illius morbi, sicque posteriora deteriore fiant prioribus, proinde illuc, tanquam ad præfixum scopum collimabit Medicus, ut à malo illo præserveris. Clarius loquar: dispiciendum, ut ne denuò materies ejusmodi colligatur, quæ fluxum saniosum & sanguinolentum concitet, Eadem verò opera quod fluxus ille à vitiosis producatur humoribus, cautio adhibenda, unde, ubi & quomodo vitiosi ii humores generentur. Pendet ergo eorum generatio ab imbecillitate ventriculi. Cibos ipse non satis excoquit, sed in succum convertit crassum, crudum, melancholicum. Hoc vitium in secunda coctione, quæ in epate fit & venis Mesaraicis, adaugetur amplius, Chylus n. in epate trallatus, in viscidam, glutinosam biliosam & melancholicam convertitur substantiam. In venis mesaraicis postmodum, dum revehitur, subsistet eadem materies. Lien insuper quod natura sit justo frigidius & humidius, nequaquam sufficiente Chymum eum expurgat. Dum ergò ita in angustissimis illis venulis subsistit conclusus & compactus, minimè per consuetas vias excerni potest. Hinc primò omnium Melancholia existit hypochondriaca flatulenta. Subsequitur tumor splenis flatulentus. Hinc se se offert fluxus hæmorrhoidum, qui duplici dolore molestus est. Primo quidem, quo sanguis melancholicus bile & pituitâ permixtus venas quandoque oppleat intestini recti, è quo dolor existit tensivus. Altero verò modo quod succus ille vitiosus ad extremum ambitum intestini recti propellatur.

latur ibidemque dolorem excitet punctorium. Adaugetur iste, & κρησινόδης evadit, & γλυκίπικρος, si multum bilis vel pituitæ falsæ subfit.

CURATIO.

Penitissimè in hunc incumbendum est scopum, ut ne iterum ejusmodi generetur in venis mesenterii materies. Metuendum quippè id omnino, quod natura sit rapacissima similium. Dein verò, si fortasse jam modo tale quid in mesaraicis collectum, maturè ut removeatur, videndum erit. Nunquam verò hoc expeditum dabitur, antequam causæ eam materiam generantes, resercentur penitus. Cum enim curatio hæc præservatoria, ad causas remotiores omnis dirigenda intentio.

Causæ eæ remotiores sunt bipartitæ, Internæ & Externæ. Internæ sunt inæqualis viscerum principum intemperies: puta ventriculi, Lienis, epatis. Singula si examinentur clariora erunt omnia.

Ventriculum frigidum esse & siccum, ostendit flatuum crebrorum generatio.

Objicis mihi Hippocratis oraculum: si quis multum expuat hoc melancholicum est: Ergò quod expertum est, hypochondriaci os habent humiditate copiosâ refertissimum: & consequenter non sunt sicci, sed humidissimi. Respondeo, ad causam hujus humiditatis, qua os imbutum est, respiciendum. Ventriculus nequaquam laborat humidâ, intemperie, sed siccâ. Unde verò illa oris humiditas? obstructæ sunt venæ mesaraicæ. Orificia ea, per quæ humiditas naturalis esset deducenda, sunt obstructissima: proinde ea humiditas in ventriculum & os regurgitat.

Constat ergò, quod ventriculus, qui primæ coctionis est culina, intemperie conflictetur frigidâ & siccâ: quod etiam consequenter vitium primæ coctionis committatur.

Epar officina secundæ coctionis in hoc ægro plus justo est calidius. In eo itaque chylus jam antè vitiosus adurit, & in sanguinem illaudabilem, phlegmaticum & salfuginosum convertitur. Phlegmaticus cum iste sanguis, in venis permanet mesaraicis, quod nequaquam ulterius promoveri possit, ob loci angustiam & materiæ ineptitudinem.

Lien à natura tibi frigidus est & humidus. Humidus cum sit, transmissum ab epate sanguinem neutiquam sufficienter attrahit. Cum sit frigidus, sanguis melancholicus nequaquam à reliqua massa sanguinis dirimitur & separatur, sed ibidem hæret, & ex caloris imbecillitate in flatus resolvitur. Hinc verò tumor splenis flatulentus; hinc etiam dolor ille gravativus vel ponderosus. Postquam verò frigida ea mate-

ries in tantum excrevit, ut è quantitate & qualitate, toti naturæ sit inimica : ibi verò demum natura ad expulsionem insurgit & per venas hæmorrhoidales ad intestinum rectum & ejus extremam oram protrudit. Inde verò dolores, inde & fluxus hæmorrhoidalis.

Sequuntur jam causæ externæ. Ex autem materiæ in corpore collectæ vitiositatem haut segniter promovent & accumulunt.

Sunt ex : aër, cibus & potus, somnus & vigiliæ, motus & quies, inanitio & repletio, tandemque affectus animi. Vocantur ex à Medicis res non naturales, eò quod nisi exquisita eorum habita fuerit ratio, hominem facilimè de statu sanitatis naturali in morbosum præcipitent. Quia verò causæ tam internæ, quàm externæ nequaquam resecari possint, ni prius impedimenta, quæ in mesaraicis & viis latent communibus, remonentur, primò omnium eorum tentanda demolitio. Pro eorum ergò evacuatione pillulæ A. recipiantur, horis tribus ante prandium.

Recip. *Mass. pill. de hiera c. agarico* ℥j

Aggregat. ℥j

Dacryd. gr. j.

Cum aq. agrimon. f. pill. n. xvij

S. Pillen. A.

Sequenti die horis matutinis sumantur trës unciaë, vel quod idem fere est, tria cochlearia succi B. qui sequitur.

Recip. *Rad. cichor.* ℥ß

Scorzoner. ℥j

Eryng.

Asparagi a. ℥j

Cort. Rad. cappar. ℥s

Thamariss.

Fraxi i a. ℥j

Calam. aromat.

Zedoar. a. ℥iiij

Rad. Imperator. ℥ß

Meu ℥ij

Polypod. quer. ℥ij

Glycyrrhiza ℥js

Passular. ℥ijs

Sem. dauci ℥ß

Aquileg. ℥iiij

Portulaca

Endivia ā. ʒij

4. Sem. frig. major. ā. ʒi

Herb. Ceterach.

Spicanth.

Ling. cerv. ā. Mj

Adiantum nig.

Capill. vener. ā. Mj

Bedonica Mj

Chamaedrios

Pulegii

Agrimoni.

Millefol. ā. Mj

Epatica trifol. nob.

Cichorii

Endivia

Fumaria ā. Mj

Coq. in s. q. aq. scolopend. beton. & borrag. pro lib. ijs. Colatura dividatur in duas partes : quarum prima sit lib. js. altera lib. j.

In prima parte colaturæ ebulliant.

Fol. Senna selectiss ʒiij

Epithymi cret. ʒjs

Thymi

Flor. stæchad. arab. ā. pjs

Post ebullitionem stent in loco calido per horas tres, postea colentur sine expressione, pra ʒx.

In altera parte colaturæ coquantur.

Cortic. rad. Elleb. nig. styr. præp. ʒiij

Caryophyl. ʒijs

Coq. ad consumm. ferè ʒiiij. deinde adde mirobat. cheb. ol. amigd. dul. præp.

Citrinor.

Indor. ā. ʒijs

Cort. citri ʒij

Satis cocta colentur : hac colatura addatur priori ex foliis senna facta : & in utrisque ligata in nodulo bulliant.

Agar. rec. trociscati ʒi

Rhabarb. inter. & opt. ʒij

Spice Ind. ʒj

Uu 2

Stent

*Stent per noctem in infusione : manè expressus fornicer addi
symp. de scolopend.*

de corticib. citri c. mosc. ā. ℥iij

Sachari albiss. ℥iij

Cog. ad formam syrupi liquidioris.

S. Cassi. B.

Ufus ejus diebus singulis, quam diu durat, hor. 6. cochlearia quatuor vel unciae tres. In usu addantur semper sequentes olei gut. 2. vel 3. agitentur cochleari, ebibantur : maneatur in lecto per horam, sine somno : prandium ultra horam decimam non differatur.

Recip. Olei de corticib. citri ℥j

S. Dehl. C.

Ufu hujus succi quotidiano materia peccans sine calefactione per *Trinegon* per sedes & urinas evacuabitur : via etiam pro roboratione principium partium expeditissimè sternetur. Quod si fortassè, ut hoc addam, quolibet die quater ad excretionem succus iste non instigarit, cochlearia imposterum non quatuor sed sex sumenda esse noveris. Quod si tunc nimis magna sequeretur excretionum copia, uno die 4. altera 6. cochlearia, permutatim recipiuntur. Quando autem omnium primò bis de hoc succo, per dies nempe duos, debitum demensum receperit, tertius dies quieti dandus. Licet autem die eâ tertiâ nihil quicquam assumatur succi, eâdem tamen Media dextri brachii pro eventatione caloris in epate, incidenda, emittendo sanguinis ℥iij vel iiij.

Sequenti die ad usum succi revertetur, idque continuet, usque dum totum succum absumserit. Id ubi factum, die uno sit quies, sequenti sumat pillulas D. manè hora 6.

Recip. Mass. pill. coch. ℥ss

De hier. c. agar. ℥ss

Aggregat. 3ss.

Ammoniâ in aceto squillit. dissol. ℥s

Cum pulv. ceterach. F. pill. n. xvij

S. Pillen D.

Proderunt istæ plurimum venis Mesaraicis ad lienem tendentibus, ut & lieni ipsi. Causas etiam materiales non parum tollent. Hoc ubi factum fuerit, descendendum ad corroboranda principalia viscera. Ad id prodest universaliter Mithridatium nostrum E. quod universis prodest visceribus.

Recip.

Recip. *Mithridat. opt* ʒi
Conser, rosar.
Anthos ā. ʒi
Mis. S. Mithridat E.

Sumatur manè hor. v. unâ vice : maneat in lecto, ad hor. usque ij. dormiat, non sudet, jejunet ad hor. usque decimam. Quod si post sum horum medicamentorum beneficiô alvi largo & liberali non frue-
 ar, curet sibi hor. 8. matut vel hor. 3. pomer. sequens injici enema ec-
 coproticum, litera F. notatum.

Recip. *Herb. parigitar. Mij*
Mercurial. Mj
Fol. lauri
Pulegii ā. Mß
Ceserach. Mj
Flor. chamomel.
Melilot.
Summit. aneth. ā. Mß
Sem. fœnugrac. ʒß
In colatura dissol.
Electuar. lenit. ʒij
Diacathol. ʒs
Diaphœnis ʒij
De baccis lauri ʒj
Mell. anthosaci ʒij
Mis. F. Enema.
S. Clystier. F.

Quod si usus fortasse requirat, aliis etiam temporibus non sine
 uctu applicari & poterit & debet. Hoc loci & hoc monendum,
 quod ipse in tua familia possis curare, ut enemata tibi parentur do-
 mestica. Solent enim quandoque gigni flatus, solent subsidere feces
 intestino recto : solent & aliæ obstructions suboriri. Eam ad rem
 quæ domestica parari possunt enemata.

Primum hoc esto. Recip. *luris gallinacei insulsi vel juris carniū*
non duratarum fumo, tantum quantum duæ paropsides falsa-
mentaria capiunt : Adde mellis ros. colati cochlearia qua-
tuoꝝ : Mis. F. Enema.

Secundum hoc esto, quod ad pruritum, & effervescentiam humorum in intestino recto erit appositissimum. Recip. *Tantum lactis, quantum tres capiant paropsides salsamentaria. Bulliat ijs flor. chamemel. manipulus unus. add. mell. violac. cochl. 4. Mis. f. Clyster.*

Quod si pruritus intestinum rectum non fatiget, adsit verò ibidem magna flatuum cōpia, tunc lacti incoquantur flores chamemel. Addatur *drachma baccar. lauri pulverisat. ebulliant. colentur: in colatura dissol. Mellis anchosati colate cochlearia 4. Mis. f. Clyster, lege artis applicandus.*

Tertium Enema. Recip. *Parietar. Mij flol. lauri herb. puleg. ā. dissol. chamemel. meliloti inter. flor. thul. ā. Mij. Coq. in jure carnis ad remanentiam duarum paropsidum salsamentarium: add mell. ros. colat. cochlearia 4. Misce f. Clyster.*

Absolutâ hâc generali per Mithridatium corroboratione, demum manè capiat Medicamenti G particulam in quantitate castancæ, cum jūnio ad hor. usque decimam,

Post merid. hor. 3. utatur Morsulis H. nihilque bibat vel comedat, nisi ipsa in cœnâ.

Recip. *Chebulo. condit. 3v*

Zinzib. Chinens cond. 3vj

Calam. arom. Cort. arant. citri

condit. ā. 3iij

Rad. cichor. cond. eryngii, bugloss. ā. 3v

Nuc. Ind. mos. cond. 3ij

Conser. absynth. bugloss. anthos ā. 3iij

Rosar. 3ß

Cinamomi crasso modo incis. macis

incis. ā. 3ß

Incidenda incidantur, & pulverisanda pulverisentur, & mis. cum Syrup. de corticib. citri cum moscho, addendo olei caryophyll. gt. ij.

F. Mixture. S. Stärkung. G.

Recip. *Spec. arom. ros. 3iij*

Diarrhod. Abb. diatrion santal 3ij

Rad. gent. alb. vera 3j

Trochis. de capparib. 3js

Conser. absynthii ℥iij

Flor. arant. citri cond. ā. ℥ij

Rad. cichor. cond. ℥ss

Cort. citri cond. & incis. ℥iij

Extract. Zeduar.

Galange

Calami arom. ā. gr. iij

sachari solut. in aq. cichor. q. s. in quo solutus extractis, cetera omnia misc. & consistant in morsulos aromatizatos cum ol. cinam. gt. V.

S. Morsellen. H.

Utrumque horum remediorum simul continuandum, usque dum consumantur. Respiciunt enim ventriculum, epas, lienem, & simul sum caput, quod in hypochondriaca plerumque *συνπύχξις*. Quoniam in per ventriculus non parum à naturali suâ complexione recesserit adeò flatu generet copiosos: ipsi pulvere stomachali I. subveniendum conferem.

Recip. Sem. coriand. præp. ℥vj

Fœnic. anisi ā. ℥js

Cinamomi ℥ij galange, calam ā. ℥j

Pæon. ℥j. glycyrrhiz ℥ss

Sach. ros. tabulat. ℥vj

Albiss. ℥j. M. f. Tragaa.

S. Magenpulver. I.

Sumatur de isto bis vel ter per septimanam vesperi, ante decubitus mensura dimidii cochlearis, nihil ulterius superbibendo. Eundem, modum post prandium, cum finis impositus poculis, in usum alioties revocari poterit. Eidem & ventriculo, ubi præsertim intumescit, proderit inunctio per oleum K. si nempè mane hor 7. ante usum corroborativi G. vel Morsellorum H. eò calido regio inungatur epigastrica.

Recip. Mastichis ℥ij

Galange ℥j

Spec. arom. ros. diacinam, ā. ℥j

Ol. caryophyll. nucista ā. gt. viij

Cyminig. iij

De absynth. & mentha ā. ℥ss

S. Dehl zum Magen.

Illinantur hoc concalefacto ventriculus, à præcordiis ad umbilicum usque, ad latitudinem orbiculi minoris : fiat autem & ipsa ea inunctio circulariter. Id ubi absolutum, pulvinar M. super imponendum, & a prandium usque detinendum.

Tempore prandii removeatur, post sumtum cibum applicandum de nuò, & ad coenam usque ibidem relinquendum. Noctu etiam removendum penitus. Priusquam autem imponatur, later recens octus, concalefactus vino perfundendus, eidem pulvinar imponendum, ut vaporem eum imbibat : tandem verò vel tepidum vel calidum gastricæ regioni imponendum.

Recip. *Fol. mentha. absynth. ā. ʒiij*
Macer. cardamon. nuc. mosch. ā. ʒj
Spic. nard. cinamom. ā. ʒijs
Rad. Imperator. meu. ā. ʒß
Corall. alb. & rub. ā. ʒß
Rosar. rub. pis.

Trita & crasso modo contusa aptentur in sindone, intersuta ad formam chartæ, quam mitto.

S. Magenfüßlein. M.

Epati refrigerando, per venæ sectionem: corroborando, per superiora medicamenta satis consultum est.

Lieni verò, qui intemperie laborat frigidâ & humidâ, & propter imbecillitatem caloris nativi humorem generat melancholicum terrestrem & ficcum, flatusque generat, & tumores flatulentos, summo pere prospiciendum. Est is primo calefaciendus, pro excitando calore externo. Dein discutiendi flatus. Tertiò materia melancholica expellenda. Primus scopus complebitur per fomentationem N.

Recip. *Rad. Imperator. meu. ā. ʒiij*
Elenii, cucum. osin. ā. ʒvj
Alibea ʒjs
Cort. rad. cappar. ʒiij
Thamaris. fraxin. ā. ʒiij
Ficuum ping. n. vj
Baccar. lauri ʒj
Sem. portulacæ ʒß
Dauci ʒijs
Herb. pulegii Mj
Ceterach. spicantib. ling. cer. ā. Ms

Fol. jenne Mj

Flor. chamomel. melilot. ā. Mj

Summi. aneth. Aß

Fol. pariet. r. Aiß.

Flor. malvaris. Aß.

Dentur incisa & conquassata ad chartam.

S. Stenter zur fomenta in i.

Capiuntur autem filices, auro quasi micantes indantur ii igniti in aquam fluvialem vel fontanam, ut ita extinguantur. Repetitor hoc septies. Quod si ejusmodi filices in promiu non sint, eorum loco capiuntur duæ chalybis particulæ, quæ ignitæ septies aquâ extinguuntur. Aqua eâ chalybeata affunditur sacco herbis N. conferto, ad supereminentiam sex digitorum, in ollam recentem, quæ tamen aquâ simplici jam antè optimè excocta fuerit. Coquantur ibidem omnia, quam diu fortasse piscis juste coquitur. Dein verò aceti rosacei tantum, quantum paropsis capit fassamentaria, affunditur, iterum ebulliunt omnia, tandemque finis. Aqua hæc in usu sit calida. In eam enim sponsia sex digitos lata, octo longa, niditur, interque duos ligneos orbiculos leviter exprimitur, & secundum longitudinem costis spuris sinistri hypochondrii applicatur. Detinetur ibi per quadrantem ferè horæ, quoties insuper refrigeratur sponsia, toties calefacienda iterum, dum in aquam eam calidam ingeritur, leviter exprimitur, iterumque parti applicatur. Peractâ hac fomentatione, locus ille, pro discussione flatuum, unguento O. perungitur.

Recip. Ol. de capparib. ʒjs

Anethini

Rutacci ā. ʒj

Vini sublimati

Aceti acerrimi ā. ʒij

Rad. fic. cyclamin. ā. ʒij

Centaurii minor. ʒj

Terenda terantur & bulliant in iquoribus usque ad olei residuum.

Expressis adde

Ammoniaci

Bdekii

Opopanax.

Serapini

in aceto squillitico dissolut. ā. ʒij

*Butiunt iterum & adjecta pauca cera, affusisque Ol. anethi.
& cymini destil. ā. gt. V.*

F. linimentum. S. Milkfalbe O.

Post illinitionem istam lieni imponendum Emplastrum P. sepefactum. Roborabitur eo Lien, & expellentur noxia.

Recip. Agarici albiss. ℥ij

Cort. rad. elleb. nig. ℥ijs

Thamaris. ℥iij

Capparor. ℥j

Mucilag. sem. lini. fœnugrac. ā. ℥ss

Psylli ℥ij

Galbani

Bdellii

Ammoniaci

} in aceto dissol. ā. ℥js

Ol. Chamomel. & laurini ā. q. s.

Adipis Taxi ℥ss

Croci ℥j

Affusio ol. cymini destill. gt. V.

F. adjecta pauca cera cerorum.

S. Milkpflaster P.

Tali ergo ingenio causæ morbificæ omnes ad vivum, ut spero, rescabuntur. Coquentur & morbus cessabit ipse, fluxusque sistetur hæmorrhoidum, qui tales tantosque recti intestini dolores excitavit hætenus. Quod si dolores ii quos causam hæmorrhoides, reversionem fecerint, quod ob potum vini calidioris, ut & ob vecturam per loca saxosa facile fieret: ibi verò hoc resistendum modo. Capiantur flores vel verbasci vel chamæmeli: nidantur ii in pulvinar vel sacculum lin-teum, & aquâ incoquantur. Indidem eximitur sacculus, applicator recto intestino, omnisque cessabit propediem dolor. Quod si fortè non cedat, portio unguenti ex assellis vel alterius ex volatilibus gossipio inungatur, locoque dolenti adjungatur. Melius sese habebit res ista, lat scio.

Quomodo etiam hoc malum per commodam diætam averruncandum, jam sum dicturus. Brevissimè tamen, eò quod abundè de iis actum in superiori consilio.

Aerem hoc loci relinquam intactum, ut & motum & quietem, somnum & vigilias, repletionem & inanitionem, Curæ & industriæ Medicorum domesticorum id committo.

Affectus animi, tu ipse, generose Domine pro eà, quæ in te est prudentia, moderabere.

Sola victus ratio, cum ab ea malè administrata causæ hypochondriorum morbificæ generentur, exquisitissimè attendenda.

In victu eo novem considerentur.

1. Substantia.
2. Qualitas.
3. Modus præparandi.
4. Tempus.
5. Ordo assumendi.
6. Modus masticandi.
7. Quantitas.
8. Consuetudo.
9. Delectatio.

Cibi substantia sit tenuis, non crassarum partium, quæ etiam citò multum pariat sanguinis. Panis benè sit excoctus recensque. Caro probatur bubuli juvenculi, agnina, vervecina, hœdina, aprina, leporina juvenis, juvenculorum cervorum, gallinarum gallorum castratorum, attagenum, ficedularum nostratium, palumbium, turturum, perdicum, anserum, tetraonum, coturnicum, alaudarum.

Carnes, quæ ex his humiditate abundant, assentur: coquantur alteræ.

Pisces cum frigidi sint, non quidem profunt ratione verò humiditatis ventriculo huic exiccato, impensè proderunt. Quid quod & ratione loci ad esum piscium assuetus sit ægrotus noster. Non verò omnes indiscriminatim obtrudendi: sed habenda inter eas quædam discriminatio. Probantur ergò Percæ, lucii recens mactati, gobii fluviatiles, auratæ, quas *ῥομφιαῖοι* vocat Athenæus, bidellæ itidem, & quandoque delectationis gratia, salmones. Gamari etiam, quos vulgus falsissimè caneros nominat, si cum cumino coquantur, ventriculo non parum proderunt.

Modus præparandi pisces vult, ut salī semper incoquantur. Ordo ingerendi postulat, ut in primordio fumantur prandii vel cœna, epoto tamen prius calefacto luteo ovi sorbilis. Caro pisces subsequitor.

Ciborum qualitas quæ requiratur, modò dictum. Illud verò etiam atque etiam imperandum cocis, ut ne cibos ustulentur nimium usque dum exarescant: neve etiam carnes in tantum coquant, ut de ossibus sponte decident. Salitioni etiam conveniens statuendus modus, ut & aromatisationi.

Si ab aromatibus abstinere nequit æger, sola ea deglutiat, cibisque ea neutiquam misceat.

Concedo insuper, ut cibi etiam quandoque cum rapis Martisburgensibus vel Portfeldensibus, cumino, fœniculo, petroselino radicibus & cæpis novellis incoquantur.

Sed quid cæpas concedis inquiet aliquis? Audi verò, quisquis, humectant ea & calefaciunt ventriculum. Inde fit, ut & alii usum quovis anno semel imperem.

Cibis assis adhibentur lactuca, asparagi, cappares, olivæ Hispanicæ, quæ insignes sunt spleneticæ; cersichum & spinachia itidem sint in usu frequentissimo.

Quodnam verò erit tempus assumendi? Bis de die comedat, post hor. X. & V. Ordo assumendi sit talis: Juscula sorbilia primum habeant locum: subsequatur hæc luteorum binorum ex ovis sorbitio: hinc carnes coctæ: post legumina, tandemque assaturæ.

Si pisces adsint, carnes aliæ in mensam non veniant. Sint pisces ii calidi, non verò frigidi.

Juscula sint è vino, cerevisia, amygdalis, pistaciis, nucleis pineis, in aquâ hordeata contusis: brodia itidem decoctionis gallinarum, gallorum castratorum, carnisque bubulæ novellæ. In primordio mensæ per septimanam sequens sumatur mixtura splenica. Recip. *Possulas lotas q. s. infundantur vino per mediam horam. postea capparum lotarum ana. Mis. dosis, cochlear unum.*

Modus mastigandi insuper non negligendus, qui tamen notus.

Quantitas assumendorum ea sit, quæ naturæ vires restauret, non gravet. Sic bibito ut sitias, sic ede ut esurias.

Consuetudo quædam in cibis solitis permittenda: Ea enim altera est natura, & quæ consveta sunt, minus molestant.

Quod si temperamentum consvetum nimis citò emendare studeremus, in quæ nos non conjiceremus pericula? Ex idiosyncrasia si cibos prohibitos affectet, & ii permittendi. Dicemus quippe cum Hippocrate: Parum deterioribus & potus, sùavis autem, melioribus quidem, sed minus sùavibus, est anteferendus.

Sed ne quid nimis.

Hæc si, generose Domine, non quidem strictè, sed ut plurimum in Diæta observaveris, bisque anno, Aprili nempe & Augusto corpus debitò evacueris modò, consilium meum salutare fuisse cognosces.

Unicum insuper monebo, quod penè mihi exciderat. Monebo licet tardius. Melius enim tardè quàm nunquam. Si

Si lien intumescat, dolorque ibidem sentiatur punctorius, pulveris L. sumatur triens, in cerevisia epotus calidâ. Sumatur alius triens, ni statim tumor & dolor cessarint.

Recip. Pulv. card. bened. ʒj

Rad. angel.

Veron. ā. ʒß

Tro is. de cappariis. ʒij

De eupator.

De absynth. ā. ʒß

Mis. F. Pulvis dividendus in tres portiones.

S. Pulver L.

Potus sit vinum Rhenanum, cerevisia servestana, vel alia quæcunque benè defecata, & novella. Antiqua enim cerevisia serofas humiditates adauget.

Habe hîc à me, Vir generose, quod petis consilium. DEUS, à quo omnis medicatio felix & fausta promanat, clementer id promoveat.

CONSILIUM LXI.

IN ARDORE URINÆ ET METU APOPLEXIÆ.



Ultra sunt, de quibus Ægrotus, iste conqueritur. Ait quidem primò, renum calculo se affligi, dum nunquam sine summo lotii ardore mingat. Affirmat postmodum, sibi non exiguum metum esse apoplexiæ imminentis, idque ex eo, quod linguæ officium in proferendis sermonibus ex improvviso factum sit pigrius, nec non alterum latus quasi rigiditatem ac immobilitatem quandam contraxerit. Ardorem hunc lotii nequaquam præferre calculum arbitror: quippe urinæ exitus nunquam negatur: imò sæpius justo ad frequentiores mictionem compellitur.

Existit itaque ardor ille ab adustis & falsu ginosis humoribus, similisque est affectus iste cuiusdam incipienti & imbecilli Diabetæ.

Quapropter in curatione hujus symptomatis non tam ad calculum, quam ad causas dictas respiciendum. Altera de quâ conqueritur diffi-

cultas, est Apoplexis. Oritur ea communiter ab humore frigido è cerebro in nervos illabente, unde motus ferè omnis tollitur. Id hoc in affectu neutiquam contingit. Quapropter assevero, existere id genus symptomatis à vapore acri & frigido, qui cerebrum impetat, constringat, hancque immobilitatem, vertiginem & quasi paralyfin causet. Colligitur ille vapor utroque in hypochondrio à cibis retentis crassis acidis & fermentatis: indidem sursum tollitur, caput ferit, vertiginesque, apoplexias & paralyfes, sed tantum TEMPORARIAS inducit. Unde patescit, hoc in casu non ad veram apoplexiam dirigendam medendi intentionem, sed ad emendandam massæ sanguineæ acrimoniam corroborandumque cerebrum.

Electuario A. utatur horâ septimâ matutinâ cum custodia. Sequenti aurora potiunculam B. calidam ebibat, iterum dormiat ad tempusculum, jejunus sit ad decimam usque. A prandio h. 3. repetat eandem similiter, & jejuset ad sextam usque. Sequenti die eadem eodem modo binis repetat vicibus. Hoc enim modo humorum acrimonia obtundetur, & ad moderationem quandam redigetur. Proximâ tandem aurorâ ad ejiciendum è corpore falsum & mordacem humorem paulò ante horam sextam pilulis C. fruatur, jejuset ad 10. domique se contineat. Sequentibus singulis auroris ad corroborandum caput & reliqua viscera, comedat morsulum unum D. ut & à prandio h. 3. Idque continuet, dum supersunt Morsuli. Ut autem caput ab ejusmodi super-venturis malis satis superque præservetur, cum ad finem singulis septimanis tribus vicibus particulam panis similaginei, tostam vino madefaciat, indeque panem conspergat pugillo pulveris E. & sic manè cum deglutiat.

Perquam necessarium insuper erit pro prophylaxe ut singulis mensibus bis (i. e. biduo ante novilunium, biduoque ante πανσέληνον) pilularum F. 7. vel 8. numero capiat vespere post cœnam in procinctu quietis nocturnæ. Sequenti verò die, in quem νεομηνία vel πανσέληνος incidit, postquam è plumis emerferit, pulverem G. in aqua florum tilix vel spiritu ceraforum recipiat. Singulis etiam auroris particulam nucis muscatæ vel sub linguâ volutet, vel mastice.

Quod si quandoque denuò se invadi paroxysmo aliquo præsentiscat, binas rotularum H. sub lingua dissolvi patiatur, uti & has ipsas secum strophiole implicatos semper & ubivis locorum circumferet. Circumferet consimiliter Balsamum succini in glande argenteâ, eo nares inungat, cum se minus bellè affici persentiscit. Eodem modo sit in promptu Balsamus Apoplecticus, quo cum nares vertex & tempora inun-

inunguntor. Caput quoque ab aurâ tueatur frigida, nebulosâ multum-
que humidâ. Ajunt quidam, se melius se habere operto capite. Sed
absit, alluntur. Calor major interdum obfuscet minorem: capite nudo
quippe ab hypocausto calido incalescente, calorem non sentit, sentit
verò effectum sed nimis serò. Cibi vitentur replentes caput, capè,
sinapi, alium, & alia de quibus multoties sermo. Vinum bibat pa-
trium, Rhenanum puta.

Recip. *Cassie recens extracta supra decoct. fervent.*

Rad. liquirit. & sem. anisi ʒvj

Addæ spec. Etescop. ʒij

cum Sach. s. bolus A.

Recip. *Syr. de stœchad.*

de glycyrrhiza.

de castill. q̃. ã. ʒß

Decoet. liquirit.

Passular.

Sem. anisi & rad. althea fact. ex aq. beton. ʒiij

Mis. f. haustus reiter andus ter.

S. Potiuncula B.

Recip. *Mass. pill. cochiar. ʒj*

Assaieret

Aggreg. ã. ʒß

de hiern c. agar. ʒj

Dacryd. gr. j

Cum aq. beton.

F. pillula n. XXV.

S. Pillula C.

Recip. *Flor. anthos ʒß.*

Lavend.

Cubeb. incis. grosso modo ʒj

Calam. arom. cond. ʒiij

Cort. citri condit. ʒij

Margarit. prep. ʒß

Rad. & Sem. Pœonia excort. ã. ʒij

Macis incis. ʒj.

*Pulverisanda pulverisentur, & cum Sach. alb. in aq. la-
vend. solut.*

F. conf. in Morsulis aromat. cum gr. V. ol. macis.

S. Morsuli D.

Recip.

Recip. Rad. tormentil. s.

Galanga.

Zinzib.

Visci quer. sem. pæon. excort.

Coriand. præp.

Cubebæ.

Nuc. moscat. ā. ʒij

Piper. long.

Rorismar. ā. ʒj

Sach. cand. alb. ʒij

Conf. ex oleo anisi ʒj

Pulverisata dentur ad scarulam.

S. Pulvis E.

Recip. Mass. pill. de agar.

Fœtidar. ā ʒß

Aurear. ʒjs

Trocis. de agar. ʒij

Alband. gr. XV.

Rhabarb. elect. ʒj

Spec. diamosc. dul. ʒß.

Extr. pæon. gr. xij

Castorei ʒß

Subingantur omnia cum succo ruthe & aq. skule in
massam pilularum.

S. Pilula F.

Recip. Succini præp. cum spir. cerasor. nigror.

Spec. diarhod. Abba absque camph. ā. ʒj

Mirba elect. ʒj

Thur. elect. & alb. gr. V.

Ambra gryseæ veræ gr. iiij

F. Pu'.

Divid. in 3 ptes.

S. Pulvis G.

Recip. Extracti calami aromat. ʒß

Rad. Pæon. ʒj

Succini cum spir. cerasor. præp. ʒj

Corall. rub. ʒij

Margarit. præp. ʒj

Ol. nucis mosc. 3ß.
Ol. macis gr. V.
Ol. ruta gr. iij
Ambra gr. V.
Sach. alb. 3ß.
Soluti in aq. beton. 3iij
F. conf. in rot.
S. Rotula H.

CONSILIVM LXII.

IN PASSIONE DIABETICA.



Non tam à Renum incalescentia, quam ab ichore quodam pituitoso, falso & acri, qui renum substantiæ sit impa-ctus, & quotidie magis magisque adactus affectionis huiusce præternaturalis essentia dependet.

Quapropter in huiusce curatione, iis quæ acrimoniam mitigarent, attemperarentque, pituitam verò temperatè calefacerent, concoquerent & detergerent, hætenus feliciter usi sumus. Jam verò iisce præmissis, medicamentis quibusdam nutritiis ulterius instabimus. Recipiatur itaque pullaster gallus, affusis tribus cantharis aquæ insulsæ, sine sale & butyro ad absumtionem tertiæ coquatur partis. Restantes duo canthari refrigerentur per se, & pedetentim cum debitâ munditie per inclinationem defundantur: huic defuso adde *glycyrrhizæ rasæ 3iij*

Rad. altheæ 3j

Passular. minor. 3s

Coquantur hæc insimul omnia, ad consumptionem partis tertiæ. De hoc manè & vesperi integer bibatur cyathus. Sub huius usum ubi acrimonia fuerit attemperata, frequensque mictio abolita, denuò superior paretur sorbitiuncula, cui tamen drachmæ sex seminis anisi incoctæ sint. Ita enim & flatus carminabuntur, & coctio promovebitur. Multoties etiam de die quantum placet, præscripti sumatur Electuarii. Horà etiam VII. regioni lumborum præscriptum Epithema usque ad prandium sequentis diei adalligetur. Pro corroboratione insuper recipiantur conserva è summitatibus foliorum altheæ, conserva violarum, borraginis,

ginis, buglossæ, liquiritiæ coctæ pul. q. s. pro forma electuarii, cum
syrupo de hyssopo & liquiritia.

Nenuphar. ā. ʒvj

Cichor. ʒs

Miva cytoneer. ʒiij

Spec. diarrhod. Abbat.

Diatrionsantal.

Diatrag. frigid. ā. ʒi

Trocis. de spodio

De terra sigill.

Cornu cervi usti

Corall. rub. preparat. ā. ʒij

Pul. verm. terrest. prepar. ʒi

Syrupi de portulaca

Myrtin. ā. q. s.

Mis. f. Electuarium.

Recip. Ung. Infrigid. Galeni ʒvj

Ol. rosar.

Myrtini

Nenuphar.

Citonior. ā. ʒv.

Pul. rosar. rub.

Santal. citrini

Hypocystid.


Balaust. ā. ʒj

Corall. rub. ʒijs

Trocis. de spodio

Terra sigill. ā ʒiij

Aceti parum, ducantur omnia in mortario plumbeo. Ce-
ra q. s. f. cerotum ex synd. rub. & corio rubro ad for-
mam oblatam, perforetur ad interpassetur. I. Epi-
thema.



CONSILIUM LXVIII.

IN PRÆSERVATIONE Â CALCULO RENUM.

Est in confesso apud rationales Medicos , calculum renum duabus causis concrefcere.

Primò quidem à calore renum , tanquam efficiente : dein ex materia crassa , viscida , glutinosâque , tanquam materiali causâ.

Testatur insuper experientia , à collectis materiis viscidis generari vapores & flatus , qui similiter sursum elati , præcordiorum angustias creent maximas. Hoc sanè ipsum omnes nephritici tum contestantur , tum experiuntur. His ita præsuppositis , plana via jam patebit ad nephritici symptomatis *περὸ φάλαξιν*. Primò itaque satagamus , ut viscosa illa materies decrementa acquirat quotidie ; dein verò ut calor renum immodicus attemperetur. Hanc ad rem Diætâ opus est sobriâ , moderatâ , circumspectâ. Aer igitur eligitor clarus , purus , serenus. In cibis vitentur ea , quæ viscosa sunt , salita , fumo durata , butyro elixata , poma , lacticia. In primordio prandii ova sumuntor mollia , juscula carnum quarumcunque , uti & gallinarum , hordeata , amygdalata. Neque etiam improbabo spinachiæ usum , petroselini , nasturtii. Eodem jure gaudeant pisces omnes saxatiles , Lucii juvenculi , Percæ , Funduli , Bellionii , Auratæ , Salmones recentes. Detur insuper opera , ut ne magna ciborum varietas in mensa appareat.

Adhibeantur inunctus de conditis cynosbati fructibus , pomis citriis , asparagis , capparibus. Cerevisia sit benè defæcata , uti & vinum probatur bonum. Potus extraordinarius (id est , qui intra tempus prandii & coenæ fit) valere jubeatur.

Alvus sit aperta semper. Enemata è cassia multoties in usu sunt , uti & decocta cicerum , & serum lactis caprini , nec non pillulæ literæ A. notatæ.

Affectus animi serveriores exulent loco eorum , quædam *ἀνάσσει* (licet non stoica) dominetur. Fiant quoque infessus in balnea , quibus incocta sint Malva , Althea , Fraga , Violæ , folia Salicis , Rosæ , folia Nymphææ , Chamæmeli , Origani , Lupuli , Saxofragiæ , Petroselinum , Athemisia , Betonica , semen Lini & Fœnugrei.

Postquam ē balneo Dominus emerferit, dorsum unguento B. ungi curet, statimque decoctum cicerum bibat, cui butyri loco oleum amygdalarum recentium sit additum. Vestes & stragula, quæ renum calorem immodicum adaugent, ignemque igni addunt, proscribantur.

Anno quoque similiter bis evacuetur corpus, catharticeis scilicet idoneis. Tantum de præservatione. De curatione alibi.

Recip. *Therebinthina novies lota in aq. fragor. ℥ss.*

Rhabarbari interioris & optimi aq. cinamomi per noctem irrorati ℥jss.

Pul. succini albi

Veronica

Ceterach.

Liquiritia

Cinamomi ā. ℥s

Mis. f. ex arte Magdaleones, & ex iis pillula. IX. pro drachma.

S. Pillula A.

Recip. *Ceroti infrigidantis Galeni*

Unguenti rosati Mesuci ā. ℥j

Ceroti Santalini ℥iij

Ol. violacei

Nymphaea ā. ℥jss

Camphora gr. iij

Misce & cum momento cera, & aceti rosacei fiat linimentum molle.

S. Unguentum B.

CONSILIUM LXIV. IN CALCULO RENUM.



Lariss. Dn. Doctor ex continuis renum doloribus, dum Spira vixit, laboravit: excrevit & calculos sed friabiles, quibus excretis nihilominus tamen dolor nephriticus continuatur. Est autem dolor symptoma profectum ex morbo in soluta unitate, orta à morbo in via. Nam res p. n. videlicet calculus vel arenulæ in renibus non modò genitæ, sed diutius & copio-

fius

sius retentæ , partim pondere & copia carnes renum distendunt ac lancinant , partim , dum à renibus abscedere tentant , fauciant & continuum solvunt. Et cum dolor non modò molestus sit , dum calculi abscedunt , & in ureteres sese insinuant , vesicamque versus progrediuntur ; verùm etiam extra paroxysmum ea parte , qua renes sitifunt , molestiam exhibeat ; necesse est vel plures calculos in renibus harere , qui & pondere & dolore lancinante affligant : vel copiam materiæ sabulosa , cum cruda calculi materia in renibus coacervari & inde gravitatis sensum talem , ut vix sese erigere Magnif. Vir possit , excitari. Exulcerationem verò in iis partibus doloris causam præbere non arbitror metuendum : cum nulla febris nec adfuerit , nec adsit , multò minus mitus sanguinis diuturnus aut pertinax antecesserit.

Quapropter sum in ea sententia affectum de quo queritur esse calculum renum , cujus causa efficiens est calor renum intemperatus , non solum quò ad naturam renum in sese consideratus , sed etiam ad reliquas partes adjacentes major , quàm secundum naturam esse debebat. Hic cum sit flammeus quasi & adurens non modò materiam in calculos , perinde ut lateres infurno , excoquit ; verùm etiam materiam ex venis emulgentibus maturiùs & copiosiùs , quàm secundum naturam conveniebat , attrahit crudiores & imperfectiores , unde necesse est & calculi mineram semper coacervari , sensumque tristem propter copiam exuscitari ; & calculos sine intermissione & coqui & augeri.

Materia verò hæc qualis sit dubitari posse videtur. Nam plerique in ea sunt opinione esse pituitosam : nam talis materiam facile per calorem renum lentescit & pertinaciùs substantiæ eorum adhæret ; & frequentes cruditates , quæ sunt individua soboles intemperantiæ aulicæ , pituitosam potius quàm melancholicam materiam producant.

Attamen si rem diligentius scrutemur & calculorum naturam examinemus ; animadvertimus eos esse friabiles , nec duros & compactos , unde concludendum puto , materiam ex qua gignitur calculus , hujusque adjunctum proprium nempe sabulum , ex materia melancholica & sanguine adusto potius quàm ex pituita generari : præsertim cum epar sit calidius & splen imbecillior quam ut humor melancholicus exactè excernatur & à massa sanguinis debitè separetur. Est enim temperamentum hujus viri melancholicum & cacochymiâ humorum magno-pere præditum , sicut ex ulcere ex hujusmodi cacochymia profecto non suspicari , sed manifestò deprehendere nobis in curando licuit. Interim tamen inter causas adjuvantes non minimam esse puto crudum & pitui-

tolum humorem, ut supra commemoravi, per *ἀσπύα* aulicam, & quidem frequentiore quàm fieri debebat, in ventriculo imbecilliori generatum, & in secunda coctione non emendatum. Quibus omnibus non parum & irritatur & cumulatur calculus & materia hujus ex duobus erroribus externis; nempe vinis Spiræ venalibus: deinde ex aere Spirense humidior, coelo præsertim nubilo & pluvioso. Nam cum vina Spirense non sint probè defecata (ut enim audio impedire solent Spirense ne per superiora in deferbendo sese exonerent: ut nimirum vinosiora fortiora, id est, magis nociva fiant) fit ut consequantur naturam terrestrem, faciliè per caliditatem epatis in majorem adustionem transcant faciliusque in humorem melancholicum & adustum degenerent; quod humor postmodum adustus accedentibus cruditanibus ex errore in vicem emergentibus non modò faciliè in calculum faceffit; verùm, ut opinor, etiam periculosis doloribus coli & similium affectionum causam ministrat. Altera causa externa, videlicet aer Spirensis humidior cerebrum humidius in incolis reddit, replet & catharris generandis adeò disponit, ut rarò reperiantur isthic, qui de catharris non coquerantur. At hujusmodi catharri duplici ruina vel defluxu & colicis & calculosis affectibus causam ministrant: nam vel per venas ad colon, epas & inde ad renes vel ad ventriculum ruunt, ejusque chyloficatricem lædunt, ut cruditates plures generet. Nam cum materia catharralis simul functionem ventriculi lædat & cibis ingestis permisceatur nemini dubium esse potest ex secundæ coctionis vitio, materiam sabuli & calculi cotidie & generari & cumulari. Quis igitur non videat tali materia ab emulgentibus venis ad renes caliditate p. n. quasi flammeos, delatâ, facile calculum & arenulas generari.

Videtur autem difficultas sese offerre in curando, dum ejus Magnif. Spiræ versetur, nativa renum intemperies magis magisque augeatur, & tandem catharrorum & cruditatum non appareat ex antedictis finis: ita ut dubitari posse videatur, an quod petitur per Magnif. Virum à nobis possit præstari? Ad quod respondeo, planè auferri hoc malum vix posse cum intemperies renum sit nativa; temperamentum naturâ melancholicum & splenis simul imbecillitas tamquam nativa funditus non possit extirpari, vita etiam aulica errores externos cotidie magis magisque cumulet & augeat: mitigari autem posse per usum medicamentorum; ut dubitandum minime est: ita etiam non prorsus abjiciendus animus, fieri posse, ut diligenti & præservatione & curatione tandem planè cedat, præsertim Magnifico Viro suum officium non

nus strenuè quàm promptè faciente. Ad quam rem consequendam offerunt sese nobis sequentes scopi.

Primus respicit dolorem, de quo Vir Magnif. cum primis queritur. Deinde si calculus aut materia ejus (non enim scio quomodo hoc tempore dolor sese habeat) superest, expellatur. Tertius consistit in intemperie partium calculum & materiam hujus generantium prohibenda.

Quod ad primum attinet dolor duplici remedio mitigatur: primò anodynis admotis vel per clysteres vel ad renes seu lumbos in forma unguenti vel cataplasmati aut simili. De clysteribus non est opus multa facere verba, cum eorum materia cuivis in arte mediocriter versato sit nota. Quæ verò renib. applicantur similiter vim habere debent, ut ampliando & relaxando tam renes quam ureteres, calculo & sabulosæ materiæ viæ laxiores patentioresque parentur. Hæc, ut doloris mitigandi causa ab ægrotantibus maxima contentione requiruntur: ita etiam prudenter & quidem non prius, quam uno aut altero clystere præmisso, ad renes admovenda sunt. Horum autem quamvis multiplex sit materia; tamen inter cætera magnam vim habere expertus sum medullam cervinam, vel solam vel cum oleo violaceo aut alio refrigerante & relaxante permixtam renibusque inunctam. Hoc non minus efficax est cataplasma, quod conficitur ex duodecim cancrorum decoctorum & expressorum & contusorum expresso, panis albi quantitate sufficienti in eo inebriato, vitellis aliquot ovorum, oleo chamæmelino & violaceo (vel medulla cervi) q. s. & ceræ 3ß adjecta, renum regioni & lumbus admotum.

Sæpe etiam parietariam pulverisatam & in oleo viol. & chamæmelino affusa pauca aqua ononidis, frixam, non modò lumbis sed & vesicæ & ureterum regioni maximo cum successu admovi.

Pro cotidiano autem usu, cum ipsius Magnif. de pertinaci dolore eoque non intermittente conqueratur non abs re esse putarem, si locum renum unguento ex unguento populeo, oleo violaceo, scorpio-num & chamæmelino confecto inungat bis de die, mane & sub ingressum lecti. Sunt hujus generis plura auxilia quæ in forma sacculorum, aut fomentationis, aut decocti in vesica applicantur: item quæ in forma syruporum, jusculorum aut bolorum (omnib. tamen ad eum finem, ut vias laxent & calculo ad exeundum iter parent directis) excrementa quæ impediunt, quo nimirum natura facilius & maturius ad calculum pellen-dum accingatur, expellant & subducant. Inter ea etiam quæ dolorem mitigant maximum præsidium est venæsectio si in brachio ejusdem late-
ris,

is, in quo dolor viget, instituatur: poterit igitur sub initium doloris calculi præmissis universalibus vena media aperiri & sanguis ad ℥iij aut V. mitti, quod idem etiam in præservatione erit. Urgente etiam dolore cucurbitulæ lumbis affixæ, aut illi parti qua calculus se demisit apponi, & deorsum trahi poterunt, ut hunc ductum calculus sequatur.

Alterum remedium perficitur naturam ad excretionem calculi stimulantibus, atterentibus, expellentibusque. In hunc usum possunt præscribi decocta ad aliquot dies bibenda, quale est sequens:

Recip. Rad. althea ℥j

Asparag.

Ierosel.

Fenic.

Ononidis ā. ℥ij

Glycyrrhiz. rec. ℥iij

Passular. ℥ij

Cicer. rub. ℥ss

Summit. althea

Malva.

Parietar.

Pimpinell.

Plantag.

Veronica,

Beton.

Adiant. ā. p. j

Sem. iij frig. major.

Minor. ā. ℥j

Anisi

Fenicul.

Carui,

Dauci ā. ℥ss

Cinam.

Galanga minor. ā. ℥j

Coq. in s. q. aq. saxifrag. & flor. chamemell. pro ℥ss

Cole adde syr. de succo parietar. ℥iij de liquiritia cum sacch. fact. ℥ij. Postea cum pulver. cinam. ℥iijss passetur per manicam Hippocrati. Exhibenda circiter ℥v. mane circa sextam & vespere circa tertiam horam: Cui medicamenta si efficacius desideremus, nempe ut calculum magis atterat & expellat admiscere possumus ℥j vel ℥ss, aut etiam pro conditione morbi ℥j lithontriptici aut seq. pulveris:

Recip.

Recip. *Succini albi præp.* ℥iiij
Glycyrrh. rasa ʒj
Sem. iij. frig. major.
Malva
Althea ā. ʒß
Sem. alkekengi ℥ij
Nucleor. persicor. n. xv.
Granorum mespil. ʒß
Consolida Sarracenica ʒj
Calam. arom. ʒß
Rad. ononidis ℥iiij
Lapid. carphon.
Percarum. ā. ʒj
Oculorum. cancri ʒß
Cinam. acutiss. ʒj
Mammum Christi perlat ʒij
Misc. f. pulv.

Non minus feliciter expellere solet calculum pulvis rad. althææ cum succini ℥j. exhibitus ex decoctione glycyrrhiz. Syrupus etiam ex succo parietariæ & ex succo glycyrrhiz. cum gt. v. olei therebinthinæ mirifice calculum pellit & urinas extrudit, præsertim si aqua fragorum permistus in forma potionis propinetur.

Secundus & tertius scopus præservatorii sunt : ille ad materiam generatam spectat; hic ad generandam. Quod ad materiam generatam attinet, existimo omnem operam navandam, ne ista in renibus morem trahat, diutiusque retenta de novo in calculum coagmentetur, aut longiori tempore instar sabuli coacervata dolorem novum exuscitet : hæc requirit remedium diureticum citra calefactionem, atterens simul calculum & abstergens vias & renum & ureterum. Tale potest esse Syrupus ex succo parietariæ cum guttulis tribus aut quatuor olei therebinthinæ semel in mense usurpatus, aut syrupus ex succo parietariæ cum decocto althææ similiter semel in hebdomade exhibitus, vel pulvis paulò ante descriptus ad quantitatem ℥ij. vel ʒj. ex decocto cicerum rub. & rad. ononidis atque althææ. Syrupus ex succo glycyrrhizæ plurimum momenti obtinere posset, si ejus bis in septimana tria cochlearia unâ hora ante cibum usurpenter : non minus efficax est masticatio frequens recentis glycyrrhizæ, qua scio magnum quendam virum ferè per

per integrum vitæ curriculum à calculo renum fuisse immunem, arenulis, & parvulis calculis ferè infinitis subinde per urinam excretis.

Summum etiam remedium est syrupus sequens nihil materiæ calculosæ sine calefactione in renibus relinquens, si singulis septimanis bis, vel post purgationem universalem ad dies quinque duo cochlearia matutino tempore assumantur. Recipit autem *succi veronicae* ℥ss *succi hederæ terrestris* ℥iij. *portulacæ* ℥ss. *Succi expressi & percolati confiant in syrupum.*

Tertia intentio quæ similiter præservatoria materiam generandam complectitur hæc autem cum partim vitio viscerum, partim ob errores externos producat, utriusque diligentem rationem habere oportebit.

Quod viscerum vitia attinet, ea vel materiam solam, aut calculum generant. Materiæ causa est epar, splen, ventriculus & caput. Epar enim calidius cum sit, chylum, ut supra demonstratum est, adurit: Splen cum melancholicum humorem non exquisitè & sufficienter separat & attrahit, sanguinem crassum & arenulis generandis magis idoneum reddit: Ventriculus aulicus cum sit, aulicè etiam cibos boni succi coquit, id est, crudiores perficit chylum, causam propterea ut adustæ partes sanguinis & quidem terrestiores facilius coagmententur, & in calculum abeant. Eandem etiam rationem obtinet caput; quod ut supra commemoratum est, ex aere Spirensi refrigeratum movet catharros ad ventriculum aut renes decumbentes, & materiam fomentumque calculis & saburræ arenarum præbentes. Ad singula igitur respectus singularis habendus. Cum autem cacochymia melancholica cum pituita à causis recitatis permixta emendationem ante omnia requirat, necesse erit illam inprimis emendare. Quocirca videtur opus esse evacuatione, quæ educat materiam non modo ex primis viis sed maximè ex toto habitu venarum. Quod aut primas vias attinet convenientissimus est usus cassiæ & terebinthinæ: cassiæ extractæ supra decoct. ferventem sem. anisi & glycyrrhizæ exhiberem ℥j. cum facilis sit solutionis duabus horis ante prandium vel coenam, bis in mense aut etiam frequentius: & si forsan videretur requirere necessitas, admiscerem ℥j. Specierum bened. laxat. Ex therebinthina pararem seq. massam.

Recip. *Therebinth. opt. decies ex aq. parietariae lotæ*, ℥jss

Rhabarb. opt. & subtilissime pulverisati ℥ij

Cinam. acutiss. pulsati,

Ceterach. ã. ℥j

Cum pulvere glycyrrhizæ

F. massa.

De qua singulis mensibus, aut eo etiam tempore quo viæ communes evacuandæ sunt ʒij vel iij usurpet duabus horis ante prandium vel coenam. Soleo hujusmodi massæ interdum accipere ʒij & addere ʒj spec. bened. laxativæ, præsertim si multum pituitæ renibus affluere mihi sit suspicio.

Habitus venarum decoctione longa ad tres vices evacuari posset. Parabitur ea autem commodè ex speciebus superiorem decoctionem constituentibus, additis foliis senæ, epithymo, corticibus radicum ellebori nigri vino malvatico præparat: rhabbaro & aliqua portione agarici, radicibus scorzonæ, corticibus capparum, thamarisci, fraxini & herba cochlearia, quæ splenis ἀροίαν non modo mirificè emendat, verùm etiam obstructions potenter aperit, melancholicos & his permixtos pituitosos humores in renibus fundit, incidit, attenuat & deterget, adeoque cacochymiam ex liene magno profectam feliciter emendat, imprimis si decoctio ex sero caprino fiat. Cacochymiâ emendata viscerum intemperieri omnis labor adhibendus: Quod igitur epatis caliditatem attinet, ea emendari poterit usu radicum cichorei & medicamento ex conserva rosarum, violarum, cochleariæ & speciebus aromat. ros. atque diarrhod. Abb. parato. Cui non leve auxilium præstat inunctio ex unguento rosato Mesuei administrata. Splen spleneterico unguento & frequenti usu olivarum & capparum suo tono restitui posset. Est autem magnæ efficaciz tam in calculo, quam in splene non bene habito remedium, si ad mensem unum immediatè ante prandium & coenam cochleare unum ex æquis partibus passularum & capparum minorem cum oleo amygdalarum dulc. humectatorum devoretur. Ventriculus usu syrupi ex succo glycyrrhizæ, maxime verò mellis rosati colati tempereriei suæ restituatur. Et possum affirmare me plurimos, quibus ventriculus affectus multam pituitam, calculi sc. materiam, generabat, immunes ab insultu calculi præservasse ʒij mellis rosati colati, bis vel ter in septimana, una hora ante coenam vel prandium, exhibitis.

Non solùm enim materia cruda in ventriculo cocta, sed etiam incisa atque deterfa, per alvum, feliciter arenibus diversa, excreta est.

De catarrho non est quod hîc agam, cum præsentis Medici ob frequentem ejus in curando usum, nulla admonitione egere videantur. Renum autem intemperies quæ causa calculi effectrix est, commodissimè emendabitur conserva rosarum & unguento ex refrigerantibus supra commemoratis parato.

Sequitur ad extremum tertia intentio : quæ errores externos complectitur : hi autem constant ex rebus sex non naturalibus. Quantum igitur ad aërem attinet non dubito Medicos præsentis ita aërem emendaturos, ut generandis catharrhis minus sit idoneus. Cibi sint facilis coctionis, non multum diuretici, sed mediocriter & in qualitate moderate refrigerantes & humectantes, ut & renum flammeo, & epatis intensiori calori medeantur : Nam si calidi & sicci sint, & adustioni occasionem, & renibus calculos generandi augmentum addent. Cumque semper materiæ in renibus extenuandæ & detergendæ opera dari debeat; cibos non solum boni succi ut paulò ante memini præscribere oportet, sed tales etiam quæ renes mundificandi sine calefactione facultatem habeant. Tales autem sunt radices petroselini, lactuca, althæa, jussula ex hordea. Præter cappares sub primam mensam apponi poterunt asparagi & lupulus, imprimis autem folia pimpinellæ. Et ut omnes cibi boni succi sunt præscribendi, ita vicissim quicunque crassi sunt & difficilis coctionis prohibendi. Pisces etiam cum sint frigidis & frigidos succos generent, non frequenter concedendi, atque inter eos iste dilectus habendus, ut solummodo saxatiles apponantur. Panis non sit crassus & bene coctus. Nec plus vel coenandum vel prandendum, quam natura facile & perferre & coquere potest. Mensæ secundæ cum cruditatis sint materia, quò ad ejus fieri posset, vitandæ. Omnia calida, ut quæ aromatibus aut aliis acribus, condita sunt ut allio, capis sinapi, excepto nasturtio aquatico vel hortensi, vitanda sunt. Vina non probè defecata angue canèque pejus vitanda; proderunt igitur Neccarica : Et inter cerevisias Servestana aut Einbecensis. Debebam hîc Magnif. virum commonefacere de computationibus nocturnis, aut iis quæ à prandiis in coenas continuantur : sed cum nemo, etiam mediocriter ab hoc hoste excruciat, reapse non expertus sit, quantum noxæ inde sit perpeffus, nocturnas Athenas ferrem, si plura adderem.

Ut motus nimius calorem renum exasperat, ita etiam sanguinem calidiorem & magis ustum reddit. Quare mediocriter corpus movendum & exercendum est, equitatione potius & vectura quam itione. Somnus sit septem horarum non supinus.

Alvus semper fluat, aut clystere vel cassia moveatur. Nec oblivioni tradenda, quorum supra nemini, nempe octavo quoque die, vel ad summum decimo quarto, aut semel in mense pilulis aut cassia utendum esse. Siquidem maximam partem præservationis à calculo sibi vendicat remotio, subductio & aversio materiæ ex aqua calculus excoquitur.

Ani-

Animi affectus sæpe calculum non solum commovent, sanguinis massa irritata & præter naturam calefacta: sed etiam calidiorum reddendo, materiam magis juvat adurere & habiliorem reddere, ut promptius in calculum abeat. Cavebit igitur Dn. Doctor iram, perterrefactiones subitas, metum, tristitiam.

Hæc pro Magnif. Viro hac temporis angustia in medium afferenda esse, mihi visa sunt. Æternus & misericors DEUS sua benedictione ea fortunet, ut ab isto hoste usque ad vitæ hujus decursu immunis & liber sit.

CONSILIUM LXV.

IN IMPOTENTIA APHRODISIA



Decretum mihi est hoc in consili proponere totum de potentia & impotentia Aphrodisia negotium. Idque satis didactice καὶ ἀκριβῶς. εἰδὲν καὶ ἵνα ἀφαιρῶν ἡμᾶς ἁπλῶς, ὡς αὖτε ἡ τὰς.

Ordine pervenies, quo non licet ire labore.

Talis ergo ἀδυναμία est symptoma noxæ functionum naturalium, & pudendi propriè ablata: & dicitur, quando quis non rectè coire potest.

In hoc nostro patiente, qui debitum uxori non potest solvere, pars affecta sunt membra genitalia, quæ cum ignava sunt, græcis ἀσθενῆς dicuntur.

Genitalium autem nomine complector pudendum, cujus proprium est distensio, quæ fieri tantum debet, quando animal coitutum est. Fit verò illa distensio à facultate naturali: hæc quippe distendit & attollit penem. Ut vero coitus fiat secundum naturam, duo requiruntur potentissimum, scilicet erectio, & seminis ejaculatio. In erectione perfectâ tria præsupponuntur communi more.

1. Instrumenta motui voluntario destinata, ut musculi & nervus in porum coli desinens, quorum musculorum sunt quatuor, quos etiam bene constitutos in temperie & confirmatione esse decet, ut ita vim animalescens suscipiant, & optimum sint organum.

2. Spiritus præsupponitur vitalis, quem convenit esse tum copiosum tum probum, id est tenuem & rectè temperatum, non crassum, quia dum concrevit sit improbus.

3. San-

3. Sanguis optimus, ut veretrum plenè nutriatur, ne gracilescat sed spiritum copiosum admittat, suscipiat, & ἐν ἡμέραις regat.

Ad justum seminis ejaculatum in Cajæ uterum consimiliter tr concurrere addecet.

1. Generatio requiritur seminis in testibus, ad quam rem opus est, ut testes sint benè temperati, proportionali, ut suâ proportionem idoneum generent & forment semen, ut ita venæ quæ in didymos defluunt, non sint obstructæ.

2. Seminis geniti ad colen ἀλλοδοσίς transmissio, ad quam necessario requiritur, ut ne vasa spermatica sint obstructa, & ut ne semen justo sit crassius.

3. Ingressio seminis per vesiculas in colen & porum ureticum, ut præsupponitur, ut meatus colis sit aperius, ut meatus urinarius ab obstructione sit liber: ut muscoli rectè sint constituti, cum & ii ad ejaculationem non parum emolumenti conferant, teste αὐτοψία in iis læsis.

Et quidem hæc de iis quæ secundum naturam: jam ad horum contraria.

Quemadmodum justa & debita coitus ratio in duobus consistebat ita vicissim & ἀδυναμία à binis contingit contrariis, si nempe virgæ erectio sit ablata, semenque non emittatur ulterius.

Non erigitur virga ob causas quatuor:

1. Si membrum, quo viri sumus, nimis sit refrigeratum, quod fit à senio, ocio torpido, nimia pinguedine, magnitudine epiploici habitu athletico, creberrima jam antè in aquis frigidis natatione, causisque aliis.

2. Si muscoli colis facti jam sint paralytici, ob intemperiem præsertim frigidam, vel etiam nimis humidam.

3. Si virga spiritu destituatur vitali, quem corpus frigidum exanguis & emortuum non pariat.

Unde verò hoc quod non spiritus generetur vitalis? Fit hoc ratione cordis & cerebri frigidioris, cum & à cerebro semen provenire divinus asserat Hippocrates, γινέται μὲν ἐν ᾧ, ait ille, ἀπ' οὗ τὸ σπέρμα. Inde & communiter post absolutum actum venereum totum vacillat corpus, & imprimis mens, quæ in cerebro stabulatur. Quæ sanè subsequens imbecillitas verbo signato & concepto Languor nominatur quando post peractam rem lassitudo artus occupavit, uti rectè in Criticis ex Petronio (ni fallor) qui nimis Romanè locutus est, observavi

. Lipsius. Id cum ita rectè fiet ab omnibus junioribus, si in hoc casu egerint, quod periti ajunt agricolæ, suo in proverbio:

Manu seminandum est, non sacco.

Et lepidè ad hunc sensum Juvenalis satyra XI:

Voluptates commendat rarior usus.

Sed quorsum elapsus fueram.

4. Si propter dydymos aut venas refrigeratas spiritus non attrahitur contingit inde, ut debitum uxori persolvi nequeat.

5. Si spiritus ad colen non deferuntur ob obstructos meatus.

6. Si propter frigiditatem aut cruditatem exanguis corporis, ut ob cachexiam sanguis bonus & copiosus nutritioni colis debitus, deficiat, Sanguis enim isque arteriosus stimulus est libidinis, non flatus. Quâ sanè in parte multos practicantium halucinatos videmus.

Semen verò non emitti à causis contingit quatuor:

1. Si testes propter frigiditatem aut *στυμπερίαν* diu turbatam, semen non generent.

2. Si partes illæ (nempe coles & meatus à testibus ad colen tendentes, sint malè conformatæ, nempe tum obstructæ, tum nimis breves & ob ariditatem exiccatae corrugataeque tum etiam in loco proprio debito non collocati, ut solet aliàs fieri de *ἐμπυρδαίσις*.

3. Si seminalis materies, nempe sanguis satis copiosus tum deficit, tum vitiosus existit. Fit hoc vel à morbis antegressis vel ratione victus minus exquisita: vel etiam ob medicamenta violenta jam ante in aliis morbis usurpata, quæ semen vel verimunt vel non diu in suis locis permanere sinunt: vel tandem ab incantamentis, ligamentis, & occultis qualitibus aliis.

4. Si materia seminis idonea, sanguis puta bonus & laudabilis, deficiat, ob alimenta pravi succi victus rationem immoderatam, & malam viscerum constitutionem.

Et hætenus quidem de causis in genere: jam ad causas penetrabimus speciales, in nostro patiente.

Eum hoc malo affligi, ob sequentes causas, assero.

1. Adest in ipso quædam non contemnenda obstructio, quæ est varius tumor circa testiculum sinistrum.

2. Corpus habet cacochymicum.

3. Cordis laborat frigore.

4. Refrigeratæ sunt partes principales, puta epar, ventriculus, renes, testes, ex quibus vis generatrix emortua est ad rem patranda.

In

In curatione ad quatuor scopos principales attendendum : quique ad amissim obedienter & obsequiosè satisfactum fuerit, patientem nostrum adhuc multorum liberorum parentem futurum, augurabor.

Primò itaque omnium de extirpanda Cacochymia opus est, ut sumus solliciti. Hæc enim nisi ablata fuerit, *εὐχυμία* locum non reperiens. Absente *εὐχυμία* exulabit libido. Nam rectè versus ille rhopalicus :

Luxuriat rarò non benè pasta caro.

Complebimus hunc scopum, si tum humores crudos & adustos qui calorem oppriunt nativum, averruncemus, tum etiam viscera principalia, puta cor, ventriculum, epas, renes, cerebrum pancreaticum confortemus.

Postmodum ad laudabilis sanguinis & seminis generationem introducendam, nostros convertemus oculos. Fiet istud, cibos exhibendo euchymos & facilè alterabiles seminisque uberrimum proventum producentes, nec non si & testes & vicinas partes obfirmare studeamus.

At vero prostea satagemus, ut ex cibis iis *εὐχυμοῖς καὶ ἐπεπρωτοῖς* spiritus spermaticos consequantur.

Tandem & specialissimè adhibenda ea, quæ venerem electivè & occulto quodam impetu extimulent. I. Seop. Compertum est & exploratum, *Φαρουακείαν καὶ Σεογένησιν* nil quicquam proficere, ni & diætæ sobriè insimul administretur. Catenâ enim quasi quâdam aureâ hæc Medicinæ partes invicem conglutinatae sunt. Propterea hoc ipso in affectu juxta purgantia generalia, cuivis nota, non solum in medicamenta deflectendos sciamus oculos, sed & ad diætam.

Hæc verò non nimis simplex esto, neque etiam solum ad concoquendam cacochymiam dirigitor.

Opipera sit insuper & lauta; Nam sine Cerere & Baccho friget Venus.

Quin imò non parum succenseo ego non paucis Medicorum, qui in corpore bonæ spei, vivido adhuc & vegeto, nimis multum temporis & sumtum in concoquenda & præparanda cacochymia consumunt. In corpore quod dixi, vivido & vegeto, obstacula cacochymiae non quidem breviora, jucundiora tamen, removeatur.

Quapropter post expurgatam primam corporis regionem, dirigentium & præparantium loco cibos nostro patienti propinabimus, qui laudabilem generent sanguinem. Id ubi factum, natura reliquias im-

pur-

puritatum superstities expulsa est suâ sponte. Sic ergò dum Cacochy-
miam emendamus, primò præmittimus universale purgans: dein cibos
ἐνχυμῶν offerimus.

Dico cibos euchymos; ni simul tamen ordinem in pastu servan-
dum. Esto ille talis:

Victus in genere sit calefaciens & humectans flatuosus, hoc est spi-
rituosus, nec tamen exiccans. Differunt enim alias flatus & spiritus.

Juscula concessa; ea tamen quæ è Gallinis excoquantur, variisque
non pinguibus carnibus. Pingua quippe non nutriunt, sed flatus ge-
nerant, cum à natura in substantiam nutrimenti non convertantur: gi-
gnunt inquam flatus, nullos spiritus. Quod si quandoque ad tempe-
ramentum frigidiusculum se procliviorē persentiscat patiens, jusculis pul-
verem cardamomis adjungat. Parentur ea juscula è vino, ovis, croco,
cerevisia & ovis. Ex ciceribus rubris & albis excoquantur brodia, uti
& è pisces, zinzibere conditis. Fiant & contusiones ex amygdalis cum
aqua borraginis; quibus passulæ minores, cinamomum & saccharum
consociari poterit. Consimili planè modo parentur juscula vel emulsa
è pistaciis & nucleis pineis, quibus flos lactis addatur. Conspergantur
hæc ipsa pulvere cinamomi, caryophyllorum. Tandem & flavâ croci
Tinctura inficiantur. Interdum & caponis aqua, modo, qui sequitur,
parata, jusculi locum suppleat.

Gallus nempe decoquatur gallinaceus, vel capo, non tamen adusque
carnis decidentiam, sed ut adhuc quædam supermaneat cruditas. Caro
quæ melior thoracis, abstrahatur, ut & ossium, rejectâ tamen primò
omnium universâ pingvitudine. Minutim conseindatur hæc universa,
ut dixi, caro: contundatur in mortario, usque in pulmentum abeat.

Postmodum choenix brodii gallinarii affundatur, (cave adsit pingue-
do) transjiciatur per setaccum; colatum saccharo dulcoretur, pulvere nu-
cis moschatæ & cinamomi postidea conspergendus.

Panis è generosissimo paratus sit, tritico, benè ad saturitatem exco-
ctus in clibano, recens, cujus etiam massa cum semine anisi sit subacta.

In cibum veniant boves juvenculi, vituli, hædi, porcelli Tro-
jani, agni, lascivæ capellæ, apri, cervi tenelluli, capones, turtures,
pipiones, quæ teste Rhase, calorem nativum roborant, passerres,
horundemque cerebella, reguli, cerebella, variarium avium epata an-
serum, gallinarum.

Hisce carnibus benè decoctis addantur passulæ, cybebe & radices
petroselini: si assentur, caryophyllis, cinamomi, salviâ adornentur.

Acetum acidaque omnia & fercula exiccantia in harum carnum præparatione totaliter proscripta volo. Embammata sint è vino cum zinzibere, cinamomo, caryophyllis, saccharo, speciebus Bertholdi, tragæâ communi, sinapi albo, nasturtio, croco.

Pisces sint sicci, incocti vino, quibus & cinamomum, crocus insperguntur. In formâ fluida si quandoque sumere eosce placet, haud parcâ manu piper inspergendum, polonorum more. Palustres, lacustres, stagnosi, fumoque durati absunt: eliguntur magis, saxatiles qui sint.

Epata luciorum recens captorum, prassii, Amiæ, convenienter huc venient, sine tamen præpinguibus jusculis.

Ovabit & patiens noster, si ova gallinacea, passerina & perdicum sæpiusculè deglutierit, sed tamen cum pulvere moschi, cinamomi, cardamomi. Lacticinia probantur per omnem modum.

Legumina sint Oryza, amygdalata, pistaciæ, rapæ Portfeldenses, napi, ciceres albi, ptisanæ, passulæ, spinachia, mentha cocta, non tamen sine moscho, cinamomo, croco, pipere, ad salivam.

Lactucæ parentur cum oleo amygdalorum recentissimo: sint à scolyo esculento, mentha, floribus hortaginis, lampfana, rapunculis, rapaneolis. Reliqua proscribuntur.

Mensæ secundæ habeant confectioes amygdalorum, nucleorum pineorum, pistaciarum, juglandum: juglandes, nuges ponticas, recentes & decorticabiles castaneas, fructus dactylorum, ficus, panem Imperatoris vel biscottum, marcipanem, pyra à muscarum telis, quibus petuntur, perpurgata.

Poma cruda sub esu vino immerguntur, aut pulvere caryophyllorum, cinamomi consperguntur.

In promptu habeas cerevisiam non tenuem, sed tritico largiter imprægnatam, beneque defecatam. Horum sub censum pertinent Torgensis & Servestana. Vinum adsit purum, impermixtum:

In cratere tuo Thetis haud iungenda Lyæo:

Svadeo propterea, sit Deus atque Dea.

In usu ergò habeas Falernum, Rheticum, cumprimis vulturinum, Wipacense. Hoc sanè posterius cæteris in hoc affectu palmam si non præripit, tamen ambiguam facit. Bibas quoque claretum, in quo aromatum additio modum non excefferit. Bibas & vinum caryophyllæum.

Helenites & absinthites exulent.

Univerfim tandem de hocce cibo potuque hæ teneantur regulæ. Nunquam uno in prandio fercula numerum Gratiarum excedant. Multitu-

titudo quippe parit nauseam. Cibo etiam & potui modus inhibendus. Nimia enim, quantitate sumtus, cibus ventriculum opprimit.

Vinum copiosum non exhilarat, nec ad venerem proclivem facit, sed gravedine infestat cerebrum, somnumque inducit veterino non ab- similem.

2. Scopus. Hic semen sanguisque generandus, partesque prin- cipes roborandæ. E moscho & ambra paratus nodulus perpetim gesse- tur inclusus pixidi, quâ aperta, odor percipi possit ad libitum.

Unguento pectorali demulceatur cordis regio: oleo pectorali illi- nantur carpus, *καρπῶν*, latusque lævum, sed permutatim, cum un- guento pectorali.

Sacculus cordialis singulis diebus cordi applicetur.

Morsuli confortantes, confectio pistaciarum, pineorum quotidie binis sumantur vicibus, sed permutatim, horisque matutinis & pome- ridianis.

E trociscis à me præscriptis manè & vespèri excitetur fumus.

Vespèri Morsulus saccharinus ad formam vetetri intorti sumatur, ante ingressum lectisternii. Is enim & viscera confortabit, & imagina- tivam consopitam excitabit. Objecta quippe movent sensus. Nomina- ri posset pessarium saccharinum non ob ulum, sed ob externam formam.

ἐκ δ' ὁσῶν γίνονται τὸ ἐγῶν.

1. Nodulus ē moscho & ambra.

2. Unguentum pectorale.

Recip. *Ambra liquida* ℥j

Ol. Benzoini ℥j

Extract. spec. aromat. rosar. ℥j

Moschi

Ambra grysea

Cibeci ā. gr. iij

Ol. nucl. mosch. per express. facti ℥vj

Mis. f. unguent.

3. Oleum cordiale.

Recip. *Olei benzoini* ℥ss

Ol. cinam.

Lavend. ā. gt. iij

Succini albi ℥ss

Ol. croci gt. ij

Ol. rosar. per infus. facti ℥ss. *mis.*

4. Sacculus cordialis.

Recip.

Recip. Spec. aromat. rosat.

Diambre

Diomosch. dul.

Diatrim. santal. ā. ℥ij

Lig. aloes ℥j

Flor. rosar.

Lavend. ā. pjs

Fol. meliss. Mj

Moschi gr. iij

Ex incis. cum syndone rubra f. sacculus.

S. Morsuli confortantus.

Recip. Spec. ros. novell.

Diarhod. abbat. ā. 3ß

Magister. perlar.

Corallor. ā. ℥j

Amygd. dul. 3vj

Nucl. pineor.

Pistacior. in aq. ros. macerat. ā. 3ß

Citri condit. & anisi

Rad. eryngii cond. ā. 3v.

Nuc. in lrrd. con.

Zinzib. Chinens. con. ā. 3js

Ol. cinamomi gr. iij

Sachari alb. in aq. ros. dissol. 3vj

F. confect. in Morsulis.

6. Trochisci pro fumo.

Recip. Spec. Diambre

Xilualoes ā. ℥j

Styracis calam ℥ij

Benzoin. ℥j

Flor. lavend.

Macis ā. 3ß

Moschi

An. bræ ā. gr. V.

Cam aq. ros. r. Trochisci pro fumo.

S. Trochisci pro fumo.

7. Pessarium zacharinum.

Recip.

Recip. Cinamomi elect.

Zinzib. ā. ℥ij

Macerus ℥j

Caryophill.

Nuc. mosch. ā. gr. xv.

Galanga ℥ss

Incisis crasso modo adde

Amygal. dulc. ℥js

Pinear. ℥x

Pistacior. excort. ℥j

Fol. aur. n. viij

Extracti aromat. ros. ℥j

Ambra gryseæ gr. iiij

Sacchori albi in aq. ros. dissol.

F. conf. in Morsulis, qui adhuc calidi formentur & torqueantur ad formam pessarii vel verecetri.

3. & 4. Scopus. Hic parti affectæ succurrendum, quod tum manifestâ, tum occultâ virtute agentibus medicamentis peragendum. Idosum verò quaternis modis tentabo.

1. Admovendis. Posteaquam cacochymiâ corpus liberatum, partesque principales, puta cor & cerebrum, corroboratæ: jam pars affecta b incutem revocanda. Ea autem est putendum, quod tum impons est, tum & tumore affligitur varicoso.

Impotentia medicamenta opponemus, quæ tum occultâ tum manifestâ agant virtute. Tumorem varicosum oleo & unguento carminativo sequenti discutiemus.

Recip. Ol. de Sinapi

De castoreo

De baccis Juniperi ā. ℥iij

Ol. Anisi

Carui ā. gr. x

Zedoaria. gr. iij

Ol. rorismar. sylvestr. ℥ss

Mis. s. oleum pro scroto.

Recip. Ol. de castoreo

De euphorbio ā. ℥ij

Amygdal. amar. ℥iij

Ol. anisi destill.

Aaa 3

Cumi-

Cinnam. ā. gr. ij

Vini sublimati Rhen. 3vj

Benzoi 3ß

Cibeti gr. iiij

Cera parum f. l. ā. unguentum.

Fiat inunctio manè & vesperi.

Aër vel calidus sit, vel temperatus. Manè & vesperi inungantur plantæ pedum, regio renum, pubes, perinæum, caputque virgæ. Fia hoc manè & vesperi linimentis sequentibus.

Recip. *Ol. nucl. mosch. express. 3vj*

Extracti mentha gr. vj

Moschi

Cibeti ā. gr. v.

Mis. f. linimentum.

Vel Recip. *Extracti mentha gr. v.*

Ol. nuc. mosch. 3ij

Pul. pyrethri

Piper. nigri

Cubeb. ā. 3ß

Sevi hircini 3j

Fellus tauri 3ß

Moschi

Cibeti ā. gr. iiij

Styr. liquid 3j

Ol. de sinapi 3ij

Mis. f. unguentum

2. Assumendis. Cibi hoc tempore sine bonum succum multumque generantes seminis & sanguinis. Ex horum numero sunt succus carnis, nux Indica, testes gallorum vel vulpium, carnes lutrarum, castoris, polypis ostrearum, pinei nuclei in lacte materaci, castaneæ, fructus dactylorum, sinapi, Eruca, bulbi, pastinacæ, renes scincorum, passer troglodyticus. Parcior sit cœna prandio, aliàs tantum dormitur, veneri vero non invigilatur.

Medicamenta interna omnia sint confortantia & satyrica.

ELECTUARIUM.

Recip. *Castan. mundat.*

Avellanar. Italicar. ā. 3j

Amgd. venet,

Pistacior.

Pinear.

Pinear. ā. ʒij

Medulla nucis Ind. ʒss

Buliant in vino malvatico ad perfect. coct. Postea pistasis
add. cinam.

Zinzib. in Ind. cond.

Cubebæ. ā. ʒss

Extract. menthæ gr. ʒij

Sem. P. sinac.

Dauci

Eruce

Rapi sylvestr. ā. ʒj

Boleti cervi ʒjs

Boracis ʒj

Priapi Tauri.

Cervi ā. ʒss

Scinti marini circa renes & caudam ʒiij

Rad. satyrion. cond. ʒx

Eryng cond. ʒvj

Moschi

Ambra ā. gr. iij

Cerebell. passer. n. ʒiij

Mell, opt. despumat, vel sacchari albiss. q. s. pro Electuario.

MORSULI.

Recip. Rad. Eryngii cond. satyrion. ā. ʒss

Nuc. in Ind. cond. & inc. s. ʒijs

Nucl. pineor. pistacior. avellan.

Ital. in aq. cinam. macerat. ā. ʒiij

Sem. pastinac. rapi sylvestr. ā. ʒj

Boleti cervi ʒss

Boracis stync. mar. ā. ʒj

Moschi, ambræ ā. gr. iij

Ol. coriand. cinamomi ā. gr. ij

Sach. alb. solut. in aq. rosar. ʒviii f. Conf. in Morsulis.

TABULÆ.

Rec. Rad. cardap. pulv. bolet. cervi. ā. ʒss

Cinam. cubebæ. sem. eruce ā. ʒj

Piperis longi ʒij

Croci gr. V.

Priapi

Priapi Taur. ʒß
Magister. corall. ʒj
Ambra gr̃ss. gr. v.
Sachari alb. solut. in aq. rosar. ʒvj
f. Conf. in rotulis

S. Tabula.

Singulis diebus manè ubi surrexerit, vesperi & post meridiem utatur permutatim Electuario, Morsulis, Tabulis. Pulvis.

Recip. *Priapi Tauri ʒß*

Sem. eruce

Cinam. elect.

Cubebæ. ʒ. ʒij

Caryophyll.

Nuc. Ind.

Galangæ

Piperis longi

Zinzib. alb. ʒ. ʒß

Scinc. mar.

Potentillæ pul.

Test. cervi pul. ʒ. ʒj

Margarit. præp. ʒij

Sacch. candi alb. ʒ. ʒiij

Mis. f. pulvis.

Hoc pulvere omnia conspergat fercula pro tolerantia. Quotannis etiam hunc pulverem in usu habeat tempore vernali, & circa Ægidii, quo tempore & cervi petulci lascivire solent.

Circa horam tertiam matutinam sequenti utatur pharmaco. Recip. *Omni aurorâ tres vitellos ovorum. Coq. lento igne cum Malvatici libræ s̃ misse: in fine coctionis adde Penidior. ʒvj*

Saiyrion. pul. ʒj

Macis ʒß

Croc. gr. ij

Mis.

Bibat totum in aurora, & postea dormiat ad libitum.

3. Vacuandis. Modicè evacuatur, ne pro Cypride Copros. Novimus Medicum, qui primario cuidam viro, hosti reconciliato dedit purgans fortius, à quo & valvula seminalis aperta, semperque postea semen exiit, qui vir tandem & marasmo extinctus.

4. Fa-


4. Faciendis. Somnus non excedat modum. In lectisterniis decumbat molliviculis. Exoneret mentem curis : moveat pedes & equitet : sic animo hilari : legat scripta venerea, spectaculaque venerea multoties intueatur.

Atque hæc erant, quæ tum de legitimi coitus forma & modo, tum de impotentia aphrodisia curâ proferre volui. Peracta ea fuerunt à me sine scandalo, debitâ cum modestiâ. Neque sanè scurriles nugas agere soleo apud infirmos, quod quidam faciunt : Memor ego sum illius, quod extat apud Sophoclem : τῷ νοσῶντι ληρῆν, ἀνδρὶς ἑλὶ σώφρωνος.

Faxit DEUS, ut hic noster patiens crescat & multiplicetur.

CONSILIUM LXVI.

IN MELANCHOLIA HYPOCHONDRIACA CUM ALBO FLUORE UTERI, VARIISQUE ACCIDENTIBUS,



Conqueritur honestima matrona de dolore capitis, aurium, tinnitu, vertigine & visus depravatione; similiter quoque de appetitus dejectione atque orificii ventriculi compressione. Præterea quoque fluore albo uterino hætenus fuit correpta, qui à puerperio statim est exorsus, nunc verò temporis paululum cessavit.

Symptomata hæc omnia eò proveniēre, quòd bis foetum mortuum partu exclusit.

Quoniam verò in tam valido ac laborioso parturiginis nixu præter copiosam, quam par fuisset, sanguinis profusionem, uterus magnoperè debilitatus ac refrigeratus fuerit : Idcirco ille & epar, & ventriculum, caput, reliquaque viscera, lege quadam consortii, eadem intemperie affecit.

Cum enim sanguis calorem innatum sustentet, & omnes ac singulas corporis partes nutriat ac roboret, quis dubitabit, ex nimio sanguinis profluvio easdem quoque multum debilitari ac refrigerari, præsertim verò illas, quæ singulari quâdam sympachia cum utero consentiunt, quales sunt caput & ventriculus. Ventriculo itaque hæc ratione debilitato ac refrigerato, succus alimentalis non perfectè coctus, in crudum ac pituitosum excrementum transit, ità ut epar imbecillius crudum istum succum non laudabilem in sanguinem, sed in pituitosum hu-

morem convertere cogatur, qui uterum refrigeratum magis lubricum & impurum reddit sicque collectus, more fluoris albi muliebris fluit, interdum antè interdum post menstruam purgationem, quippè cum ad nutritionem minimè sit idoneus, pedetentim ex matrice profluit, qui- que calorem naturalem interdum adeò mutat, ut loco sanguinis humor albus, pituitosus, viscidus ac lentus, (prout in venæsectione aliquo- ties nobis videre licuit) exeat.

Partim verò epar hujuscemodi succos crudos, lentos & viscidos ad caput & cætera membra mittit, qui tamen minimè corpus nutrire pos- sunt, sed plerumque in frigida & mucosa excrementa transeunt.

Hinc innumeræ prodeunt defluxiones & catharri, dolores capitis non contemnendi, qui-que tantò magis exacerbantur quantò plures va- pores frigidiusculi ex utero & ventriculo adscendunt, caput petunt, & vehementer replent. Et quod magis est, hujusmodi vapores frigidi sæpè ad oculos perveniunt, illosque micantes reddunt. Quo altius au- tem tales vapores exsurgunt, tantò validius tinnitum aurium & verti- ginem proritant, & quando ventriculus (ut paulò antè monui) coctio- nem non rectè absolvit, succus alimentalis paulò crassior & tenacior in venis mesaraicis ad epar & lienem tendentibus hære, ibidem incale- scere & acescere solet, e quibus postea acris acidus ac tenebricosus va- por iursum vergit, qui si orificium ventriculi tangit, nauseam & inap- petentiam mover, si verò ad pulmones commeat, anhelitus difficulta- tem & pectoris angustiam procreat, si cor aggreditur, palpitationem ac tremorem ejusdem excitat, nonnunquam etiam lypothymiam. Si per fauces transit & linguam tangit, loquelam impedit : si altius pergit, cerebrum perturbat, dolores in fronte, maxillis, cervice dorso ac offe- sacro movet, ita ut quandoque non surgere sed fellæ affixi federe cogan- tur. Accidunt quandoque & alia symptomata, de quibus satis super- que egimus in consiliis de melancholia hypochondriaca, hisque potis- simum de illis locuti sumus, de quibus conquesta est nostra patiens.

Si itaque præsentī malo occurrere velimus, necessarium erit, ute- rum ob nimiam hæmorrhagiam & partum tristem ac monstrosū ma- ximè refrigeratum ac debilitatum, summo studio calefacere & ad sta- tum pristinum reducere, quippè qui cum reliquis corporis membris fri- giditatem suam communicavit, & etiamnum communicat.

Cum igitur non solum uterus, sed & reliquæ corporis partes hu- more frigido, viscido & lento scaturiant, primò omnium humor iste digerendus concoquendus ac per idonea, Remedia educendus venit
quo

quo peracto absque ulla capitis molestia per balnea & alia ad id nata apta medicamina matrix ad pristinam temperiem reduci nequit, si verò matricis calefactionem, ante universalem hujus excrementitii humoris evacuationem nosmettenare velimus, non saltem Æthiopem lavaremus, sed etiam frigidiusculorum istorum humorum conturbatione, cephalalgia & aliorum gravissimorum symptomatum promotores extaremus.

Nullus autem dubito, quin honestissima hæc matrona exoptatam sanitatem sit recuperatura, si medicamentis præscriptis cum indubitata in Deum primò, dein & in medicum confidentiâ (quo interdum, Avicenna attestante, plus valet, quam Medicus cum omnibus suis medicinis) sequenti modo utatur.

Primum igitur pillulas A. deglutiat omnes, cum syrupo melissæ vel alio convenienti vehiculo.

Posteà herbas B. coquat in cantharo uno vel altero cerevisiæ benè defœcatae, sinat refrigerare per se in cella, colet, colaturæ per duos dies manè ac vesperi uncias quinque vel sex capiat.

Die sequenti pulvere C. utatur in jure cicerum rubeorum cum croco & guttulis duabus olei cinamomi misto. Post de herbis iterum bibat per biduum, rursus utatur pulvere: Tertiò de herbis bibat ut antea, & iterum pulvisculum sumat.

Si post usum horum medicamentorum alvus fuerit constipata, utatur clystere D. alvum laxaturo & matricem calefacturo.

Sæpius me herclè hoc utendum, ita namque capitis dolor aliaque symptomata lenientur multum. Rotulas E. usurpet singulis auroris & vespers: pro dosi una quinque vel sex sufficient. His peractis status sui certiore me faciat & ordinabo postea balneum ad uterum, aliaque multa, quæ videbuntur necessaria, usurpanda.

De virtus ratione nihil moneo, quippe cum ea antè patienti ipsi optime sit nota, & ab aliis etiam sufficienter præscripta.

SEQUUNTUR RECEPTÆ.

Recip. *Mass. pill. cochiar.* ℥j

De hiera cum agar. 3℥

Assajereih ℥ss

Dacryd. gr. j

Cum aq. cinamomi f. pill. n. xxj.

S. Villen. A.

Bbb 2

Recip.

Recip. Rad. aristolachiae rot. vera ʒiij

Diptami albi ʒß

Zedoar. ʒij

Cichorii ʒj

Rad. pentaphylli

Pæonia ā. ʒiij

Fœniculi

Asparagi ā. ʒij

Cort. rad. Thamaris.

Fraxini ā. ʒs

Sem. dauci ʒij

Pæon. ʒjs

Herb. matricar.

Melisse

Origani

Ceterach.

Agrimoni.

Flor. stæbad. Arab. ā. Mj

Cichorii Mjs

Conquassata dentur ad chartam.

S. Recutet B.

Recip. Turbith. albiss. & gum. ʒß

Rhab. inter. & opt. ʒj

Dacryd. gr. ij

Cassia lignea ʒß

Pulveriscentur subtilissimè.

S. Pulver C.

Recip. Ligni sassafras pulverisati & ligati in petri ʒij

Herb. matricar.

Melisse

Mercurialis ā. Mjs

Fol. lauri Mß

Coq. in s. q. aq. pro ʒij

Colatura Recip. ʒxj

Mell. ros. col. ʒjs

Mis. f. Enema.

S. Clyster D.

Recip. Spec. diamargarit. calid. Avic. ℥v

Diambre ʒß

Diarrhod. Abbat.

Aromat. ros. S. moscho ā. ℥j

Ol. caryophyll. gt. iij

Macis destill. gt. ij

Sachari albiss. sol. in aq. melissa ʒiij

℞. confectio in rotulis.

S. Röchlein E.

CONSILIUM LXVIII.

IN IMPOTENTIA DECUMBENDI, DOLORE STOMACHI, UTERI INFLATIONE ET FLUORE ALBORUM MENSIVIM IMMODICO.

Postquam Nobilissima matrona ingentes inflationes ventriculi, cum gravissimis utriusque lateris doloribus persentiscat, ita ut in neutrum latus tuto decumbere possit, insuper uterus adeo sæpè protuberet, ut non rarò se gravidam falsò putet, (quando enim menses, ut plerunque accidit cum magno impetu distensione ac compressione erumpunt, tumor statim cedit) & factà purgatione menstrua, ferè quotidie humor pituitosus viscidus ac lentus utero effluat, certum est, hæc omnia fieri ex inæquali complexione dictarum partium, frigidum scil. crudum, partim etiam adustum lividumque sanguinem ex cibis etiam laudabilibus generantium. Ventriculi enim œconomia labefactatâ, jecur sanguinem bonum producere nequit, cum præsertim obstructum id sit & turgidum.

Lien autem sanguinem illum adustum non sufficienter attrahit, prout ille hic est dispositus, sed venis remittit, unde singulis mensibus mixtio malorum humorum in uterum decumbit: qui crassi lenti & frigidi cum sint, in venas justè illabi nequeunt, unde tormina, dolor & compressio oriuntur, uterus quoque magis inde frigescit, inflationique ac albo fluori obnoxius redditur: Cujus mali postea ventriculus quoque fit particeps, ob frigidos scil. humores in eum restagnantes, quibus ita vexatur, ut cibos ingestos non perfectè concoquere, sed in serosos humores, flatibus procreandis apuissimos convertere cogatur, unde infla-

tio ventriculi non sine dolore, hincque epatis ac lienis ab eadem compressio, horumque viscerum effervescentia, à qua vapores pravi non solum caput, sed & thoracem petentes, tremoremque cordis cum asthma procreantes, linguam vellicantes, loquelam impediētes, oculi caliginem subfundentes capitique vertiginem adportantes, aliasque infinitas, tanquam ex lernæa palude hydras producentes.

Si igitur nobilissima matrona de tot & tantis hostibus victoriam reportare velit, sequentibus armis illos invadat, oportet.

Primò itaque utatur catapotis A. manè circa horam 7. jejunando ad 10. mox nodulum B. præparet, ut optimè novit.

Hic obstructions epatis pariter ac lienis aperiet, crudosque evacuat humores. Ubi 2. dies de nodulo biberit, tertio die quiescat, & hora nona antemeridiana medianam brachi sinistri aperiat, usque sex unciae sanguinis effluxerint, sequentibus diebus iterum de nodulo bibat ad consumptionem superfusi, inde rursus per diem integrum quiescat, & sequenti die manè hora sexta pilulas M. deglutiat, atque ad 10. jejundet.

Reliquis diebus singulis manè lectum egressa quinque rotulas D. comedat. Post spongiâ tepidè dextrum latus super epate per semihorulam foveat, fotu ex herbis lit. E. notatis, locumque abstersum unguento G. calidè inungat duplici linteolo superposito, similiter faciat cum herbis F. & unguento H. in latere sinistro. Notandum tamen quod in fotu ex herbis F. chalybs ignitus septies sit extinguendus, unciaeque acetosacei tres addendæ. Fotus autem uterque, & inunctio bis in die usurpanda, manè hora 7. & à prandio h. 3. quinque tamen rotulis semper prius comestis.

Hisce usurpatis & mensibus iterum egressis per biduum ab omnibus medicamentis abstineat. Tertiâ verò aurora utatur pulvere lit. I. signato in jure cicerum rubeorum calido, jejundet usque ad decimam, sicque uterus peculiariter à fluida viscida & alba materia expurgabitur.

Postmodum uteri gratiâ balneo ex herbis K. & aqua simplici parato utatur, continuetque hoc balneum per octiduum, & quidem bis de die, mane scil. hora 7. vesperti tertiâ, balneum egressa quiescat in lecto calido, sudore erumpente mediocriter & pro libitu sudet, absterfa vestiatur, & pedes ab externo frigore providè muniat. Demum in sella conveniendi collocetur, cui supponat prunas ardentes, immittatque unum de trociscis L. fumumque uterum permeare sinat. Suffitu hoc aliquoties facto, usum rotularum D. rursus aggrediatur, sicque finem usui medicamentorum feliciter imponat.

Toto autem hoc tempore temperanter vivat, & dietam puerperam
 mitetur, abstineat à cibis duris & concoctu difficilibus, bibat ce-
 am multo lupulo vel lingua cervina conditam & vinum rhenanu^m
 rum, vitet aërem frigidum ac pluviosum, similiter iracundiam ac
 terrorem, & divina favente gratiâ pristinæ sanitati restituetur.

Recip. Mass. pill. de kiera c. agar. ℥ij

De aloe & mastic. ℥j

Diagryd. gr. js

Cum aq. cinamoni s. pill. n. xxj

S. Pilule A.

Recip. Rad. dictam. albi ℥ij

Calami arom. ℥js

Aristoloch. rotunda ℥ss

Valeriana ℥ij

Leristi. i ℥ss

Rub. tinctor. ℥iij

Cort. rad. Thamaris. ℥vj

Sem. citri ℥js

Dau. i ℥iij

Plantag. ℥j

Rhabarb. optimi ℥js

Spica ℥j

Agarici troisc. ℥iij

Fol. Senna S. stipitib. ℥ij

Epithym. cret. ℥j

Herb. ceterach.

Spicanth.

Agrimon.

Melisse

Marricar.

Puleg. ā. Mss

Adiant. nigri

Capill. Vener.

Cichorii ā. Mss

Pulverisata ligentur in nodulo facto ex panno lineo albo
 duplici, S. Nodulus B.

Recip. Cort. rad. helleb. nig. styriaci preparati ℥ij

Caryophyllor. ℥ij

Turbith. alb. ℥iij

Mss.

Mis. f. pulvis ligatus in noau'o.

S. Nodulus C.

Recip. Spec. diuarg. calid. 3ß

Diacinam diacynini, diuisi ā. ʒij

Arom. ros. gr. xv. troc. de cappar. 3ß

Derhabarb. gr. xv. diarhod. Abb. 3ß

Ol. caryophyl. gt. vj. Sachari alb.

Soluti in aq. cichor. & meliss. ʒiij

F. conf. in rotulis.

S. Rotula confectionis D.

Recip. Rad. malva & herb. ejusdem ā. Mj

Flor. chamomel. rosar. rub. ā. Mß.

Herb. absynth. Mjs. Incisa dentur ad chartam.

S. Herba E.

Recip. Rad. Helenii, cucum. asini i ā. ʒv

Malva ʒj. cort. rad. thamaris. fraxini ā. 3ß

Fic. ping. n. ij

Sem. agni casti, plantag. ā. ʒiij

Herb. puleg. Mj. ruta Mß

Ceterach. spicant. ling. cerv. ā. ʒiij

Fol. Senna Mjs

Flor. chamomel. Mj

Melios. S. aneth. ā. Mß. Incisa & conquassa
ta dentur ad chartam.

S. Herba F.

Recip. Ol. nardini, de absynth. chamomel ā. 3ß

Ungt. rosat. ʒij

Flor. chamomel. absynth. sicc.

Pulveris ā. 3ß.

Rosar. rub. 3ß

Ceraparum f. linsen.

S. Unguentum G.

Recip. Bdellii, ammoniaci. oppopanax. serapin. ā. ʒj
in aceto scyllit. dissolut.

Ol. amigd. dul. axung. porc. ā. ʒvj

Rad. cyclam. ʒjs

Centaurii min. 3ß

Agarici pulv. ʒij

Cort. rad. belleb. nig. ʒjs

Ol. de cappar. rutb. aneth. ā. ʒß

Vini sublimati ʒj

Bulliant parum & adjecto modico ceræ f. linimentis.

S. Unguentum H.

Recip. Turbith. alb. ʒij

Rhabarb. opt. ʒj

Mis. f. pul. S. Pulvis. I.

Recip. Rad. valerian. petrosel. ā. lbj. consolida

majoris lbß

Artemisia, savina, betonica. meliss.

nepet. origani ā. Miiij

Flor. chamomel. melilot.

Fol. lauri ā. Miiij

Sem. anisi, carui, cymini, anethi ā. ʒjs

Fœn gr. ʒijs. ros. rub. Mij

Incisa & contusa dentur ad sportulam.

S. Herba K.

Recip. Gallie moscat. alipt. mosc. ā. ʒj

Nuc. mosch. spicænard. caryoph. ā. ʒis

Laudani, mastice

Olibani. myrrha ā. ʒij

Dissolut. gummatib. in vino & additis

pulverib. aliis f. Troscici pond. ʒj

S. Troscici fumigales L.

Recip. Mass. pill. aggregat. ʒij

Ammoniacy in aceto scyllitico dissol. gr. xvij

Cum pul. ceterach. f. pill. n. xxj

S. Pilula M.

CONSILIVM LXIIX.

CONTINENS INTERROGATORIA IN SUSPECTA UTERI DISLOCATIONE.



Obilissime Vir, contendis à me magnoperè, ut medicamen-
ta è pharmacopolio nostro tibi mittam, quibus carissima
uxor tua utatur in uteri furore vel dislocatione.

Atqui cum postulata mulierum à maritis plerunque

Ccc

sint

sint vel fallacia vel captiosa vel denique ἀπαλογητὰ & irrationalia, fit ut Medici iis facile credentes, facilius decipiantur: ex pudore etiam nimio & nocivo, qui honestissimæ tuæ uxori, primâ ab origine connatus esse videtur, pro affectu vero dissimulato, falsus simulatur alius.

Cum itaque honesto cuilibet Medico cavendum sedulo, ne sordidiæ ipsi aspergatur labes: cum etiam necessario curationem morbi præcedat cognitio, juxta illud Galeni: quantum quisque in cognitione morbi fallitur, tantum in medendo errabit: Consultissimum erit, ut ad sequentia prius mihi respondeat interrogatoria. Id ubi ab eâ factum, quid à me factu opus, dispiciam.

I.

An menses fluant ritè, justâ quantitate & terminis Lunationum jam ante solitis & consuetis?

2.

Nunquid biduò antequam menses effluant, vel etiam biduò post, materia quædam effluat alba, aquea & mucilaginosa?

3.

An effluvium illud aqueum & mucilaginofum tempore sit mutatum quantitate?

4.

An materia mensium naturali colore sit prædita vel non?

5.

Nunquid uterus ipsi ante vel post mensus intumescat?

6.

Nunquid ante mensium tempus tormina persentiscat circa uterum, peritonæum & alterutrum latus,

7.

Nunquid uterus interdum feratur sursum, vel alias sit immobilis & inconstans & inquietus, & uno in alterum devolvatur quasi locum, nec ne?

Numne insuper uterus versus inguina feratur cum periculo excidentie torminibus & compressionibus: An verò tandem spinam versus uterum devolvi sentiat?

8.

Nunquid compressiones & molestias percipiat ventriculi: uti & an ventriculi appetitus benè se habeat.

9. Nun-

9.

Nunquid persentiscat, verticem capitis infrigidari, à quo & gravedines vertiginesque subsequantur.

10.

An non & ventriculum quandoque sursum ferri, & trunci ad modum in gulam intrudi cum suffocationis periculo animadvertat.

11.

In hypochondrione dextro anverò sinistro numne tumores interdum instar colliculi alicujus deprehendat.

Hæc Medicum curaturum scire oportet, non solum propter morbi quidditatem, sed & ejusdem causas. Ad hæc si categoricè mihi responsum fuerit, libenter quantum in me faciam.

*POTENTISSIMÆ QUÆDAM MEDICINÆ IN UTERI
DISLOCATIONE.*

E Tribus staminibus filamentorum communium paretur lixivium, modo quo dixi alibi. Ea in lixivio cocta, eximantur, conspergantur pulvere caryophyllorum, matricariæ &c. Ex his unum stamen superponatur margini vasis illius, in quo calidum est lixivium, & huic infideat. Alterum Perinæo applicetur, tertium lateri tumido, vel dorso, prout necessitas efflagitarit.

Consimiliter cucurbitâ siccâ vitreâ prægrandi, cui stuppa succensa sit, maximâ cum utilitate & admiratione uterus ad locum compententem retrahitur. Inter easce autem actiones permutatim & perpetuo dentur Morsuli, Electuaria & confectiones, tum morbo huic appropriata, tum verò & conceptum juvantia, qualia sunt Extractum Artemisiæ, sanæmundæ, Eryngii, factum cum vino rubro. Morsuli item è coagulo leporis. Interim non neglegantur quæ requirit Methodus.

CONSILIUM LXIX.
IN DISLOCATIONE UTERI.



Conflatabatur Nobilis quædam Matrona dislocatione uteri truculentâ & formidabili. Hæc sequentibus præsidiis usa, citò, tutò, & jucundè exoptatæ restituta fuit sanitati, utero simul ad moderatam temperiem perducto, eisdemque fœcunditate conciliatâ. Juxta autem medicamentorum jam

subscribendorum iusum, adhibitæ quoque summâ diligentia fuerunt for-
mentationes illæ per stamina filamentorum crudorum, cum pulvere se-
minis carui & caryophyllorum aromaticorum, de quibus copiosè à
nobis alibi,

Recip. Mass. pill. de hiera c. agar. ℥ij

Aggregat. ℥j

Dacrydi. gr. j.

Cum aq. cinamomi f. pill. n. xxj

S. Pilula A.

Recip. Rad. Valerianæ ℥iij

Aristoloch. rotunda ℥ij

Fœniculi ℥ss

Cort. rad. cappar.

Thamarisc.

Fraxini ā. ℥iij

Rad. Zedoaria ℥j

Sem. aquileg. ℥j

Dauci ℥j

Ling. aris ℥js

Rhabarb. interioris & opt. ℥ij

Spica ℥j

Agarici trocisc. ℥ijs

Fol. senna ℥ij

Epithymi cret. ℥j

Herb. betonica

Ca'amenth.

Pulegiæ

Ceterach.

Spicant.

Agrim. ā. Mss

Melisse

Matricar.

Cichor. ā. Mj

Pulverisata omnia ligentur in sacculo facto ex panno lineo duplici.

S. Nodulus B.

Recip. Turbit. alb. & gumm. ℥js

Cort. rad. elleb. nig. styr. præp. ℥ijs

Caryophyll. ℥ij

*Pulverisati ligentur in nodulo facto ex
linco duplici*

S. Nodulus C.

Recip. Turbith. albiss. ʒß

Rhabarbari opi ʒjs

Zinziber. ʒß

Mis. f. Pulvis.

S. Pulvis D.

Recip. Troisc. de rhabarbaro ʒij

De capparib. ʒjs

Spec. aromat. rosar.

Dianisi ā. ʒß

Margarit. preparat. ʒß

Caryophyll. minutim cisor. ʒj

Sacchari albiss. solut. in aq. scolopend. ʒiijs

Cum gt. vj ol. macis destillat.

F. Conf. in rotula.

S. Rosula E.

Recip. Ol. chamomel ʒß

De absinth. ʒj

Mis. S. Limimentum F.

Recip. Ol. de capparib. ʒvi

Chamomelin. ʒß

Laurini ʒiij

Mis. S. Limimentum G.

CONSILIUM LXX.

IN UTERO MALE DISPOSITO ET
PRO RATIONE DISLOCATIONIS VA-
RIA SYMPTOMATA EXCITANTE.

Superioribus diebus N. N. uxori tuæ lectissimæ coram signi-
ficavi, illam matricem habere planè inquietam & pessimè
dispositam, quæ rarissimè in situ permaneat naturali, sed
facillimè de loco in locum moveatur, unde & sympto-
ma, de quibus conqueritur, suboriantur. Quod autem matrix ip-
sius

sius toties huc & illuc fluctuet, sit partim ratione ligamentorum, quod humidiora ac laxiora quam par est, sunt reddita, partim quod uter nimiam pituitæ copiam sit gravatus, sicque gravior factus facillime anteforsum ad ossa pubis vel dextrorsum & sinistrorsum ad coxas, vel retrorsum ad os sacrum reclinat ac decumbit, & pro ratione decubitus, varios causat affectus, quemadmodum quoque si sursum adscendit, multa ac terribilia symptomata excitat.

Pro sublevatione igitur hujus mali utatur primò pilulis A. cum vino vel cerevisia jejuset ad decimam. Herbas verò B. in linteolo collectas coquat in olla nova cum quatuor libris cerevisiæ ad medietatem, dein singulis auroris lectum egressa & vespere h. 3. calidè de hac portione ebibat cochlearia quatuor vel quinque, jejuset ad consuetum tempus, & pergat usque ad consumptionem cerevisiæ. Sequenti mane h. 3. sumat pulverem C. in jure cicerum rubeorum, jejuset ad decimam. Jus cicerum paratur, si aqua ad eos affundatur, bulliant dum dehiscant, postea adjice fragmenta cinamomi, bulliant iterum & colentur, pulveris hic electivè purgabit uterum. Sequentibus diebus manè h. 7. vespere h. 3. comedat unum ex morsulis D. pergat dum durant. Quod autem uterus suum occupet locum, patiens nostra ante usum morsulorum sequenti fomentatione uti, mox unam eorumpem comedere debet. Accipiat tria stamina filorum crudorum: conspergat quodlibet stamentum pulvere caryophyllorum & seminis carui, pro quolibet conspergat drachmas duas, addat sufficientem quantitatem cineris, affundat aquam, sufficienter coquat, sicque fomentum paret, quod in vas quercinum mittat, ipsa supersedeat, & unum stamentum sub pudenda, reliqua verò duo stamina prope pudenda circa utramque coxam statuant, sicque uterum hujusmodi filamentis præparatis optimè coaperiat, idque per ostiduum continuet, incipiat à quadrante horæ, pergat ad dimidiam, desinat ad integram, si aqua fomentatoria nimis refrigeretur, poterit calefieri filicum vel laterum tribus portiunculis ignitis, totum vero corpus benè vestiatur & cooperiatur, ne vapores caput petant, dolores excitent.

Dein quiescat in stragulo, licet etiam sudorem percipiat. Postmodò utatur Morsulis dictis, & pedes ac crura à frigore factis fotionibus defendat, diætamque puerperarum imitetur. Et ut eò melius maneat in locum regrediatur suum, Emplastrum E. sub umbilicum ponat, quod uterum in loco suo naturali dubio procul retinebit. Ne etiam levissima causa ipsemet uterus fiat inquietus, radices levistici, ut & oleum seu

succini semper ad manus habeat, hæc enim medicamenta ut
atoria nunquam negligere debet.

Recip. Mass. pilular benedict.

Aggregat. ā. ʒß

De hiera c. agarico ʒij

Diagryd. gr. j.

Cum aq. arthemisiae f. pill. n. xxj

S. Pilula A.

Recip. Rad. dictum. albi valeriane ā. ʒij

Levistic. aristoloch. rot. ā. ʒiij

Cichorii ʒj

Sem. paon. ʒiij

Herb. cichorii

Endivia

Ceterach

Pulegii

Melissa

Marricarie ā. Mß

Beton. Mj

Dentur incisa ad chartam.

S. Herba B.

Recip. Turbith. alb. & gummosi ʒß

Rhabarb. ʒj

Caryophyllor. ʒß

Mis. f. pulvis.

S. Pulver. C.

Recip. Caryophyllor. ʒjs. cinamomi ʒij

Spec. diamargarit. calid. ʒj

Rad. eryngii cond. & incis. ʒß

Extracti zedoar. gr. vij

Conser. anthos ʒiij

Melissa ʒij

Sach. albß. sol. in aq. melissa q. s.

F. Conf. in morsulis aromatiss. gut.

6. olei Macis.

S. Morsuli. D.

Recip. Galbani in aceto dissoluti ʒx

Gum. Tacamach. ʒijs

Bdellii ʒiij

Myrr.

*Myrrhæ 3j**Syrac. liquid. 3ij**Pul. Arthemif.**Scarlea ā 3j**Ol. rutacei & cera ā. q. s.*

F. Ceratum de quo q. s. extendatur supra corium rotundum latum dig. 6. & sindone obductum intersuatur. S. Emplastrum. E.

CONSILIUM LXXI.

IN ARTHRITIDE, CALCULO, ET
MELANCHOLIA HYPOCHONDRIACA
EX OBSTRUCTO SPLENE.



Tatus morbi, quo Dominus æger quàm diutissimè affligitur, hic est. Sæpius per intervalla tamen, nunc Podagrâ, nunc Cheitagrâ, interdum etiam arthritide verâ, affligitur: cujus sanè doloris & tumoris potissima causa esse solet flatus, quamvis etiam interdum utraque fiat ab affluxu materiæ alicujus, maximè pituitosæ. Corripitur etiam interdum Nephritide ita ut calculos aliquoties cum urina excreverit, & multos & satis magnos, absque magna tamen difficultate. Accedit his malis & hoc, quod propter lienis obstructionem hæmorrhoides consæto tempore sanguinem superfluum non extillant, qui satis sit pro imminuenda hâc plethora. Præter hæc verò omnia, æger quotidie cum flatibus multum habet negotii, adeò ut ex levi obstructione alvi, multum compressionis circa diaphragmatis & ventriculi regionem sæpè sæpius sentiat, nec non etiam capitis gravitatem, vertiginem aliquam, si quando eò ex corporis erectione aliâve commotione, quæ modica non est, rapiuntur. Undè fit, ut ferè semper decumbere cogatur æger, & ab omni etiam lectione librorum abstinere, qui tamen alias in perlegendis libris bonis totus est, & occupatur libentissimè.

Ex historia, quæ commemoratur, animadverto temperamentum integerrimi viri esse frigidum & humidum, in quo abundant multi humores serosi & pituitosi, qui faciliè resolvuntur in flatus & dolores arthriticos, & nonnunquam podagram & cheiragram excitant: quibus additur & calculus renum. Quæ affectiones omnes ad commune

tem.

temperamentum totius referuntur : habent enim inter se communionem cacoehymiae, ortæ ex intemperiae frigida & humidâ viscerum. Ubi enim vitium primæ coctionis in promptu est, quemadmodum ex copia flatuum patet, non est dubitandum de alteratrice ventriculi imbecillia : quâ præfente consequens est secundam coctionem non minus convenienter & debite quam primam fieri, & deinceps pro nutrimento partibus alendis humorem excrementitium & ad nutriendum non idoneum transmitti : & hinc materiam defluxionum ad articulos & renes pro generatione calculi per venas devehi : paroxysmos huiusmodi tantò frequentius repeti, quanto cacoehymia pituitosa plethoræ propius accedit, & robur naturæ firmitus est, ad materiam copia & qualitate gravantem aut per certa intervalla temporum anni ; (quod annotandum etiam in historia cuperem) aut continua fluxione, ad articulos & renes in falsu quotidiano paulatim & sensim facto propellendi.

Commemorantur præter hæc etiam alia symptomata, videlicet flatuum copia circa ventriculum & ex his diaphragmatis compressum & alvi durities, cum vertigine & capitis gravitate : Quæ cum non sequantur temperamentum totius, sed potius ex parte malè affectâ originem ducant, idcirco peculiarem considerationem requirunt.

Certum autem est partem affectam in hac symptomatum congerie esse hypochondria, & affectum istum hypochondriacum inde rectè & verè appellari. Fit autem hypochondriaca, sive Melancholia mirachialis seu flatulenta, quotiescunque ventriculi coctrice tabefactata propter externum errorem, multa cruda pituita generatur : quæ calore venarum mesaraicarum (sive ad hepar, sive lienis substantiam pertinentium) similiter ex causa externa, pulsquàm ex usu naturæ est aucto, impeditur, quo minus & ut decet, mox ad epar & splenem attracta transeat, sed in ipsis hæreat, ibique lentescat & ace scat, partim cale scat & inflatus convertatur.

Et cum talis pituita non sit simplex & pura, sed pro ratione ingestorum mixta, fit ut multum melancholici succi pituitæ permixtum duo nobis mala producat : primum flatus hypochondriacos, nam tenuis pituita & serum humoris melancholici minera esse solent flatulentiae : Deinde vertiginem & capitis non quidem gravitatem perfectam (quæ ex copiâ humorum proficiscitur) sed capitis ad agendum quasi inhabitatè.

Et si enim caput repletur & gravius afficiatur, tamen ea repletio potius ex vapore quam humore originem ducit. Quo fit, ut modò hilarior.

lariori animo & capite minus affecto æger nonnunquam sese sentiat: interdum verò magis, scilicet pro coctione ventriculi felicius & expeditus peractâ. Nam in hypochondriaca propter obstructionem hypochondriorum faciam è calore venarum meseraicarum, ut supra monui materia partim est calida & acris, partim acida & adstringens. Calida ex victu & calore venarum meseraicarum, adstringens & acida ob cruditatem ventriculi & mixtionem succi melancholici. Talis materia, cum à calore tum partis, tum totius continenter subigatur, sursum mittit vapores similes quidem, sed tamen omnes paulò crassiores, subastringentes, acres, nebulosos, obscuros, & partim frigidos partim calidos: hi delati ad diaphragma & pulmones difficultatem quandam respirationis, ad asperam arteriam, leviusculam quandam interceptionem aëris, ad linguæ radicis veluti motum ad loquelam formandam, impeditum: propulsi verò ad cor, palpitationem quandam, eamque graviolem, quanto crassiores sunt; ad cerebrum verò vertiginem, quanto sunt copiosiores: metum aut melancholiam, quanto obscuriores sunt, & magis nebulosi, exuscitant. Gravitationem verò, quam potius inhabilitatem ad agendum nominare volui, huiusmodi vapores producant, quando perpetuò exhalant, & qualitate suâ cerebrum percellunt, & leviter replent: seu potius, ut post ebrietatem fieri solet ex crapula, quæ saltem calidis furnis capiti molesta esse nonnullis solet, adstringendo & quasi convellendo panniculos cerebri & partes nervosas, afficiunt, & quasi vertiginem minantur. Quæ tamen omnia cibo assumpto maximâ ex parte sopiuntur & post tres vel quatuor horas reviviscunt & denuò afficiunt.

Ex quibus hunc in modum planum evadit in integerrimo viro facultatem alteratricem tam in ventriculo quam in epate, esse causam cacochymix pituitosæ, & ex parte, quemadmodum ex Melancholia hypochondriaca conijcere licet, melancholicæ, Hypochondriacam verò esse morbum in viâ propter obstructionem in venis meseraicis: & in alterata qualitate ob errorem externum ortum à causa partim externa, illa quidem ex victu hæc ex labefactata alteratrice ventriculi generantis humores crudos, & venis sua caliditate chylum, quo minus debite transeat, impredientibus.

Quibus si salubriter mederi velimus, necesse est talia remedia, ut applicemus, quæ ventriculi & epatis intemperiem alterent, & calorem pristinum debite quoad ejus fieri poterit, restituant: deinde venas meseraicas temperatis remediis aperiant & materiam crassam & lentam detergant, & venas insuper temperatè refrigerent. & calorem in illis

præternaturalem sopiant. Id si fiat minus materiæ generabitur producendis fluxionibus ad partes supra commemoratas & ab calculum renalem, qui quod ad materiam attinet etiam ex genere fluxionum est, generandum: obstructioque in hypochondriis, quæ tantò est pertinacior, quantò splen succum melancholicum ignavius & insufficientius attrahit: & auferetur etiam vertigo & quicquid gravitatis capiti molestiam adfert, evanescent. Non volui hic splenis imbecilitatis mentionem facere, quod Dominus patiens illum non durum scribat, nec symptomata, quorum in historia mentio fit, talia sint tonum splenis vehementer læsum colligere possim: sed potius in ea sim opinione, humoris melancholici attractionem in venis mesaraicis ob venarum mesaraicarum calorem & obstructionem impediri; & inde etiam hæmorrhoides tardius & parcius, inordinatiusque fluere.

Hic scopis utrum satisfacere possimus, vir optimus est sollicitus. Nam cum medicamenta contrariis qualitatibus prædita requirantur, facile cuivis obvium esse potest, non sine magno labore id præstari posse & fateor: non tamen sunt impossibiles: quod medicamenta, quæ id præstare possunt nobis in promptu sint: & æger ad tantum malum propellendum nobiscum conspiret.

Quod igitur ad medicamenta attinet: necesse est fieri evacuationem totius per ea, quæ humores serosos, pituitosos & melancholicos adustos sine calefactione ex toto habitu educant. Id quod præstare soleo evacuatis primum viis communibus per bolum factum ex Electuarii Lenitivi ʒx Spec. Episcopi ʒij, exhibitum duabus horis ante prandium; deinde tali nodulo:

Recip. Cort. Thamaris.

Fraxini ā. ʒs

Rad. cicborii ʒj

Pæon. ʒij

Sem. dauci

Aquilegia ā. ʒj

Gran. alkekengi ʒij

Herb. ceterach.

Lingua cervina

Spicanthi ā Ms

Agrimosa.

Pulegii ā. pj

Betonica Ms

D d d 2

Cicho-

Cichorii Mj
Agarici trociscati ʒvj
Rhabarb. opt. ʒj
Fol. senna ʒj
Hermoadactyl ʒj
Epithymi cretici ʒj

Pulverisata ligentur in nodulo facto ex syndone duplici, qui in fictili vase infundatur in vino (quod in hoc casu prætulerim) vel cerevisia clara & pura, ad quantitatem tantam, ut quatuor digitis aut quinque saccus submergatur: postquam per noctem in infusione steterint, manè exprimo fortiter circa horam sextam, & interum repono: ante decimam denuò exprimo, & quando patiens prandere cepit, prandiumque eâ mediocritate peregit, ut primum haustum requirat, exhibeo ille separatim defusum ex sacco satis magnum haustum, quem peragit ita ut bonum haustum bibisse affirmare possit: quod ex defusò superest, iterum sacco affundo: post haustum verò illum jubeo statim vel vini vel cerevisiæ haustum superbibere, ut sapor abominabilis permulceatur, & prandium absolvere, alioque potu perficere jubeo.

Idque cotidie facere mando, pro ratione & frequentia evacuationis & virium conditione. Primo autem biduo dum ex nodulo bibit: nodulo tantum vini vel cerevisiæ iterum affundo, quantum isto biduo est defusum, Cæteris diebus nihil amplius addo, sed tantisper bibere fino, donec ferè nihil nisi feces turbidæ supersint. Si habitus corporis qui pituitosus est ferret, aperirem venam, tum quando per triduum de nodulo bibit: eoque die ab usu noduli abstinere: sed cum metuendum sit, ne habitus magis refrigeretur, præsentibus Medicis id deferò circum spectè & attentè meditandum.

Hunc modum evacuendi hypochondriacos expertus sum à multis annis multò efficacior, & cum majore euphoria conjunctum, adeò ut cæteris omnibus præferendum simpliciter existimem.

Quibus hic non placet, is poterit syrupum vel decoctum ad modum sequentem præscribere, & ʒiij. vel plures ad cotidianum vel alterum usum exhibere.

Recip. *Rad. cichorii ʒj*
Fragor. ʒvj
Pentaphyll.
Filicis a. ʒß
Cort. rad. cappar. ʒij
Thamarisci
Fraxini a. ʒiij

Glyzirr-

Glyzyrrhiza ʒvj
Vicetoxici ʒj
Passular ʒvj
Sem. 4. frig. major. ā. ʒj
Dauci ʒiij
Aquileg ʒj
Gran. alkekengi n. vij
Herb. Iva arthet. Mj
Ceterach.
Lingua Cervina
Spicantibi ā. pjs
Agrimon. Ms
Capillor Veneris ā. pjs
Betonica
Veronica ā ijs
Cichorii
Endivia ā. Mj
Flor. hypericon. Mj
Hermodactyl. veror. n. j.
Turbit. albiss. ʒj
Zinzib. ʒs

Cog. ut decet pro ʒxx. in quibus tribus fervoribus ebulliant.

Fol. senna ʒij
Epithymi Cretici ʒj

Postea colentur sine expressione pro ʒxiiij

In quibus infunde pernoctem.

Agarici trociscati ʒiij
Rhabarb. optimi ʒj
Spica Ind. ʒs

Express. adde syrupi de succo Iva ʒiij
Bisantini

De scolopendria ā. ʒij

Mis. f. Apozema. Vel si syrupus magis arrideat additis ʒv sacchari f. syrupus. De quo exhibeantur cochlearia quatuor vel quinque, pro ea scil. conditione atque operari animadverterimus.

Post usurpata hæc medicamenta, ad electiva accedendum est: in quorum numero primas tenere puto, pillulas sequentes, biduo post absolutum syrupum vel nodulum manè circiter horam quintam exhiberi possum.

*Rec. Mass. pill. de Iva à Mathiolo in ca-
pite de Iva descriptum.*

Aggregativarum ā. 3s

Cum aq. Iva s. pill. n. XXI.

Tandem pro confortandis totius corporis partibus, commodum foret exhibere ℥j mithritat, cum conserva flor hypericon ℥j, manè circiter horam quartam, & ægro præcipere ut superdormiat.

De cæteris intemperiem tam universalem quam particularem emendantibus & corroborantibus, ex iis indicare oportebit, quæ posthac ad me scribentur, vel ex *ἀντοψία* ægrotantis exquisitius colligere liquebit.

Ad victus rationem quod attinet, nihil addo: sum enim in ea sententia à præsentī Meoico ritè & secundum debitum tam naturæ morborum, quàm ægri institutam esse.

Atque hæc quantum colligere ex iis quæ ad me missa sunt, & brevitatis temporis admisit, breviter respondere volui: Æternus & misericors DEUS usui horum clementer benedicat.

CONSILIUM LXXII. IN ARTHRITIDE.



Dareliqua tuarum literatum capita, Vir Clerissime, Domine & amice colende, propter occupationes, quæ me ante triduum ex sudetibus montibus reversum ferè obruunt, non satis pro eo atque volo respondere possum, ideoque mihi veniam dabis. De Arthritidè respondeo: Magis quæri de præservatione, quàm de curatione. Nam anodyna & quæ dolori mitigando usurpantur etiam leppis, mulierculis & tonsoribus nota sunt.

Præservatoria medicamenta diriguntur ad causam, hujusque remotiōnem.

Causa quæ sola aggredienda: meo judicio duplex est: aut enim oritur ex cacochymia aut ex catharro seu defluxione. Cacochymia nihil aliud est, quàm copia vitiosorum humorum in vinis contenta. Generata vel propter externum errorem, vel oblæsā facultatem coctricem in Epâte. Ob externum errorem fit, quoties peccatur in victu tam secundum quantum, quam quale, tempus & modum assumendi. Ob epatis labefactatam facultatem, vel à nativitate vel ob externum errorem. Unde fit, ut coctione non rectè in epate peractà, cacochymia

oriatur.

oriatur. Quæ cum adeo excrescit & augetur ut facultati retentrici molestia esse incipiat, fit, ut natura magno conatu, & quidem interventu interdum febris ad expulsionem insurgat, materiamque ad articulos imbecillos vel natura vel ob externum errorem detrudat. Hancque Arthritidem universalem plerunque appellare solitus sum, quando cum amicis de hoc malo contuli: tum, quod non solum ad articulos à natura propellatur: sed sæpè etiam per vias urinæ copiosissimè expellatur; multoties autem causa sit calculi. Adeò ut maximus Fernelius non præter rem quæstionem, cur scil. Arthritici plerunque etiam sint calculosi, instituerit.

Altera causa arthriticarum fluxionum ex capitis intemperie, vel nativâ, vel ob externum errorem contracta oritur. Atque ita intemperies meo iudicio non tam in cerebro, quam extra cranium in carne & cuti reliquisque partibus capitis exterioribus dominatur, tantoque major est, quanto cerebrum ipsum cum exteriori intemperie concordat.

Hæc dominante generantur vel excrementa, in capite sub cute & carnibus: vel ex venis materia deorsum destillat, & arthritidem generat. Quando generatur sub carnibus & cute, paulatim & cotidie generatur: & tales plerunque perpetuis articulorum paroxysmis conflantur: quando destillat partim perpetui adsunt dolores: partim per intervalla fiunt. Sed discernuntur acerbitate, magnitudine, gravitate doloris: tum locorum & partium diversarum, quas simul occupant: illæ defluxiones saltem paulatim & ferè cotidianis accessionibus molestæ sunt.

Contrà universalis Podagra seu Arthritis uno momento, magnoque impetu, interventu febris aut alterius universalis commotionis humorum pro copia humorum, & latitudine (quod diligenter notandum) & laxitate viarum ad plures partes simul, aut hodiè ad unam, cras aut perendie vel serius ad aliam partem, & certis quasi secundum tempora anni intervallis invadit. Hæc breviter sic delineata tibi sufficere posse puto.

Quod ad præservationem attinet, facile tibi patere ex his fundamentis poterit. Nempè quod universalis Arthritis potius purgationem tempestivam requirat, & juvantia coctricem in epate & ventriculo: unâ cum victus ratione conveniente, & potum thermarum vel similium, si existimetur Epate & membris coctioni inservientibus subveniri posse. Particularis verò magis in alterando intemperiem capitis versatur. De qua & Fernelius diligenter monet. In hac usus Ligni, præsertim si lateat

lateat aliquid luis venereæ, vel simile aliquod malum, ex causa externa profectum, quod non minori diligentia est observandum, quàm reliqua omnia. Nam multos arthriticos solius ligni beneficio restitui planè in integrum, quos ex sola lue tales esse diligenti & solerti disquisitione animadverti.

Talibus arthriticis dolotibus ex capitis intemperie profunt capitalia localia, cucuphæ, stillicidia, cauteria & similia. De particularibus remediis, quæ & universo & parti tanquam causis conveniunt, proxime tibi respondebo. Ubi quod controversum vel admonendum putaveris, rescripseris. Interim hæc boniconsulito, & si quid plantarum communicare poteris facito. Vale.

Vide Tabulam sequentem.

CONSILIUM LXXIII.

IN ATROPHIA ARTHRITIDE SCABIE, DOLORE COLICO PERIODICO, CALCULO, CALORE FEBRILI, PALPITATIONE CORDIS &c. EX OBSTRUCTIONIBUS ET TUMORE EPATIS AC SPLENIS.

MOrbi, Quibus cum Magnificus & Nobilis Vir conflictatur, sunt primum obstructions & duriusculi tumores epatis ac splenis, non solum manifesti ex actione læsa, nempe sanguificatione depravata, & attractrice succi melancholici in splene imminuta: sed etiam ipso tactu & symptomatis, tumorem & obstructionem hujuscemodi viscerum consequentibus, (videlicet inappetentiâ, siti, calore præter naturam) præsertim à cibo sumto, lassitudine totius corporis, & membrorum quasi imbecillitate conspicui. Deinde intemperies ventriculi frigidior, partim à primâ origine, partim ob externum errorem, nempe victus rationem ante aliquot annos largiorem: quâ & virtus ventriculi, accedentibus intempestivis animilaboribus & studiis immodicis, est labefactata, & superveniente febre quartanâ, colicisque doloribus inde profectis, itâ attrita, ut ingestum cibum pro eò, quem natura requirit, modo, non sufficienter coquat: sed potius in succum crudum, acidum & astringentem convertat.

Qui-

Arthritis est morbus articularum in malâ compositione & solutâ unitate ortus ex humoribus à virtute expultrice ob copiam vel qualitatem vel quantitatem & copiam simul irritatâ, ad articulos detrusis. Unde manifestum est arthritim esse ex genere fluxionum, in quibus consideranda veniunt 7. capita:

1. Ut humor, qui expellitur, est vel,
 - excrementitius coctionis, vel
 - prima & secunda vitiosus ex cacochymia, vel:
 - simplici
 - Biliofa
 - melancholica
 - pituitosa
 - non simplici, sed ex his mista.
 - tertia ex alimento vel:
 - cacochymico vel
 - simpliciter
 - mixto.
 - non cacochymico, ut sanguine.
 - non excrementitius, ut sanguis peccans solâ quantitate seu copiâ, stimulante naturam ad expulsionem ad articulos, ut habitus plethoricus solvatur.
2. Causa generans tales humores excrementitios est facultas coctrix labefacta ob intemperiem, vel:
 - viscerum, puta epatis & ventriculi, producentium cacochymiam,
 - partis alicujus excrementa multa producentis.
 - perfectam à dispositione vel
 - nativâ
 - ascititiâ
 - orta
 - à primâ origine.
 - ex errore externo.
3. Modus generationis humoris fluentis fit, vel:
 - 1. Quando ventriculus & epas etiam opt. alimentum pp. di-
scrasiam non in sanguinem bonum sed cacochymicum convertunt.
 - 2. Quando in assumendis alimentis peccatur secundum:
 - quantitatem
 - qualitatem
 - ordinem
 - tempus & c.
 - 3. Quando in aliquâ parte imbecilla, puta capite nutrimentum sive bonum sive cacochymicum convertitur non in alimentum sed humorem excrementitium ob intemperiem, vel
 - nativam
 - ascititiâ
4. Ut movetur. Movetur autem à facultate expultrice irritata vel ob
 - copiam sanguinis boni
 - simpliciter ob cacochymiam
 - biliofam
 - melancholicam
 - pituitosam
 - qualitatem non simpliciter sed mixtam ex diversis humoribus
 - peccant a. vel
 - sola
 - quantitate
 - attrahentem & plusquam concoquere potest.
 - adurentem & corrumpentem in materiam excrementitiâ.
 - qualitate
 - ob imbecillitatem, nec perfecte alterantem: sed convertentem materiam transmissam in excrementum.
 - simul
 - quantitate & qualitate.
5. Terminus à quo est vel
 - totus habitus venarum.
 - pars seu caput, secundum partes exteriores.
 - Colligitur enim excrementum tale intra.
 - cutim
 - carnes &
 - exteriolem superficiem eraij.
6. Terminus per quem, seu via, per quas materia fluit, & fit expulsio, vel
 - intra
 - vasa seu venas, vel:
 - universaliter cum videlicet expellitur ex toto habitu venarum ad superficiem, vel sanguis
 - particulariter quando natura ex toto habitu venarum materiam peccantem ob imbecillitatem capitis, primum expellit sursum, deinde per venas capitis q. secundario deturbat ad articulos, vel
 - quando nutrimentum à parte non perfecte coquitur, vel quia:
 - copiosum attractum est.
 - aduritur
 - non debite alteratur, sed convertitur in excrementum: tunc defluit secundum partes subcutaneas ad articulos.
 - extra
 - cacohymicus peccans vel
 - peccans solâ quantitate.
 - qualitate.
 - solâ qualitate & quantitate simul.
7. Terminus ad quem sunt articuli atque in his potissimam partes
 - nerveæ
 - membranosæ & tendines
 - in quibus excitatur
 - tumor
 - dolor
 - ob imbecillitatem
 - nativam.
 - ascititiâ.

Hinc patet cur in cedemate pedum præter tensionem nullus sit dolor, etiamsi adsit tumor, quod materia non irruat in partes modò dictas: cur etiam acredo materia inter defluendum non excitet dolorem, quod non defluat ad partes nervosæ: sed per venas vel:

- mediate sub cute ac capite.
- immediate ad articulos propellatur.

Quibus ita suppositis, facile intelligitur, primâ coctione imperfectè coctâ, præsertim quando victus vel largior est, vel in qualitate peccat, secundam coctionem non perfectiorem fore.

Qualis enim chylus offertur epati, talis & sanguis ab eodem perficitur. Si crudior ille, non solum & crudiorum producit sanguinem, sed & ipsa epatis substantia illâ oneratur cruditate, adeò, ut ad frigiditatis habitum inclinare incipiat, sanguisque generetur frigidior, corpori alendo, nequaquam idoneus. Iste deinceps in partibus extremis, & sub cute colligitur, ubi & humorem quendam, vel ichorem potius oedematofum frigidum & humidum per universum corpus producit. Simile quid in cacheticis & hydropicis est videre. Quod si virtus sit calidior aut etiam minori, quàm par est ingeratur copiâ, adeò ut ventriculi virtus in coquendo expeditè nimis agat; tunc chylus quidem generatur paulò perfectior, non tamen ita absolutè bonus, quemadmodum solitus naturæ cursus exigit. Ideoque etiam epas minus offendit frigiditate, sed ab epate & natura, vi & ob ascititium calorem ex obstructione tam in ipso epate, quam venis Mesaraicis ortum, aliquatenus aduritur, & in pituitam salisam, adustosque ex parte humores convertitur. Quin imò id non solum, sed & quadam ex parte propter diversas substantias ciborum & potus discriminatim ingesti, in bilem degenerat. Ex hoc ergò fonte, tota sanguinis massa exiguum sanguinis præfert copiam: maximè verò adustis, pituitosis, salis & biliosis perfunditur humoribus. Tanto etiam evadit impurior, quantò splenis tumor & obstructio major est. Nam splene sit affecto, & venis mesaraicis ad ipsum pertinentibus obstructis, non fit succi melancholici tam copiosa attractio, qualem natura integra requirit. Attractione non sufficienter factâ, residuum succi melancholici in venam portæ regurgitat & ad epas detruditur, perque venas dispersa. Sanguine permiscetur, totamque sanguinis massam unâ cum cæteris humoribus biliosis, salis & pituitosis adeò depravat, ut necessario morbi subsequantur ii, quibus ipsius Magnificentia à multis jam annis frequenter est conflictata, & in hodiernum usque diem molestat.

Inter hostes autem eos, qui ex hoc, quo dixi, orco tanquam ex equo Trojano prodeunt, primus est Atrophia, non quidem consummata, sed incipiens, quâ corpus debitâ fraudatur nutritionis portione. Cum enim natura ita constitutum sit, ut omnia membra nutriantur sanguine, sanguis vero naturâ sit dulcis suâ; facile animadvertere licet, exiguum nutritionem futuram, ubi sanguis adeo depravatus sit, ut biliosus sit, pituitosus, salis, melancholicoque refertus succo.

Secundus morbus est Arthritis. Hæc etsi articulorum morbus ut proprius, primamque & præcipuam causam habeat articulorum imbecillitatem, eamque vel nativam vel æcchiaticam: si tamen ad materiam, seu sine quâ non respiciamus causam, evidenter apparet, fieri in hoc ægroto à natura talem talis materiæ exonerationem & depositionem ad partes remotas, ignobiles & imbecilles, quæ ad nutritionem corporis inepta sit. Eam, ut dixi, nutritioni ineptam materiam natura tentat expellere, & in partes deponere ignobiliore. Id dum fit, natura calorem alienum seu febrilem exsuscitat. Eo quippè in defectu caloris naturalis, natura tanquam ministro suæ in expellendo actionis utitur.

Hic calor febrilis cum ex natura sua sit periodicus, proinde & ab eo lassitudines & dolores gravativi membrorum, sitis, inappetentia, stas proveniunt temporibus. Hinc igitur præagia paroxysmorum reliquorum morborum complicatorum certissima petuntur.

Hostis Tertius est scabies. Soboles ea est crassior materiæ arthriticæ, falsa adusta, melancholica, ad superficiem in periodica naturæ resistentia detrusa. Relicta fuerat ea ob crassitiem sub poris cutis; jam cutem exedens, ibidemque divortium unitatis faciens.

Colicus dolor periodicus quartum obtinet locum. Multos jam annos est, quò iste Magnif. hunc virum afflixit. Neque sanè magnam meretur admirationem. Cum n. materia febris quartanæ non sufficienter à natura sit expulsa, vel dissipata, sed vel in vena portæ relictæ, aut à Medico etiam, qui sufficienti eam purgatione non prosecutus est neglecta; factum, ut ea vel periodicè, id est, iis temporum intervallis, quibus humor melancholicus in febris quartanâ, secundum naturæ consuetudinem moveri solet, ex ramis venæ portæ, per colum intestinum undiquaque dispersis, in Colon sit exonerata, ibidemque dolores & cruciatus maximos per certa intervalla produxerit.

Quintus hostis calculus est. Duplex jus iste sibi in hoc ægro vendicat. Primò quidem, quod renum intemperies, quæ reliquorum vicerum fovet intemperiem, mali hujus causa sit efficiens. Dein verò & causa materialis in hoc ægro sufficiens deprehenditur. Producitur in ægro hoc à vitio primæ coctionis, nutrimentum lentum, adustum, crassum, pituitosum.

Istud ad calidiores si devolvatur renes, an non ibidem, ut lateres in furno, in calculum concreseit crassum, durum, firmissimum.

Molestissimus omnium est hostis sextus, calor nempe febrilis. Non n. solus is est, sed pluribus stipatus comitibus truculentis, vim infert modo

modo planè truculento. Sunt ii comites lassitudo spontanea, prostratus appetitus, sitis immodica &c. Hæc συμπτώματα συνδρομή omnem videtur morborum conditionem superare. Nam nec somno fructuosè indulgere, nec cibis suaviter & cum delectatione frui conceditur. Imò ad omnia quæ offeruntur, fastidioso aspectu æger offenditur, & in tædium vitæ, reluctante naturâ, invitus præcipitatur. Docet nos experientia, cibi oriri nobis fastidium, potus verò desiderium, si corpus vel ex balneo, vel exercitiis aut causis externis internisque aliis immodicè incalescat.

Quid non fiat in hoc ægro, cui calor in corpore alienus? an non is similia excitabit symptomata? Nihil ferè dubitandum de eo. Ostendit id pulsus, à sumto præsertim cibo celerior & frequentior. Caloris hujus febrilis hoc in hoc corpore est fundamentum, ut sequitur. Adest tumor lienis & epatis: adest & Mesaraicarum obstructio.

Hæc à succo Melancholico causatur. Hic enim cum à liene nequaquam debito afficiatur modo, in mesaraicis relinquitur, fertilissimus obstructionis parens. Sed & alia obstructionis adest causa. Imminuta est ventriculi chylicatio. Proinde chylus generatur crassus, & ipse obstructionis parens. Obstructionem sequitur cotidiani chyli crassi & succi melancholici illaudabilis retentio. Eam, ut umbra corpus, comitatur calor præternaturalis. Ab hoc febris cum commemoratis dependet symptomatis. Humores eò, quo dictum, collecti & retenti modo, non solum incalescunt, sed & corrumpuntur, in tantum, ut qualitatem cordi, quod arx est vitæ, è diametro contrariam, indispiscantur. Qualitatem istam intelligo, quæ vapor malignus sit, cor manifestè affligens. Indicant id motus cordis præternaturales, & imprimis palpitatio. Vapor iste malignus, etsi actu sit calidus, quod ex putrilagine exhalet feculenta & fimosa: cum tamen & naturæ sit frigida & sicca, eò quod aciditate quâdam præditus, cor adeò periculosè constringit, ut cor, illud periculum quasi subolfaciens, haud segniter ad ejus expulsionem cogatur insurgere. Hinc ergò insignis illa & manifesta palpitatio.

Hucusque discursus de causis morborum istorum & symptomatum.

Cum hætenus demonstratum, quæ causa horum morborum & symptomatum sit, viscerum intemperies, tumor, obstructio, nutrimentumque illuadabile & ineptum: quis non videt ad hujusmodi viscerum intemperiem, obstructionem & humores vitiosos, omnem Medici curam

ram & industriam esse convertendam. Quoniam autem viscera in integrum nequeunt restitui, priusquam impedimenta (ut humores diversi in toto corpore non æquali lance per habitum venarum dispersi) removeantur, proinde eorum cumprimis habenda ratio.

Prima itaque curationis intentio ad talium humorum educationem dirigitur. Remotis his obstaculis, secundâ intentione visceribus naturalis sua concilianda temperies. Fiet id medicamentis tum aperiensibus, tum verò & robur addentibus.

Intentio tertia imbecillitati articularum, vitiisque subcutaneis accommodator. Ritè istis administratis, valetudo commodior speranda haud dubiè.

Ad primum quod attinet, vias communes ab excrementis crassioribus exonerandas, diximus. Fiat id per pillulas, sub literâ A. descriptas. Usurpentur eæ, ut hoc addam, tribus summum, vel rectius, duabus ante prandium horis. Accedendum dein ad massam sanguineam, venasque mesaraicas.

In his aperiuntur obstructions : in hac cacochymia per educationem humorum vitiosorum emendator. Fiat id per medicamenta, quæ sacculo B. includuntur.

Coquatur saccus iste in sextario vini ad medias : postea decoctum refrigeratum unâ cum sacculo infunditur in amphoram fictilem satis capacem, quibus additur sacculus C. & affusâ vini quantitate, quæ ad sex supernatet digitos, reponatur in cella per eum diem, quo Medicamentum A. sumtum fuerat, vesperi ambo sacculi fortiter exprimantur, & per noctem iterum in cellam reponantur. Manè exprimantur denuò. Hæc etiam expressio reiteranda cotidie. Sub prandium defunditur mediocris cyathus, ex quo, cibo ad mediocrem quantitatem sumto, haustus satis largus bibitur. Mox verò ut sapor ingratus è palato evanescat, haustulus vini vel cerevisiæ superbibitur. Deinceps prandium cibis & potu solitis absolvitur. Sacculis verò priori biduo semper tantum vicissim affunditur vini, quantum defusum est pro potu. Diebus sequentibus ulteriore affusione non opus. Cotidie tamen vel diebus etiam alternis in prandio haustus continuetur unus. Sed cum cautione : pro tolerantis evacuationis adhibeatur moderatio. Si quid in cyatho, è quo haustus hauritur, remanet, id semper refundendum. Unum hoc loco notandum. Post tres dies à vino hoc primum poto, quartus interponendus, dicendusque feriis. Nequaquam tamen simpliciter : eo
n, die

n. die non quidem vino utatur purgante vel medicamento mittendus tamen sanguis est venâ cubiti dextri mediâ, ad ℥iij, vel summum quinque. Sequenti vicissim de usus sacculi repetendus, & ad finem usque continuandus. Saburrâ cacochymicâ hunc in modum subductâ, si videretur opus esse evacuatione electiva, ne scilicet id quod in remotis & angustis viis epatis & splenis, longinquisque totius corporis residet venis, relinqueretur autor essem, ut diebus duobus post finitum nodulorum usum, electiva usurparetur purgatio. Eam ad rem proderit medicamentum litera D. notatum. Miram quippè id vim habet in aperiendis obstructionibus & educendis materiis abstruccionibus, quæ in partes remotas & angustas se se insinuarunt penitissimè. Moderatè insuper educit & blandè, quicquid educit. Bibatur calidum manè ante hor. vj. prandium ad horam differendo decimam.

Prima intentione absoluta, ad secundam progressum facimus Viscera hic emendanda, humoresque in toto venarum habitu, apprimè alterandi. Perficitur istud usu Morfulorum E. quorum unus manè h. 7. vel præter propter: alter à prandio circa hor. 3. manducandus. Statim post manducationem locus Epatis decocto F. splenis decoctione G. per horæ quadrantem tepidè cum spongia fovendus. His ità peractis, utrumque detergendum viscus: Epar quidem unguento H. splen verò unguento I. tepidè inungendum.

Medicaminorum istorum usus ad diem usque octavum, vel etiam longius, haut interrupto continuandus ordine: singula scilicet fomenta & unguenta unâ cum Morfulis, bis cotidie applicando & usurpando.

His ità rite administratis, tactu exploranda viscera, an nempe ea adhuc doleant & dura sint. Si mollia deprehenduntur hypochondria, eaque nec dolent, nec duritiem præ se ferunt ullam, intrepidè ad emendationem massæ sanguineæ accedendum. Caute tamen hîc adhibenda quædam. Sanguis in venis explorandus diligentissimè, utrum scilicet is ad naturalem aliquatenus reductus sit status. Cognoscetur id ex facili tolerantia, liberò & expetito partium omnium motu: urinæ quæ calorem, substantiam & contenta ad naturalem statum accedentibus. Hæc non inveniantur, evacuationes per sacculos repetendæ. Causa est, quod massæ sanguineæ alterationem per sarsæ parigliæ decoctum emendare, nobis sit propositum: usus autem ejus exquisitam corporis evacuationem præsupponat. Denuò ergò, si opus, repetantur sacculi: denuò etiam, iis absolutis, purgatio D. repetitor.

Sequenti die usus sarsæ inchoandus.

Bibuntur autem ex decocto hujus radici sub litera K. descriptæ uncia quinque calidæ, manè post horam quartam & dum somno deinceps indulgemus, sudori operam navamus ad horas duas, ita tamen ut blandè, non cum lassitudine sudemus.

Post sudorem rotulis L. sex utimur, sudore à corpore probè deterso. Horam circiter nonam prandemus; utendo victus ratione idonea: bibendo verò potum secundi decocti ex salsa, sub litera M. vel N.

Aprandio circa horam tertiam iterum tantum bibimus, & ad horam quintam usque sudamus, sudore deterso, & corpore à squalore & caliditate inter sudandum introducta iterum convenienter refrigerato, hora sexta, cibum capimus, & à coenâ denuò Tragæam utimur.

Pro ventriculo autem ut potum aquæ facilius ferre possit, confirmando: à cibo sumto semper tantum capiendum ex Tragæa O. quantum dimidio putamine ovi comprehendi potest, & nihil superbibendum. Hoc modo ad septimanas tres vel quatuor secundum præscriptum modum procedendum est.

Est autem hoc medicamentum valdè efficax non modò ad viscerum obstructions expediendas, & massam sanguineam per sudorem mundificandam & benigniorem atque ad nutriendum idoneam reddendam: sed etiam tertiam indicationem ejus usu explemus. Cum enim per sudorem agat, reliquias humorum salforum sub cutelatentes, & articulis impactas, non solum rarefacit & resolvit, verum etiam calorem in articulis nativum exuscitat, & robur addit, ita ut neque scabiei facilè locus sit neque arthriticæ fluxioni articuli tanquam loca propter frigiditatem imbecilla, facilè aditum admittant: quippè quod serosa excrementa, quæ per imbecillitatem in articulis quasi subsistunt, & diuturnitate temporis paulatim crassescunt, hujus medicamenti interventu facilè dissipantur & exhalent.

Cum enim tali curatione omnia membra in nativum statum temperiei, quoad ejus fieri potest reducantur, fit ut æquabilis harmonia omnibus actionibus perficiendis vicissim corpori universo restituatur & omnia quasi renati esse videantur.

Interim dum ex decocto salsæ parillæ bibitur: duo diligenter observanda sunt: 1. Locus quo renes siti sunt ter de die inungendus, ne renes inter sudandum nimis incalescant: idque faciendum est unguento P. manè & vesperi, post sudorem scilicet, & noctu quando cubitum ire decrevimus: Deinde semper opera danda est, ne alvus constipetur.

Quod

Quod fiet, si (sponte non fluente) Clysteribus idoneis utamur, vel medicamentis eccoproticis, primas vias ab excrementis crassis expedientibus, usurpantur autem manè una hora post sudorem, prandium ad duas horas differendo, & decocto salsa à prandio eò die non utendo.

Eccoproticon medicamentum descriptum est sub forma pilularum A. quarum supra mentio facta est: clysteres fieri possunt ex brodio pulli & melle rosato colato: ita ut accipiat lib. j brodii pulli aut decocti avenæ depilata: & uncia quatuor mellis rosati colati.

Præterea & hoc diligenter advertendum est, ut alvo sponte etiam sua fluente, in usu salsa, octavo quoque die corpus semel vel per potionem electivam sub litera D. supra descriptam evacuemus. Quod propterea fit: quod in usu salsa humores valdè attenuentur, & coquantur.

Cocti verò educationem requirant. Eam enim si neglexerimus. Id mali metuendum nobis præsagunt, quod videmus multis accidere, ut videlicet periodica evacuatione neglecta, morbi longi in tali curatione humoribus ebullientibus & turgentibus naturam acutorum induant, & multiplicia symptomata defluxionum exuscitent.

Quo metu facile liberabimur, si modò per intervalla materiam coctam suaviter & sine violentia paulatim ex corpore & habitu venarum promoveamus.

De victu nihil moneo, nisi velim noctuas Athenas. Idem de cæteris rebus non naturalibus.

Æternus DEUS ut hisce benignè benedicat ex toto animo precor.

Recip. Spec. hieræ simpl.

Agar. ʒi.

Rhabarb. opt. ʒ. ʒi

Cum aq. beton. f. pill. n. XXV.

S. Pillen A.

Recip. Cort. rad. elleb. nig.

Syr. præp. ʒi

Hermoadetyl. ver. n. j

Caryophyllor. ʒij

Pulverisata subrit. ligentur in nod. f. syndone duplici

S. Gäcklein B.

Recip. Rad. vincetox. ʒij

Fœnic.

Asparagi ʒ. ʒiij

Cort. rad. cappar.

Thama-

Thamaris.

Fraxin. ā. ʒijs

Sem. dauci ʒiij

Aquileg. ʒjs

Agni casti ʒj

Herb. luvæ arthetica

Paralys. ā. Mj

Betonie.

Agrimon.

Ceterach.

Card. bened.

Veronic. ā. pjs

Fol. sennæ s. stip. ʒiij

Epithym. Oret. ʒj

Rhabarb. opt. ʒij

Rad. mechoacan. ʒjs

Agar. trocisc. ʒvi

Cinam. ʒij

Spica ʒj

Pulsata omnia quam subtiliss. ligentur in sacculo oblongo
facto ex syndone duplici s. Säcklein. C.

Recip. Rad. vincetox. ʒjs

Cichor.

Fenic. ā. ʒiij

Cort. rad. Thamaris.

Fraxini

Polypod. quer. ā. ʒß

Ononid. ʒj

Cort. rad. elleb. nig.

Styriac. præp.

Hermodact. ver. ā. ʒj

Caryophyll. ʒß

P. ssular. ʒß

Sem. aquileg.

Dauci ā. ʒj

Melon. ʒj

Herb. Ceterach.

Agrimon.

Centaur. min.

Iva arthet. ā. ꝑj

Veronica

Fumar.

Cichor.

Capill. Vener ā. ꝑß

Flor. hypericon. ꝑj

Coq. in s. q. aq. Iva arthetica & fumar. ꝑroßß. In colat, tribus
tervoribus ebulliant.

Fol. senna 3ß

Epithym. Cret. 3js

Cinamomi 3j

Stent in loco tepido per h. 3. postea colentur sine express. ꝑro 3iiij. in
quibus per noctem. Infunde rhab. opt. 3ij

Agar. trocise 3j

Spica gr. vj

In expresso fortissime facto dissolve Manna 3j

Et adde ol. anisi gr. iij

Mis. s. Haustus.

S. Purgation D.

Recip. Spec. diarhod. Abb. 3j

Troc. de capparib.

De Rhabarb. ā. 3iiij

Aromat. rosat. 3j

Cort. citri cond. & incis. 3ß

Rad. cichor. cond. 3ij

Cons. anthos 3j

Sach albiss. sol. in aq. cichor. q. s. f. c. gr. vij. ol. nuc. mosch. de-
still. Conf. in Morsulis.

S. Morsellen E.

Recip. Rad. Althea 3js

Centaur. minor. 3iiij

Fol. agrimon.

Absynth. ā. Mij

Fol. malva Mjs

Flor. chamomel.

Rosar. rub. a Mj

Spica Ind. Mß

E ff

Den-

Dentur incisa & consusa ad chartam.

S. Kräuter F.

Recip. Rad. Elenii

Cucumer. asin. ā. ʒvj

Corr. rad. cappar.

Thamaris.

Fraxin. ā. ʒiij

Althea ʒj

Sem. agni casti

Plantag. ā. ʒiij

Ficuum ping. n. vj

Herb. Malva

Althea ā. Mj

Ceterach.

Spicantib. ā. Mß

Pulegii Mj

Thymi Mß

Ruthe pjs

Summit. aneth.

Flor. Chamomel. ā. Mj

Rosar. rub. Mß

Dentur incisa & conquassata ad chartam

S. Kräuter G.

Recip. Ol. Nardi i

Absynth.

Chamomel ā. ʒvj

Rosat. ʒß

Flor. Chamom.

Absynth. ā. ʒj

Rosar. rub. ʒj

Aq. absynth. ʒj

Coq. ad consumption. aq. & postea adject. cera q. l.

F. linimentum.

S. Salbe H.

Recip. Ol. de capparib. ʒjs

Rutacci ʒj

Vi i sublimati

Aceti acrimi ā. ʒij

Rad.

Rad. filicis

Cyclam. ā. ʒij

Centaur. minor. ʒj

Terendis tritis, bulliant usque ad olei remanentiam: postea expressis adde.

Ammoni

Bdelli

Opopanac

Serabini

*ā. ʒij in aceto
dissolue.*

*Simul iterum leviter bulliant, & adde cera ʒiij
F. linimentum.*

S. Salve I.

Recip. Rad. salsaparill. ʒiij

Lig. sassafras ʒiij

Cort. lig. Guaiaci ʒijs

Vissi quer ʒij

Passular ʒj

Rad. scorzoner. ʒiij

Cinam. ʒj

Coq. in aq. cichor. ℥ijs

Borrag. ℥ijs

Fumariae ℥ij

Ad medietatem, prius per hor. 24. infusa in aquis istis ferventissimis.

S. Decoctum K.

Recip. Spec. rosar. novell

Diarrhod. Abbat. ā. ʒj

Essent. Margarit. ʒij

Ocul. cancri ʒß

Lig. aloes ʒß

Sach. alb. sol. in aq. rosar. ʒijs

F. Conf. in rotulis.

S. Rotule L.

Recip. Remanentias decocti K. & adde.

aq. comm. ℥vij

Cinamomi ʒj

Sem. anisi ʒjs

Coq. ad Tertias.

S. decoctum M.

Fff 2

Recip.

Recip. Rad. salsa parigl. ℥js

Lig. sassafras ℥j

Cort. 12. Guaiac. ℥ij

Vis. quer. ℥js

Passular. ℥vj

Cog. in aq. font. ℔ viij. ad tertias, posteaquam per se refrige-
rit coletur.

S. decoctum N.

Recip. Sem. coriand. præp. ℥vj

Anisi

Fenic. ā. ℥iij

Cinamomi ℥iij

Cort. arant. ℥ss

Nuc. mosch. ℥js

Calam. aromat. ℥j

Corall. rub. præp. ℥ij

Sacchar. ros. tabul. ℥j

Sach. cand. alb. ℥js

Ex grosso modo incisis

F. Tragea. O.

Recip. Ungt. infrig. Galeni

Rosat. Mes. ā. ℥j

Alb. camphorat. ℥ij

Ol. rosac. completi ℥ss

Mis.

F. Unguentum P.

CONSILIUM LXXIV.

IN QVO, QVALES QVANTASQUE
ILLEGITIMUS THERMARUM USUS IMPOR-
TARIT CLADES, DOCETUR.



N Thermas Montium sudetorum. Doplicenses migrarat
nobilis & genus Dominus N. N. conflictatus tunc fue-
rat podagrâ, corpore perfectè insimul cacochymico & bi-
lioso. Consuluerat Medicorum neminem, corpus ad ther-
mas non præpararat, thermis usus fuerat indiscretè, im-
moderatè. Corpus habuerat perfectè cacochymicum biliosum & in-
melan-

melancholiam proclive. Præparantibus utebatur nullis, pro diæta ad-
erat Afotia, aquis utebatur calidissimis, & ultrâ tempus longissimum.
Redeundi alvus erat occlusa, in hypochondriis tumor sedebat sclerodes,
fluxus hæmorrhoidalis intestinum rectum cruentabat, ægrè faciebat re-
num calculus, dolor infestabat colicus, excreta quædam alvi si egre-
diebantur, erant tenuiuscula & liquidiuscula, relictis *σκιβάλοις*, cum
tenesmo tamen, hydropem minitabatur schirrus lienis & Epatis, unâ
cum plusquam immodicâ venæ portæ oppilatione. In tam numerosa
symptomatum congerie, sex potissimum scopi curativi sese offerunt.
Primò enim annitendum, ut sangvificatio recta postliminiò reducatur.
Sangvis enim optimus est naturæ thesaurus, quo animal vivens carere
nequit, cum calor naturalis in eo potissimum stabuletur.

Secundò in id incumbendum unicè, ut sangvinis vitiosus, crassus,
falsuginosus & corrosivus vel subducatur vel corrigatur.

Tertio tumor lienis & Epatis emolliendus veniet.

Quartò sedandus dolor colicus & inhibendus tenesmus.

Quintò dolor inhibendus nephriticus.

Sextò, debita recuperata temperie, sperandum, & dum naturam
robustiorē redditam materiam podagræ molestantem aliquo expul-
suram modo.

In tanto verò symptomatum & scoporum diversorum numero,
non omninò simul possunt peragi, sed auspiciū faciundum ab eo quod
maximè urget. Dolor ergò sedandus primum, dein submovendæ cau-
sæ. Cum etiam curatio hæc diuturnitatem præsupponat temporis, The-
rapeusin eam in certos distribuemus actus.

In primo itaque actu vel congressu cum morbo potiunculam le-
nitivam aliquot exhaustiat vicibus, præmisso tamen usu syrupi violacei
cum oleo sulphuris; sacculos etiam chamomelinos & fots verbascinos
vino incoctos multoties imponat gremio & intestino recto.

Unâ die si potiuncula utitur lenitivâ, alterâ nucibus myrobalanis
vel chebulis conditis utatur. Unguenta in colica & hæmorrhoidibus
non tam profunt, quam sacculi vel spongiæ actu calidæ. Alvus etiam
quandoque sollicitanda Enemate (si toleret) ex lacte chamomelino,
floribus verbasci, melle violaceo & croco aromatico.

Interim Diætam simul instituat sobriam & decentem. Utatur ju-
culis, pulticulis, hordeatis, pineatis, cum aquâ rosarum & succo græ-
natorum. Carnes sint pipionum, turturum, vervecum, pullorum,

cum succo limonum granatorum, & syrupo melissæ. Pisces adsint Lucii, epata bellioniorum, auratæ, pedes vitulini in gelatinis. Edulia communiter sunt ova mollia recenter à gallinis allata, raparum exiccatarum decocta, poma Mordiana cocta. Caseos, artolagana & falsamenta Therapeusis expungit è legionum suarum numeris, ut nauci & utiles.

Vinum sit Rhenanum, lene. Cerevisia Servestana. Falernum absit, uti & enulatum, cum id protrudat & commoveat calculum.

In actu secundo, die primo & secundo, vel subsequentibus vacuis chebulis utatur conditis vel syrupo A.

A. prandio Syrupi B. vel Mixturæ sequentis capiat particulam.

Recip. Conser. rosar. ℥j

Buglossæ

Violarum ā. ℥s

Myrobalan. cheb. condit. n. iij

Cort. citri cond. ℥j

Gelatina cydoneor ℥j

Tryphera saracen ℥s

Spet. rosat. novell. ℥j

Corall. rub. præp. ℥j

Margarit. præparat. ℥s

Cinamomi

Macis incisi ā. ℥s

Rad. cichor. cond. ℥vj

Incisis omnibus j. Mixtura.

Cum syrupo granator. acido & foliis auri n. iij Spirit.
auri li gr. xxx.

Recip. Mirtillo. Italicor. n. CLX.

Mirabol. Bellericor.

Nigror.

Emblicor. ā. ℥s

Sem. cymini

Carui

Anisi

Apii ā. ℥ijs. in aceto per horam inf. &
iterum exicator.

Mirabo'. in vini vel aceti s. q. bulliant ad mollitiem, postea cetera addantur, & cum Miva cydon. aromat. & syr. granat. s. q. f. Syrupus.

S. Syrupus A.

Recip

Recip. Rad. cichorii ℥js
 Cort. rad. capparor.
 Thamarisci
 Fraxini ā. ℥iij
 Scorzonera ℥j
 Plantaginis
 Tormentilla
 Bistorta ā. ℥vj
 Cort. Myrabolan. chebul.
 Citrin
 Indorum ā. ℥j
 Sem. Plantag. ℥s
 Coriandri ℥ij
 Endivia
 Pertulaca ā. ℥ijs
 Dauci
 Agri casti ā. ℥js
 Herb. plantaginis
 Millefolii
 Numularia ā. Mjs
 Adiantum nigrum
 Capill. Vener.
 Fumaria
 Geterach
 Veronica ā. Mij

Coq. in s. q. aq. plantaginis & agrimonie pro ℥xxij. In qui-
 ebulliant.

Fol. senna s. s. ℥iij
 Epithymi Cretici ℥is
 Colentur pro ℥xiiij, in quibus iterum ebulliant.

Confect. Hamech. ℥xij
 Iterum colentur diligenter, Colatura adde syr. granator. aci-
 dorum ℥iij.

De capill. Veneris

De rosis siccis ā. ℥ij

Sachari ℥vj

Coq. ad formam Syrupi, cui adde syr. de acetosa q. s.

S. Syrupus B.

Ter-

Tertio die reiteretur potiuncula aliqua lenitiva.

Quarto die reiteretur herbæ pro sacculis perinæo applicandis mor-
debito, sub litera H. vel I.

Recip. Herb. & rad. *malva* ā. *Mj*

Spica Ind. ʒj

Absynthii *Ms*

Fol. agrimonie *Mjs*

Flor. Chamomel.

Rosar. rub. ā. *Mj*

Dentur incisa ad chartam.

S. Herbæ H.

Recip. Rad. *cucum. asini*,

Elenii ā. ʒvj

Cort. rad. Thamaris.

Fraxini ā. ʒs

Altheæ ʒj

Sem. portulacæ,

Agni casti ā. ʒs

Ficuum ping. n. vj

Herb. Ceterach.

Spicantb. puleg. abrot. ā. *Mj*

Fol. Sennæ *Ms*

Summit. aneth. *Mj*

Flor. chamomel.

Rosar. rub. ā. *Ms*

Incisa & contusa dentur ad chartam.

S. Herbæ I.

Quintò die potiuncula lenitiva præscribitur alia.

Sexto die *Tragæa* utatur stomachica, vel *Gelu cydoniorum*.

Die septimo, & quodocunque ardorem senserit ventriculi, El-
etuarium ei præparetur ē fructibus cynosbati conditis & *Tragæa* st-
machia.

Die octavo, vel quodocunque horis pomeridianis calor ade-
videtur febrilis, Aqua utatur sequenti, quam prius tamen turbabit hi-
nde agitando.

Recip. *Margrith. preparat* ʒjs

C. Cervi usti præp. ʒs

Off. de Corde Cervi n. j
Santali citrini odoratis. pul. 3s
Aq. borrag. 3ij
Card. bened. 3ij

Mis. S. Aqua corroborans.

Eundem in finem eodem in casu applicentur epithemata campo pe-
 um & manuum atque temporibus.

Recip. Flor. borraginis
Violarum ā. p. ij
Anthos
Melisse ā. 14j

Flor. Nymphae pñ
Rosarum pjs
Santali citrini pulver. 3s
Cort. citri 3j

Fiant sacculi quatuor, lati digitos ij, & longi dig. dimid. S. Sac-
culi pro pu'fibus.

Recip. Aquar. rosar. 3ij
Cinamomi 3ij
Borrag. 3js
Spec. diamargarit. frig.
Aromat. rosar. ā 3j

Mis. S. Aqua. pro superioribus sacculis.

Si incidat & ex omni ungvento C. utatur ad tempora.

Recip. Ungt. albi
Alabastrini ā. 3j
Nibi i albi 3s

Ol. rosac. q. s. F. linimentum C.

Urgente dolore calculi, compescatur is ungvento superiori, omis-
 so ungvento Alabastrini & ejus loco addito tantundem olei scorpionum.
 Si Tenesmus urgeat, non tantum fatus fiat ex herbis chamomil &c.
 Item H. & I. sed & per siphonem in anum irroretur mucilago seminis
 psyllii, lac & mel rosatum. Hæc tamen sint calida.

Tandem in mucilaginem & linteolum intingi potest, inque anum im-
 mitti ad abstergendum & consopendum.

Si dolor ani sit immoderatus, superioribus addi potest crocus, qui do-
 lorem vehementer sedat. Demum podice sic eloto, pulvere conspergatur
 Antimonii minutissimè pulverisati.

Ggg

Si

Si fluxus redeat Hæmorrhoidum, bibat de Tormentillæ & fragorum ficcorum decocto. Postea in balneo incoquantur.

Rec. *Alumni. plumosi pulveris.*

Pulver. cupressi ā. q. s.

Fiat infusus usque ad umbilicum per horæ quadrantem, Egresso fumigium fiat in anum è pulvere capparum, quantitate juglandis Tandem binas Rotulas D. absumat.

Recip. *Gummi Arab.*

Tragagant.

Cornu C. usti præp.

Masticis ā. ℥j

Corall. rub.

Magarit. preparat. ā. ℥s

Boli Turaci veri

Sem. Portulacæ

Endivia

Carab. alb. n. ℥s

Sacchari albiss. in aq. plantag. dissoluti ℥ij. 4. Conf. in rotulis aromatifi ol. nuc. mosch. destill. gut. iij.

S. Rotula D.

In actu tertio præsens adesse non poteram, quapropter præsentibus reliquis medicis imperabam, ut ad sequentes articulos observantissimè attenderent, eamque ad rem quæ pertinerent, pro suo iudicio, salutariter exequerentur :

1. Somni observetur quantitas, qualitas, effectus.
2. *Ἀποεικ* medicamentorum, inprimis vero quorum.
3. In Excretionem sanguinis considerent. 1. Quantitatem. 2. Substantiam, an crassus, levis, ichorosus, mixtus. 3. Qualitatem tum in colore, tum verò in acrimonia. 4. Modum excernendi. 5. Excrementa, an crassa, densa, dura, flava, nigra, adusta.
4. Locus, per quem excernantur excrementa, ut intestinum rectum, quod consideratur secundum conjunctionem cum colo.
5. Tumor schirroides.
6. Modus excernendi, an cum magno conatu, & cum Tenesmo, & utrum totum intestinum rectum doleat, an verò tantum pars superna, media, infima.
7. Dolor circa os sacrum.
8. Calculus, si in renibus, ureteribus, vesica, cole.
9. An

9. An dolor Colicus perseveret ab adustis fecibus, an verò flatulentus fieri incipiat.

10. Quomodo appetat cibum, concoquat & reficiatur.

11. An facilius jam sit sessio.

12. Explorentur vires diligentissimè.

13. Quomodo ad hos vel illos cibos in specie se habeat.

14. Pro exigentia singulorum, superiora medicamenta repetuntur.

15. In ultimâ mensis hujus quadrâ, quantum fieri potest cessetur à Medicamentis purgantibus & diaphoreticis, solis retentis corroborantibus.

Pro congressu quarto, circa æquinoctium vernum venæsectionem institui. Ordinabam ipsi sequentem potiunculam.

Recip. Rad. Tormentilla conquass. ʒjss

Brodii pulli non salati lbjss

Coq. & exhibeantur manè & vespere.

Hæc Tormentilla cum paulum sudores moveret, alternis eandem diebus propinandam censui. Sudori quidem non magnopere indulgendum censui, ne iterum ebullitio fieret massæ sanguineæ, sed ut tantum ichorosa materia à centro loci affecti (hæmorrhoidum) ad superficiem promoveretur corporis. Interim ubi alvus subsistebat, enema vel potiunculam laxativam præscripsi. Magnam etiam tunc temporis suspicionem mihi movebat foetor sanguinis excreti. Putredinem enim viscerum adesse arbitrabar, cui causam præbuissent perfunctorii illi Medici, qui ab initio accersiti fuerant.

Visitatione quinta de dolore pustularum ani quiritabatur ægrotus. Eam ad rem curabam parari fotum è sequenti medicamento:

Recip. Urtic. cum toto.

Rad. Chelidonia min. ā. q. s.

Coquantur isthæc in vino de monte Trisanze vel vino rubello quocunque alio, vel etiam vino austero styptico.

Alternatim verò & diebus intercalaribus fiat fotus ad intestinum rectum è sequentibus medicamentis.

Recip. Altheæ cum toto,

Rad. bismalva

Fabaria

Herbar. chamomel.

Aneth.

Sem. lini q. s.

Coquantur in aqua vel vino pro fotu.

Fient itidem fofus ē succo rad. chelidon, minor. oleo lini, fabaria, oleo ovorum, croco, floribus sambuci, capis sub cinere toftis : Fovetur quoque pulvere limacum calcinatorum, qui cum liquore aliquo in bombace exceptus adhibetur.

Aselli quoque cum oleo violaceo ad formam linimenti contunduntur & adhibentur.

Fit quoque fuffimigium ē radicibus capparum.

Hæc fanè omnia permutatim adhiberi volo, emplastris appropriatis tandem super impofitis.

Congreffu fexto de quibufdam adhuc ægrodus conquerebatur refiduis fymptomatibus.

Ad fedandum enim dolorem ani, federe jubebam in affere cupreffirepido.

Alvum folvi demandabam caffiâ deglutitâ cum elect diaphœen. media ante prandium horâ.

Epiploon quoque vitulinum madefieri jubebam in oleo fequenti, calidumque applicari abdomini, ufque ad pubem deorfum. Liniebat id dolorem flatulentum, alvumque infimul emolliebat.

Recip. Ol. chamomel. nâ

Aneikini

Ung. dialthea ā. ℥js

Ol. laterini ℥j

Cymen ℥ij

Aq. ftr. chamomel. ℥ij

Bulliant parum, exprimantur, & applicentur ut juffi.

Vifitatione feptimâ jubebam continuari ufum decocti Tormentillæ & fragorum, quibus faporis acceptioris ergo fyrupum Granatorum fequentem admifcebam.

Rec. fyrupi granatorum medior. ℥iiij

Extracti acetofæ ℥s

Ol. anifi gut. viij

S. fyrupus granatorum nofter.

Ni fluxus omnimodo ceffaret, jubebam parari ē fequentibus herbis inreffum ad umbilicum ufque.

Recip. Fol. plantag.

Flor. & fol. verbasci ā. Mv.

Seminis lini conquaffaci ℥x

*Cor. mal. granat.
Balauſtic
Sumack.*

*Baccar. myrib. conguſſ. omnium. ā. Mv
Dentur ad char: am.*

Pro confortatione in uſu habere debebat creberrimo Rotulas & Syrupum ſequentem.

Recip. Spec. roſat. novell.

Aromat. roſat. ā. ʒij

Margarit. prap.

Corall. rub. ſubtil. pulv. ā. ʒs

O. nuciſta gut. V.

Sachari albiſſ. ſoluti in aq. Tormentilla ʒv.

Fiat. confectio in rotulis.

Recip. Cortic. myrobal. Chebul. Citrin.

bellet. Emblic. Indor. ā. ʒs

Myrtill. Ital.

Fragor. exſiccāt. ā. Mj

Coq. in ſuff. quant. aq. Tormentilla & fragor. Poſt exprimantur fortiter pro remanentia ʒiij. Quibus adde.

Syr. granator. acid. ʒiij

Sachari q. s. Coq. iterum ad conſiſtent.

Syrupi, cui adde ol. anīſi gut. X.

Fiat. Syrupus.

Sanguinem quoque pillulæ ē Bdellio ſiſtent, ſi nempe harum IX. horā dimidia ante prandium ſumantur vel coenam.

Recip. Maſſ. pill. ex Bdellio recentis.

Diſpenſat. ʒj

F. pill. n. xiiij

Extractum corallorum eundem ferè præſtabit uſum.

Viſitatione octavā febricula eum correptum deprehendi : Urge-
te autem Febris paroxyſmo dolor in oſſe ſacro quievit penitus. Cau-
ſam ſubſuiſſe arbitror quod partes illæ refrigeratæ, calore febrili, cale-
factæ fuerint. Febri huic ſequens oppoſui medicamentum.

Recip. Pul. cordial. mei ʒj

Corall. rub. prapar. ʒiij

Aq. card. bened. ʒiij Miſ.

Ggp 3

Hoc

Hoc in ipso utebatur paroxysmo. Ante paroxysmum Electuario utebatur confortativo : post eundem rotulis.

Recip. Conser. acetosa

Fler. borrag.

Violar.

Meliss. ā. ʒij

Lactuca Hispan. condit. ʒjs

Rad. Cichor. condit. ʒj

Spec. diarthod. Abb. ʒjs

Extracti acetosa ʒs

Cort. citri cond. ʒs

Margarit. prep.

Coral. rub. prep. ā ʒi

Mis. cum syrupo violar. ad formam Electuarii.

Recip. Margarit. preparat. ʒjs

Corall. rub. prep. ʒi

Sachari soluti in aq. plantag. & card. bened. ʒjs. F. Confectio rotulata.

Compressio pectoris sub sterno, uti & dorsi incidebat sepiusculè.

Eâ in re laterem calidum vino delibutum, linteisque in volutum, pectori & tergo applicabam, quem omni modè salutarem sensit. Ad fissuras ani (fluxus enim ferè cessarat) præter superiora, aspergebam pulverem ex Anagallide flore rubro.

Ossi sacri doloribus satisfiebat unguento Comitissæ & Martiato : quod sanè egregiè profuit in mitigando dolorem, calefaciendo & siccando.

Tandem jubebam, ut unâ horâ ante cibum sequenti uteretur medicamine, ad calorem nativum pedetentim excitandum, & postliminiò quasi reducendum.

Recip. Miræ cydoneor. ʒj

Ol. piperis destill. gr. vj

Mis.

Postremo Totus in refocillandis viribus eram occupatus : hunc scopum, cum secutus & affecutus essem, corpus more decenti evacuandum statuebam.

Deo altissimo sit gloria.

CONSILIUM LXXV.

IN ULCERIBUS DYSEPULOTICIS



Ulcer Crurum Dysepulotica, quibus Vir nobilissimus conflictatur, partim sceletyr bica esse partim verò rheumatica & ob caliditatem quandam partis, ipsi fluxioni junctam, magligna: cum ex causis & mali essentiâ: tum verò symptomatis pathognomonicis facile patet.

Sceletyrben quidem i. ipsa ulcerationis essentia ostendit, dum crustosa sunt, nigra, sicca, neque pus in initio neq. saniem reddentia, itemque rebellia & contumacia.

2. Causæ. I. Externa, inprimis victus ratio antehac inordinata, affectus animi vehementiores, mœror & sollicitudo de publicis. 2. Interna. Humor melancholicus, superassatus, contumax, ut ratione adustionis pustulas excitet: ratione crassitie cutem & subjectam carnem quasi adurat: ratione contumaciæ vel potius malignitatis efferatur.

3. Materie *μεταστασις* ante annum ex brachio in ventrem & inde in crus sinistrum: ubi ulcera hujusmodi excitata & multiplicata fuere.

Tertiò. Symptomata concurrentia, asthma, deliquium leve animi, febricula inordinata pulsus languidus, tarditas ad motum, tumor pedum œdematosus, doloris sub noctem exacerbatio, inquietudo in lecto.

Rheuma verò (quod sceletyrben jungi quandoque solet) demonstrat. I. Et pars recipiens seu subjectum (tanquam terminus ad quem) aptum, cutis scilicet & crura. 1. Cum alias cutis à natura ad id sit constituta, ut fluxiones recipiat. 2. Crura autem per se epatis emunctoria statuantur & esse soleant. 3. Ac ratione situs ad suscipiendas fluxiones sint accommodata. 4. Pars illa affecta, imbecillior aliàs per se utpote à fonte caloris longius distita. 5. In hoc subjecto impotentior sit reddita, tam à triplici in tibiæ locis diversis factâ distinctis temporum intervallis contusione. 6. Quam per œdema crurum quo cutis & subjacens illi caro (tanquam apta ac convenientia aquosæ illius materie receptacula) alterata, nihil miri, loca quoque illa ad humorum partim falsi & mordacis, partim crassi fœculenti ac melancholici influxum disposuisse, quo postmodum, ceu acri quadam uredine tentata, exulcerata ac crustâ densâ obiecta fuerint.

II, Et pars mandans, (tanquam terminus à quo) Epar scilicet & Lien, quæ

quæ 1. multitudine vitiosi humoris, (qualis quotidie vitio coëctricis facultatis ibi gignitur, ut ex continua humoris illius vacuatione, patet) gravata. 2. Itemque humoris dicti malitia & acrimonia laceffita, in subjectum aptum sese exonerarunt. Cum enim circa viscera & vasa, humor ille coacervatus, propriam & peculiarem quandam alterationis formam acquirat, eamque, vicinis vel etiam remotioribus partibus communicet, fit, ut naturalis istarum partium temperies corrumpatur, donec in contagii communione consentientes ad susceptam semel qualitatem alienam, alimenta super ingesta commulentur similiter & vitentur, sicque multi ejusmodi humores pravi de novo indies generentur.

3. Humor fluens, 1. & ob multitudinem ibi contineri non aptus. 2. Et ob malitiam seu acrimoniam naturam laceffens. 3. Et ob substantiæ modum tenuitatem scil. facile delabens. 4. Et ob medicamenta exiccantia commotus, majorem impetum adipiscens.

III. Intemperiem tandem, calidam indicat 1. color partis rubens. 2. Caro ulcerata rubicundior. 3. Calor quidam præter naturam partis ad tactum. 4. Sensus manifestus caloris ab ægro. 5. Dolor ab illo sensu. 6. Cutis desquamatio, velut in ambustis.

Intentiones agendi quod attinet, I. Ratione sceletyrbes facile constat, 1. viscerum obstructions aperiendas & illa quidem esse alteranda. 2. Humorem illum adustum alterandum quoque & educendum. 3. Ulcera verò tanquam ambusta in initio, hinc ut maligna tractanda.

II. Ratione Rheumatis. & I. quidem partis mandantis. 1. purgandum quoque, non tamen nimium, ne coëctrix facultas magis debilietur, sic plus humorum gignatur, 2. Roborandum.

II. Partis autem recipientis, roborandum quoque.

III. Humoris tandem fluentis. 1. multitudo, omni evacuationum genere abscindenda. 2. Acrimonia attemperanda. 3. Tenuitas leviter increasanda. 4. Impetus præsertim humorum ad crura inhibendus. 1. vel per vacuantia per alvum, urinam, sudorem seu habitum corporis. 2. Vel per exiccantia, lignum & vulnerarias potiones. 3. Vel per derivantia revellentia & intercipientia, v. g. fonticulos.

III. Ratione intemperiei calidæ junctæ alterandum rursus, & potissimum quidem per Topica.

Quibus sanè intentionibus satisfaciendis progrediendum erit secundum tria Therapeutices instrumenta, Diætam, Cheirurgiam, Pharmaciam.

Diætam quod attinet, secundum sex res non naturales dictas:

Omnem quidem excessum aëris in singulis qualitatibus vitandum esse

esse facile constat, ne alterentur viscera nobiliora, vel humores fundantur aut exprimantur: inprimis tamen humida & Austrina coeli constitutio.

Quemadmodum & cibi tam boni quam mali succi noti sunt. Monendus tamen videtur vir nobilissimus, ne variis cibis simul vescatur ob inæqualitatem succorum & coctionis. Et abstineat quidem suffumigatis, falsis, aromatis nimium conditis, peracidis, caput petentibus: piscibus quoque crassiorum carnum, leguminibus flatulentis & id genus aliis pravum vel crassum succum gignentibus. Utendum verò inprimis nasturtio: itemque absinthio, quomodocunque grata palato reddi possunt. Et ex fructibus, passulis, limonibus, capparibus. Ac nunc temporis fragis, cerasis, itemque persicis cum maturuerint, ad intemperiem humoris calidam & siccam utendum, modò ventriculi tonus dictis adhuc respondeat, hordeatis aliàs, amygdalatis, additis præsertim amaris: itemque seminibus frigidis ad humoris adusti attemperationem: pineis, pistaceis, quod abstergant, aperiant, nutriant.

Potus quoque magna habenda ratio, ob celeritatem nutrimenti & maximum ejus indigentiam. Unde cerevisia eligenda clara, defœcata, vetustior parumper. Vinum verò *ὀλιγοπόρον*, subtenue, quale Neccarinum vel Rhenarum tenuius. Inprimis tam cerevisiæ quàm vîna medicata ex absinthio, cochlearia, fumaria (cum absinthii sapor, reliquorum alias facile obfuscet) veronica, chamædri &c. parari possent.

De somno haud aliquid monendum videtur, cum à meridiano aliàs abstineat, nisi nocturnus nullus fuerit.

Neque etiam de motu vel quiete: cum propter crura affecta motus nimius impediatur & alias Hippocrates, qui ulceribus laborant, eos ne stare quidem velit: atque hoc loco in sceletyrbe minus adhuc conveniat, cum humores aliàs locum illum petere soleant, & animo quoque quandoque patientes ipsi facile linquantur.

Alvum respondere singulis diebus oportet spontè, vel arte: per Martium scilicet panem ex Mechoacanna, vel passulas purgantes, vel pruna cum manna decocta.

Animi tandem affectus moderatos esse decet, mœrorem inprimis & solitudinem, utpote aliis graviores.

Medicamenta quod spectat & alterantia quodam. I. Syrupus Magistralis parandus ex rad. cichor. asparag. rusc. filic. cort. cappar. fol. agrimon. scolopend. nasturt. aquat. cochlear. nummular. cepeæ, hyssop. fumar. absynth. Rom. Sem. endiviæ. card. bened. flor. 3. cordial. uvis passis & id genus aliis appropriatis, infusis & decoctis in aq. veronicæ,

chamædr. cuscute, vel etiam in sero caprino. Addendo succos cochleariæ, nasturtii, cepeæ, depuratos & cum sachari s. q. syrupum conficiendo.

2. Vacuantia verò : cum humores ita sint fluxiles ac ad dejectionem alvi paulo copiosiores, debilior virtus reddatur : nodulo uti posset in potum infuso, ex Rhabarb. fol. sennæ, epithym. soldanell, agar troc. rad. mechoacan. cum correctoriis. Helleborus quoque niger Styriacus, cum coctionem desideret, cum caryophyll in peculiari vini quantitate infundi & coqui posset, hinc ut refrigetur permittit tandem reliquo vino infusionis noduli affundi. Cumque malignitatem ulcera obtineat, Turbith minerale rectè præparatum vel etiam Alkacheft ex usu valdè esset, quemadmodum multorum experientia id comprobavit.

3. Roborantia tandem : ex conservis cochlear. absynth. fumar. bugloss. card. bened. spec. diarrhod. Abbat diatrionfantal. troc. de capparib. myrobal. chebul. & citrin. nuc. Ind. condit. & id genus aliis, variæ formæ conficiendæ. Quemadmodum & syrupus sceletyrbicus ex succo cepeæ, nasturt. cochlear. cum sacharo confici solet, & illi postmodum syr aliquis cordialis v. g. flor. tunicæ, de pomis redolentib. de cortic. aut acetos. citri misceri. Ac parari posset destillatum ex supra dictis alterantibus : destillatum verò vel ita simpliciter usurpati, vel per manicam super cinamom. & sacchar, colari, sicque instar clareti exhiberi.

4. Exiccantia per potiones vulnerarias ex pentaphyll. caryophyllat. veronic. agrimon. scabios. &c.

5. Itemque vacuantia per habitum corporis (sive sudorem sive halitum) ec sarsaparill vel potius ex ligno & cortice Itemque Chyna ex usu valde essent, nisi forsan humores ad expulsionem commoti, ratione impetus & consuetudinis ad inferiora; deorsum potius ferantur : sicque ulcera hoc præsertim tempore anni, quo alias illi in corpore humano commoveri spontè incipiunt, sic à natura sese exonerante in loca consveta protruduntur, multiplicata fuere. Ut idcirco bis posterioribus omissis, diætâ exquisitiori, itemque aliorum usu frequentiori, mali huius expugnatio sit tentanda.

Chirurgica tandem præsidia quod attinet, venæsectio, quod huic non assveverit, morbusque jam sit in statu, locum hic nullum videtur habere : licet cucurbitulæ scarificatæ propter consuetudinem, & interceptionem quasi, vel etiam revulsionem in natibus & scapulis admitti possent.

Fonticulorum pro derivatione vel interceptione saltem humorum, usus quoque nullus videtur, quod ambo crura cum exulcerata, tum oede-

œdematosæ; tumore turgida conspiciantur : Ulcera autem hydropicorum difficulter esse sanabilia & ipsius Hippocratis autoritas & rerum omnium Magistra experientia luculenter attestetur. Quæ sanè ulcera, prout nunc in cruribus reperiuntur, in initio ratione crustæ tanquam ambusta tractanda per digestiva dicta ex vitello ovi, therebinthina, ol. ros. butyro majali non salito loto &c. Inprimis butyro recenti multum tuso & agitato in mortario plumbeo, cum succo malvæ in formam linimenti redacto. Quemadmodum hoc loco ex usu propter intemperiem partis esset, mucillago psyll. cydonior. & gumm. tragag. extr. cum aq. parietar. additis ol. lilior. alb. & cerâ; superponendo diachyl. simpl. & etiam molle. Cujus hæc est, descriptio.

Recip. *Empl. diachyl. simpl. ʒiij*

Ungt. dialtheæ ʒij

Ol. Irin.

Chamomell.

Anethin.

Lilior. alb. ā. ʒij

Cera ʒvj

Therebinth. ʒij

Mox fol. brassicæ recens, si libuerit, adhibendo. Sublata verò crustâ ex usu esset ungt. Arantii ex succis (tractat. suo rumorib. præparat. appressum) cum & sine camphora: cum præsertim intemperies calida partis, simul juncta sit.

Ac alias paratur unguentum sceletyrbicum ex succo cochleariæ cum pauxillo mell. & tantillo pulv. aristol. rotundæ, vel etiam aluminis. Quemadmodum etiam utrique tam Arantii quam sceletyrbico unguento propter ulcerum malignitatem, aliquid præceptati loti aqua cochleariæ misceri posset, vel etiam ol. saturini, sulphuris aut vitrioli usurpari.

Atque hisce quidem cerotum diapalma superponendum. Quemadmodum mundatis probè ulceribus ad unguentum fuscum tanquam scaroticum: tandem ad illud diapompholygos, emplastrum Griseum vel de minio tanquam epulotica, deveniendum.

Cumque dolor ulcerum admodum per noctem inprimis, infestet: pro palliativa q. cura: medulla panis triticei cum lacte cocta (quibus aliquid Alfinis aliqui addunt) vel etiam puls ex medulla panis secalini & cerevisia antehâc contulerunt, ac in usum illa denuò revocari possent.

Atque hæc quidem pro ratione indicationum nunc temporis agenda vi-

dentur. Quæ sanè intentiones si immutata temporis processu fuerint, remedia quoque varianda eaque alia præscribenda erant. Faxit Deus eventus optatus respondeat.

CONSILIUM LXXVI. IN ULCERE SINUOSO.



Ecidit Ante Sexennium vel circiter Vir nobilissimus cum equo ita ut utrumque os tibiæ sinistra in medio frangeretur : Ac post absolutam curationem (quæ tamen per multos annos extracta fuit) spatio quadrantis anni, ulcus reerudit in parte sinistra tibiæ, paulò altius supra fracturam, tumque duo ossula ibi fuere extracta. Sic unus ibi sinus est constitutus. Hinc iter quoddam ingressus cum incommodius forsan crus tractaret : In parte tamen domestica tumor oboritur, aliquantum inferius respectu fracturæ : qui postmodum suppuratus alteri sinui occasionem præbuit.

Hunc dum explorat Chyrurgus, reperitur tertius, & aperitur quoque, loco quasi intermedio. Ut omninò, quantum ad præsentem hujus affectus præter naturam statum ulcus mihi videatur esse non tantum sinuosum, sed & fistulosum unà cum osse corrupto.

Ulcus quidem, cum essentia ipsius illud ostendat : solutio scilicet, continui in parte molliori cum erosione, unde pus quoddam seu sanies excernitur.

II. Et quidem sinuosum : cum scilicet oculis pateant terni, ut ex stylo probatorio liquet, itemque injectionibus, dum infuso liquore ex duobus majoribus manifestò materia refluit, ex tertio transudat.

Neque verò plures adesse sinus existimo, quod liquoris injecti quantitas respondere hisce videatur, cum immissus ab altero statim effluat, tertio loco, ut jam dictum est, quasi transudet : sic quàm celerrimè per omnes feratur. Candela quoque cerea iidem sinus fuerunt explorati : at non soluti reperti.

III. Fistularum quoque ratione calli, qui manifesto junctus apparet

1. Dum cute q. albicante omnes sunt obvoluti.

2. Dicta cutis exacte non sentiat.

IV. Os deinceps corruptum esse, & ex fractura conjici potest, quàm (malè præsertim tractatam) subsequi solet : dum inflammata carne & cute,

cutem, tanquam operculo suo os spoliatum. (aëris, quem nunquam ex-
pertum fuerat, appulsum) alteratur.

2. Deinde ex ulceribus dysepuloticis præcedentibus quorum ratione
sanies ad os decurrit, & in ipsius substantiam sese immittit, unde illius
secundum certos gradus corruptio.

3. Tactus præterea hoc testatur, cum nimirum non tantum in aspe-
rum quiddam (unde periostio nudatum fuisse facile patet) sed & in æ-
quale, imò quasi in cavitatem quandam stylus fuerit immissus, cum os-
sa sana, dura esse constet, glabra & lævia.

4. Adhuc caro mollis, fungosa, laxa, quæ supercrescere hætenus
æpenuerò solita fuit.

5. Ulcera itidem morosa, & epuloticis rebellia : ita ut licet jam jam
cicatrix induci velle videretur : tamen spontè caro fuerit relinita : quod
in osse illo, natura solido & sano fundamento destituta laudabilem
carnem superstruere nequirit.

6. Sanies denique exeat tenuior & liquidior. Ac licet alias foetere e-
jusmodi sanies maximoperè soleat : hoc tamen loco foetor deesse (ut
per filamenta sicca exploratum fuit) videtur propter injectiones ex frigi-
dioribus plantarum succis ut solani &c. quæ illi resistunt.

Quemadmodum & minor est copia puris, quod fistula in ipsum
os finiat.

V. Verè Rheumaticum autem licet hoc ulcus statui non possit.

1. Cum nulla adsit excrementorum acredo.

2. Neque labra tumida.

3. Neque major excrementorum proventus quam pro ratione ulceris.

Attamen I. Neque pars mittens deesse videtur, Ut.

1. Ex colore faciei colligere est, plumbæo.

2. Ex lienis vitio quodam, & in sinistro hypochondrio quibusdam
quandoque molestiis.

II. Neque pars recipiens, ut.

1. Ex tumore sub loco affecto apparente constat.

2. Quod modò melius, modò pejus æger habeat. (licet & extrin-
secæ hujus causæ reddi quandoque possunt.)

3. Decrementum adsit cruris : sic consumptio, vel avocatio vel deri-
vatio alimenti (per affluxum quandam ad locum affectum) facile
appareat.

Intentiones agendi quod spectat.

Hhh 3

1. Ut

1. Ulcus ut solutio continui, unionem rursus indicat.
2. Fluxio, si quæ adsit, sui ablationem vel interceptionem, vel exiccationem.
3. Sinus sui repletionem.
4. Callus sui remotionem.
5. Os quantum ad partes corruptas, tanquam præter naturam sui separationem.

2. Quantum ad partes sanas, sui conservationem.

Quibus sanè intentionibus satisfaciendo ab osse corrupto, incipiendum, utpotè quod aliis fundamentum & sustentamentum quasi præbet : ut omnino vitio illo ossis remoto, callus facilè extergeri & laudabilis caro regigni, sic sinus tandem repleri : tandem ulcus uniri possit.

Corruptio verò ossis cum non patens sit, sed occulta : quomodo os apparens reddi possit, non facilè patet. Sive,

1. Per dilatantia c. 9. rad. gentian : vel spongiam, & id genus alia : cum tentatum id quidem absque successu fuerit : interim redditus dolor ingens, sicque nova affluxio sit excitata.

2. Sive per sectionem : cum in loco incerto inquirendo multa temerè secare oporteret, cum summo ægri periculo, & artis dedecore.

3. Sive caustica : tam potentialia : quemadmodum & illa usurpata in parte sylvestri fuere : sed propter symptoma gravissimum (stuporem intensiss. sc. partis subjacentis :) statim succedens, amota necessariò fuerè.

4. Quam actualia : cum absque sectione periculosissima neque simpliciter, neque per cannulas applicari possint.

Nisi tamen per septica quis, partes loco affecto, hinc inde vicinas exedere, ac carnes liquare, sic aditum sibi patentem, ad eos affectum parare velit. Quod sanè neque citò, multò minus jucundè, multò adhuc tutò, propter vasa ibi excurrentia fieri posse omninò sentio. Constat equidem (experientia non etiam magna) talia ulcera dari (vel spontè vel artè) quæ magnam tibiæ, aut aliorum artuum usque ad os partem occupant. An verò in casu hoc antiquo, Dubiam illam investigationem dubiam quoque rasuram, vel unctionem, Vir nobilissimus sit admissurus, ut dubito, ita ipsi & aliis meliori judicio præditis judicandum relinquo.

Interim curam hancce (quam tantopere expetit vir nobilissimus) alia via aggrediendo : cum præsertim ipsemet Hipp. ante ignem ferrum experiri jubeat, & ante ferrum medicamenta : Naturæ separatio illa com-

committenda : juvando illam per exiccantia potissimum. Secundum omnia illa tria medicorum auxillia, Diætam, Pharmaciam, & Chyrurgiam : Spectando scil. ut antea ostensum fuit, malum magis urgens, ossis nimirum corruptionem.

1. Non enim tantum dicta exiccantia, vehementer exiccando humiditatem, omnem ossis tam excrementitiam, cariei authorem quàm ex parte alimentorum, exhauriunt : Sic partes corruptas, exangves, nutritionisque ac vitæ expertes reddunt : consequenter necessario abscondere faciunt glutine eo. (quo cum sanis partibus ratione vicinitatis, & communione vitæ continebantur) destitutas ; Non aliter atque per autumnum vel etiam alias folia & fructus decidere videmus, consumto alimento & humido, quo tanquam glutine ramis propriis adhærebant.

2. Verum etiam : Quod per siccantia humiditates quod in ossis substantiam imbibitæ sunt, eamque mollem reddidere absumatur : sic os exiccatum firmitus reddatur : hinc facultas expultrix exurgat ac os corruptum, à sano separet.

3. Præterea ossis natura, per siccantia firmior reddita carnem generet, inter os corruptum & sanum : caro autem illa aucta, os postmodum corruptum impellat, sic separet.

4. Tandem ut in casu ita dubio separatio ossis, quam intendimus non succedat : os tamen per exiccantia illa (tanquam temperamento suo respondentia) in sanitate, quo ad licet conservetur.

Neque verò mirum videri debet, per Diætam, & medicamenta appropriata talem effectum separari (licet non ita facilè) posse. Si enim fistulæ, cancri, arthritici dolores, scabies & alii morbi, salsamentorum, acrium & aliorum, quæ tenuiorum sunt partium usu v. g. sinapi, alliorum, capræ, item quovis in cibo & potu excessu, vel saltem immoderantia, efferantur & exacerbantur : cur non cibus, itemque potionibus medicatis & aliis auxiliis appropriatis mitescere iidem & aliis possent, & ad æquiores saltem conditionem revocari, &c.

Diætam ergo quod attinet, secundum res suas sex non naturales magna illius, ratione habenda, quod absque ea, reliqua medicamenta nil possint : & secundum : Gall : illa unica multi diuturni curentur morbi. Licet verò de singulis illis multa afferri possent, cum tamen temperatam vitam nobilissimus æger aliàs vivat : pauciora monere sufficiat.

Ær ergò in activis sit temperatus, in passivis ad siccum vergens ; vitandæ ergò in primis mutationes ejus subitæ : ac caput à nocturno ære muniendum, ne defluxiones excitentur : In cibus observanda & & quantitas

titas & qualitas; Illa quidem, ut de mensa surgens appetat adhuc: præterea ut cœna sit parcior, quandoque etiam nulla, Hæc verò, ut sint simplicissimi, præterea laudabiles seu euchymi: quales quidem noti sunt. Et assis potius, quàm elixis carnibus utendum, ne fluctuent in ventriculo.

Quemadmodum & betonica, veronica, agrimonia, scordium, coqui in brodiis: Præterea brassica rubrâ & cancris fluviatilibus (utpote qui inter vulneraria dicta referuntur) frequenter uti posset. Fugendi è contra crassum ac viscidum succum gignentes, qui facilè quoque patent. Ac vitanda imprimis sale & aromatis nimium condita, fumo exiccata, frixa, acida, itemque acria.

Potus magna habenda ratio, cum citò & multum nutriat, neque eò carere possimus. Cerevisia itaque sit clara & lymphida vetustior parumper, non feculenta, vina generosa fugienda utendum verò albo, tenui, oligophoro, quale Rhenanum vel Neccarinum est. Somnus sit moderatus, & nocturnus tantum neque is statim à cibo inchoandus. Exercitium moderatum ex usu quidem est dum calor nativus in crure læso excitatur. Intempestivum verò valdè nocuum est, cum Hipp. eos ulceribus pedum laborantes non stare, ne dum ambulare jubeat. Alvus quotidie respondeat, spontè vel arte, scil: per passulas purgantes, quæ in officinis præstant: vel pruna decocta, aliquid mannæ adjiciendo.

Animi tandem affectus sint moderati: Ira potissimum & moeror qui aliis sunt vehementiores.

Cheirurgiam quod spectat, cum verè rheumaticum ulcus non sit, neque venæsectio, neque scarificatio, multò minus fonticulus in opposito crure pro derivatione, vel etiam in affecto pro interceptione ex usu esse videntur: Adde quod corpus alias cacochymiam potius quandam (vitio lienis) quam euchymiam præferat. Ut omninò, cum ex superioribus apparuerit, apertionem oris, tutam haud admitti posse, manus opera ferè sic excludatur.

Medicamenta quod attinet, præmissâ vacuatione primùm primarum venarum, per pil. hier. cum agar: aggregativarum post totius, vel per nodulum rhabar. fol. sen. agar. vel per syr. magistralem, ita ut tempore nunc verno ex rad. polypod. querni, Acori, gentian. Scorz. Valerian. fol. chamel. beton. primul. ver. Capill. Ven. lupul. Cort. myrob. chebu. citrin. Inder. sem. anisi foenic. fesel. cartham floribus hyperic. &c. passul. glycyrr. S. &c. decoctum paretur, & in eo infundatur, 2, Rhabarb. fol. sen. agatic. rad. mechoac. &c. ac colaturæ addatur.

tur Syr. de fumar. byzant. comp. Manu. calabr. Sl. Sacchari q. s. pro mediocri dulcoratione : præmissâ inquam vacuatione, Lignum ex usu foret tanquam Catholicon per se exiccans scil. totum habitum corporis : præterea quod dirigi per appropriata ad locum affectum & præsens malum possit : inprimis si maligna aliqua qualitas juncta forsan ulceri esset. Sudoriferum ergò parandum ex lign. Sanct. cort. ligni : falsa sparil. sassafras additis sub finem decoctionis rad. pimpinell. Caryophyllat &c. fol. beton. Veron. Careui &c. Sudoriferis non admodum conferentibus magni nominis medici, potionibus utuntur vulnerariis, quibus experientia astipulatur. Et ratio id svadere videtur : quod licet potiones istiusmodi, noxios humores per alvum non expurgent : Ulcera tamen detergeant, & ab omni vitiosorum ac excrementosorum humorum colluvie vindicent. Sangvinem præterea ichorib. & omni impuritate depurgando puriorem reddant : Ut postmodum natura excitata, corruptum à sano (beneficio facultatis seretricis) separet, atque ex sanguine illo defecato, tanquam materiâ aptâ & laudabili carnem quoque laudabilem regignat, & restituat. Posset ergo talis parari ex rad. aristolorum rot : Charyophyllat. Ind. fl. pimpinel : consolie. utr. fol. pantaphyll : peucedam : Scabios : agrimon. nepet : veron : beton : fanicul : Scord : Sem : card. benediët. hyperic. &c. Summ. Cannabis rubri & c. h. cord. & c. coquendo illa vel in aqua simplici vel appropriata ad quantitatem quamcunque, post dulcerando & aromatizando melle rosato sacch. conammom &c.

Quidam additâ justâ quantitate sacch. & Cinamomi, colando per manicam, parant vinum Hippocraticum Magis tamen arrideret distillatum affuso, vel vino albo tenui, vel aquis appropriatis. Vulneraria potione, & ipsa non admodum conferente, thermæ inprimis Carrolinæ, cum ratione minerarum, duplo plus exiccent, quam calefaciant, præterea penetrent, abstergant, consolident : maximo ex usu essent. Dum nimirum calor natus partium læsarum vel etiam ossium, excitari ita solet : sic functiones illius singulæ melius administrantur : humores, si qui affluant impediuntur : & si qui præsentés sint, excantur : Squamulæ ossium corruptorum quod licet, abstergentur, & soluta unitas rursus consolidatur : Si præsertim stillicidio illarum uteretur. Cumque de frigido illarum usu, num admittendus is sit nec ne, diligenter inquirat : minus commodæ tales videntur. 1. Quod ex Hipp. frigidum ulceribus mordax 2. frigidum ex eodem. Hip. nervis, nervosis & osseis partibus sit inimicum. 3. Tanta erosio quo ad interiora

in hoc malo penitus latente absque gravioribus Symptomatis vix possit institui.

Localia ipsa quod spectat, observata intentione principali exiccandum quoque ob rationes supra relatas. Unde injectiones ex herbis quoque vulnerariis dictis v. g. agrimon. aristol. rot. pimpinell. Veron. Osmund. &c. parandæ : miscendo illis ea, quæ ossa propriè spectant, cort : pini, opopanax. rad. pucedan. bryon. pumic. ust. Cretam conbust, thus. myrrham : ac si fortius velimus aloen gum. elemi, camphoram. coquendô in aqua simplici vel appropriatâ, vel hordei : ac usurpando colaturam aut per se simpliciter, aut addendo mel. ros.

Quod si fortius adhuc requiratur, lixivium parari posset ex cinere absinth. abrotan. aneth. addendo quadruplum ciner. sagni. aut querni. Atque illi injiciendo sequentia metallica, ignita : Alia a. ingredientia pulverisata : ac colatum cum melle ros. usurpando, Alumen subustum Sarcocoll. lap. calamin. marchasit calcin. ciner. fluviatil. Chalyb. aristol. utriusque lithar. tutiæ, myrrhæ mastic. bol. atm. terr. figill.

Ex quibus ipsis (si res postulare) cerotum parari posset, extrinsecus applicandum, additis ammoniaco, galbano seu therebinth : Cerâ & id genus alijs.

Quæ quidem nunc agenda mihi videntur : aliorum a. præstantissimorum Medicorum liberam sententiam & judicium cognoscere quoque cupio.

CONSILIUM LXXVII.

DE VITIO CUTANEO OBSIDENTE COLLUM, ET PARTEM MENTI, BARBÆ- QUE PILOS IMMUTANTE.



Nutritio Omnium Naturalium actionum prima est, ac prope modum maximè necessaria, alteratricis quædam species, ea non tantum in ventre obitur, sed & in venis, imò in unaquaque corporis particula, atque hîc assimulatio vocatur, nominetenus à nutritione, nihil autem re ipsa dissidens. Bifariam autem frustratur nutritio : aut enim prorsus non fit, aut non ritè sed vitiosè, neque intra justum modum, nunc ipsius virtutis alteratricis, nunc materiæ culpa atque defectu. Non fit nutritio ob privationem & defectum materiæ, ut in *αργοσία* vitiosè fit culpâ materiæ

ut in

ut in κακοτροφία ad quam Leuce pertinet, quā H. T. jam ex longo tempore conflictatur, inter cutis foedatæ vitia, & ad vitilignes relata. Species vitiliginum Græci ab immutatione floridi caloris cutis in austerrum ἀλφες, Latini inde album nominant, immutare enim apud veteres ἀλφαίνειν dicebatur, Aetius lib. 3. cap. 132.) tres sunt, ἀλφειοῦ generis nomen retinens, μέλας & λεύκη. Μέλας nigro & umbroso colore cutim inficit: ἀλφειοῦ & λεύκη albo & subaspero describitur, sed uterque quodam discrimine. Non enim leuce summam duntaxat cutem ut cæteræ duæ vitilignes, obsidet, sed paulo descendens altius, in cutim totam, & quadantenus etiam in subditam carnem grassatur, pilorumque radices corripit, quos sensim videmus defluere, quique succrescunt, novis prioribus haud similes esse, sed prætenues & instar lanuginis albos, deformiterque canos. Si qua ex vitiliginibus aliter colorata est, verbi causa, si cutis liveat, aut rubeat, fusca sit, eam moderni malum mortuum ferè indignant, in quo sensus admittitur, aut multò est stupidior, quàm in cæteris vitiliginibus. In omnibus igitur cutis decolor est, & florem suum naturalem, qui ex rubro & albo mixtus est, & in carnatus, perdit, maculis velut squamulis non continuatis, sed palantibus, & guttarum more dispersis inquinata, quæ mutata pristina se de sua interdum per temporum circuitus efflorescunt, ac longè lateque in aliis citius, in aliis serius proserpunt.

Ejusmodi macularum in cute causa est error facultatis nutriticis, & quem ipsa gignit ope caloris sui, sanguis improbus & vitiosus.

Est enim calor succorum dominantium, & exuberantium in corpore, qui ut probè adhæreant affectæ parti, ob ejus tamen infirmitatem assimulari & in rubedinem transmutari nequeunt. Quapropter caro, vitioso hoc, ac interim crudo sanguine diutius alta regenerataque concolor ipsi redditur, habitumque adipiscitur consimilem: ut caro quidem maneat, sed immutata forma pristina, aliamque aut verius alienam speciem degeneratione quadam induat, neque tantum, ut in crustaceis exangvis & alba, sed & gracilis nutritionis desiderio evadat. Sub hac specie sensus tangendi in particula, quàm leuce occupat, sese ipso torpidior redditur, ut neque scalptum, neque punctiorem infixæ aciculæ percipiat. Et tantum quidem de ideæ hujus non tam morbi, ut autumat Hippocrates in proerheticis, difficillimi & periculosissimi, quam potius periculi expertis foeditatis sive albuginis, quemadmodum Gaza nominat, tam in carne quàm in cute præter naturam ex pituita crassa, vel malò corporis habitu & lapsa facultatis nutritoriæ pronatæ.

Nunc ad τὸν ὄψον.

Galeno Leuce & cætera id genus cutis vitia medicamentis curantur pituitæ trahendæ idoneis : adhæc illis, quæ *σπυρματά* sunt, & foris adhibentur. Quemcunque autem Leuce invadit, non ita facile dimittit, præsertim si superficiēs cutis occalluerit, hoc est in callum obdurata sit, si cutis compuncta nihil aut multo hebetius sentiat, si fricta aut scarificata eadem lacteum quid exudet, & locus ante pilosus nunc glaber & depilis evadat. Tunc enim vix unquam sanescit, neque color pristinus postliminiò recuperatur.

Cæterum de te, vir humanissime, melius spero : nec enim in id discriminis alba vitiligo tua pervenit.

Hujus curandi ratio in duobus videtur consistere, in publica universi corporis purgatione, & in opera, quæ privatim & peculiariter ipsi loco affecto foedatoque impendenda est. Ad utramque tibi quædam artis nostræ præsidia mihi præscribenti utique verendum est, ne tritum objiciatur, ecquid Athenas noctuam? Estque in hoc genere jampridem ab aliis me multò, peritioribus in eadem arenâ desudatum strenuè, licet non eo, quem tu summopere optabas, cum profectu. At enim verò tibi amico debitum solvendum est, quod in nuperis tuis à me liberaliter exegisti.

Purgatio prævium quendam apparatus requirit Ordire ergò à potione materiam in corpore digerente, purgationique, quam pilulis deinceps moliemur, apparente.

Recip. *Aq. decoct. capill. ven.*

Agrimonia

Scabiosa

Lupulor.

Rad. Oxylapathi

Sem. urtica ʒvj.

Dissolve in iis, Syr. acetos. simplic.

De Betonica

Mell. ros. colati ʒj.

Mix. f. potio bihuana, sorbenda manè hora VI. calidè.

Duabus horis post, aut tertia à meridie sume aliquid pulpæ Tamarindor. recens extractæ, aut si præstò sit tantundem pulpæ Thamarind. conditæ, ut ex India in Emporia hodiè solet asportari.

Recip. *Pill. alaphangi.*

De agarico

De hiera ʒ.

Pul.

Pul. Turbith. albi & gummosi gr. viij

Trocis. Alband gr. iij

*Cum melle ros. col. s. pill. pestilential. magnitudine. manè deglutien-
da hor. V. cum ꝑß mell. ros. colati.*

Hor. X. forbeantur duodecim cochlearia brodii rub. cicerum. Non est autem, quod hanc purgandi corporis historiam sapius repetas, cum materia vitiosa hæreat in ambitu corporis. Quare te ad τὸ πικρὸν sive localia adjutoria statim accinges, præmisso tamen Mithridatio, quod habitui corporis dicatum est.

Recip. Mithridatij opt. ʒj

Rheb. Sambuci ʒij

Mis, in unum, & postridiè purgationis sumantur manè hora 4. cum haustulo vini: cui indormire tibi, atque insudare licebit per hor. j. aut jß, si vires permiserint. Die his interposito conferat se Dominus in balneum, quo ad defricandum affectum locum utetur pila sive lineo nodulo ex farina fabacea, lupinorum, pulv. cort. rad. cappar. sem. urticæ: aut affricet rutam cum pipere & vino ex vino subassam.

Extra balnea primas in usu tenet aqua è succo limonum in alem- bico vitreo destillata. Ante omnia autem locus sub mento defœdatus vitiligine præparandus est, hoc est perfricandus nitro, ut non nihil transpiretur, aut confricetur solum cutis in loco aprico, sub dio & ad solem: cui quidem operæ vernum tempus omnium erit accommodatissimum, unde Celsus lib. 5. c. 28. ἀλφειῶν vernos morbos appellasse mihi videtur. Sunt qui partem affectam asperioribus pannis perfricant, vel foliis ficulnis. Nonnulli loco frictionis partem affectam scarificant vulnusculis superficialibus, & minus aliè penetrantibus.

Postea pharmaca ex aceto illinunt. Tertiò abluunt locum, atque abstergunt cum aqua, ne nimis erodatur: Tandem betæ crudis foliis universum locum operiunt. Jacto hoc fundamento numerosa sylvæ medicamentorum in promptu sit, ne natura uni assvenscat. Fricabis ergo locum albo vel nigro elleboro, quousque exudet. Deinde tepente leporis sanguine inunges, aut illines sandaraca; vel.

Recip. Fol. ficæ

Sulphuris vivi

Aluminis ā. ʒj

Rad. cappar. ʒiij

Hæc in pollinem detrita cum aceti q. s. in corporentur in formam cataplasmati popularis quidem, at usu tamen longè præstantissimi.

Rec. Rad. Dracunculæ

Chamaeleont nigri ā. ʒjss

Aconis

Off. Sapiæ exusti in cinerem ā. ʒj

Farina fabacea aut hordeacea ʒj

Cum aceto in eandem formam redigantur & loco allinantur calide.
Vel.

Recip. Baccar. lauræ

Terræ cimolia ā. ʒj

Nutri ʒj

Rad. cucum. sylv. ʒij

Spuma maris usta ʒj

Pul. adherentis parietibus domus in qua eger dormit ʒij

Aceti q. s.

Illinatur ad solem, & post parvum interstitium ablue locum. Potest etiam rudis iste pulvis smegmatis loco in balneis adhiberi ad defricandum.

Galenī testimonio in 2. de alim. fac. c. 4. Pepones abstergunt, si sordidam cutem cum ipsis fricuēris : albos extimos & in cutis superficie detergit caro eorum, sed multò potentius ipsum semen. Mihi verò placet magnam amygdalarum amararum quod ab olei expressione relinquitur, magno usui in balneo, & vice saponis.


In ratione vivendi cautum te esse oportet, & omnem cruditatis occasionem, quantum quidem potes præcidere. Quo nomine somno paululum indulgendum, & exercitia oportunè instituenda sunt, & hæc in gratiam caloris nativi, ut is focilletur, & malus habitus frigidio deponatur, aut commutetur in calidum. Vitandi sunt cibi frigidi, pituitosi, glutinosi, ut pisces, legumina, olera, & quæcunque pinguis sunt, acetosa, dulcia. In vino tibi legem non pono. Ut te Bacchus amat, qui tam εὐσομον & σώμαχον succum tibi elargitus est, quem cum isthic essem, pitissando mihi æstimare licuit, inter Hispanica vina quotquot unquam bibi, facile præstantissimum. Si vomitus, ab epulis incessat, non intermittendus est, siquidem à crudi humoris illuvie ventriculum exonerat. Venus moderata non incommodat præsertim jejuno stomacho, etsi Cypria rarò absque caloris, jactura saluari solet. Deinde ab animo abstergi, quicquid inest moestitiæ, decet.

His spero te, Vir humanissime & amice colende, divinâ gratiâ adjutum, & à deformi candore menti liberatum iri, modò in usu eorum ab

absque fastidio, & cum quadam tolerantia perseveraveris. Nam mala chronica sunt filix temporum, suis circum scripta ætatibus, quibus sensim increfcunt, & in sui curatione moram diuturniorem desiderant. Quod si tamen res aliter atque speramus, neque ad votum animi successerit, ad phœnigmos & rubificantia nosmet impostherum accingemus. Tu interim ab aqua forti (quam separationis vocant argentarii) tanquam à Dæmone abstinebis. Noli quæso inte ipso vim tanti veneni experiri, quod Phaëthonti ab Halchymistis (puta iis, qui in Chymia parum, in Medicina nihil norunt) dicatum est. Vis liberè & ingenuè dicam, neutrum mihi probatur, neque λόγος ἀπὸ τοῦ λόγου, neque οὐ λόγος ἀπὸ τοῦ λόγου. Utrumlibet enim destitutum ab altero mancum est, & οὐλομένη αὖτε etiam suam amittit. Hæc tu fortassis joca dices, atqui ego seria. Vale & me ama.

CONSILIUM LXXIIX.

PRO QUODAM LUE VENEREA INFECTO.

 Uidam Haud Infimæ Notæ lue venereâ admodum erat infectus: habebat os exulceratum, & supra uvulâ ipsi cavitâs quædam erat erosa insignis, intantum, ut bibenti potus ad nares restagnaret, indidemquem largiter efflueret, is curabatur perquam feliciter medicamentis sequentibus:

Recip. Conf. Hamech. ℥iij. spec. Elect. Eleſcopi ℥j

El. de succo rosar. ℥j

Ol. fœniculi gt. ij

Mis. cum ſacharo pro bolo.

S. Electuarium A.

Recip. Rad. ſcorzonera ℥j

Cichorii ℥vj

Lapati acuti

Borraginis. pœonia

Pentaphylli ā. ℥ß

Fenic. asparagi ā. ℥vj

Calami aromat. ℥js

Liquiritia ℥j

Polypod. querc. ℥js

Passu

Passular. 3x

Sem. carthami conquass. 3j

Citri 3iij

4. Sem. frig. major. ā. 3j

Pulpa Tamarind. 3j

Corr. mirobal. citrin. chebul. Indor. cum ol. amygd. dul. praeparat. ā. 3ß

Corr. rad. elleb. nig. styr. secundum descriptionem subscriptam
prap. 3iij

Turbit. albiss. 3ij

Caryophyllor. 3ijs

Fol. beton. origani

Flor. stæchados Arab. rosmar. ā. Mj

Ceterach, agrimon. numularia ā. Mß

Fumaria Mj

Lapat. acuti

Borrag. adianthi nig.

Capill. Vener. cichor. endivia ā. Mß

Coquantur ut decet in s. q. aq. fumaria, sub. finem addendo

Fol. senna 3ijs

Epithym. cret. 3j

Ubi ebullierint parum, colentur pro his quibus adde.

Syr. de stæchad 3ijs

De fumaria 3iij

De succo beton. 3ij

& infund. per noctem

Rhabarb. opt. 3v.

Spic. Indor. 3ß

Agar. Trocis. 3b

Expressi Rec. 3iij. dentur pro dosi. affund. ol. fœniculi qt. ij.

S. Petio B.

Reiteretur quoties postulabitur.

Recip. Mass. pill. coshiar. 3ß

De fumar. 3j

Aggregat. 3ß

Troc. Alband. gr. ij

Cum aq. salvia f. pill. n. xxiiij

S. Pilula C.

Recip. Mithridat. opt. 3j

Conser. borrag.

*Anthos ā. ʒij**Mis. pro bolo.**S. Corroborativum D.*

Hisce medicamentis, quæ tibi, mi Domine N. N. hac vice mitto, utere sequenti modo:

Mane hora sextâ bolum A. degluti: jejuna ad decimam fuge aërem externum & attende quantum purget: sequenti aurora hora quintâ bibe potiunculam B. calid. redormi h. i. cavendo tamen sudorem. Tertiâ aurorâ cessato. Quartâ ex cephalica dextri brachii mediocrem sanguinis quantenus titatem, uncias quinque circiter emittito.

Sequenti manè, quinto scilicet die reiteretur potio B. ut & sexto, septimo & octavo die, ita ut sexies ea bibatur. Hac ratione enim tota massa sangvineâ bellè emendabitur alvo nimirum ter vel quater in die officium suum faciente, & vitiosos humores exterminante. Si verò continget pluries ventrem dejici, nec tu benè ferre possis, diem quandoque unum quiesce: potionibus omnibus exhaustis, duobus integris diebus ab omni medicamento abstinendum. Sequenti tandem manè pilulæ C. deglutiendæ h. 6. & superbibenda cochlearia aliquot aquæ salviæ vel betonicæ. Aurorâ a'tera Roborativum D. hora quinta comedendum, rursusque pro libitu dormiendum.

Recip. *Rad. elleb. nig. Syr. q. s.* abscindantur capillamenta, quæ infundantur per noctem in vino malvatico, & iterum leviter exiccantur, post interior materia lignea abjiciatur, cortices reserventur usui & S. *Cortices rad. elleb. nig. preparat.* Stipes similiter vel truncus abjiciendus tanquam inutilis.

Not. Cum filum curationis hucusque à nobis fuisset deductum, quiddam memorabile & relatu verè dignum accidit. Me enim jubente & ordinante barbitonsor malum illud venereum sequenti attingebat aqua, ibi ad miraculum usque quicquid emortuum erat & inutile, decidebat, ulcusque illud postmodum curationi tantum abest ut reluctaretur, ut potius quasi ultrò à natura restituendum videretur.

Aqua hæc erat:

Recip. *Satis Ammoniâci pulveris. ʒß*

Spir. vitrioli ʒß

Aq. rosar. alb. ʒjs Mis.

Postea præscripsi sequentia remedia.

Recip. *Ligni guajacî limat. ʒiij*

Cort. ligni ʒj

Kkk

Rad.

Rad. farfaparill. ℥ij

Lig. Sassafras ℥vj

Rad. Scorzonera ℥ij

Pentaphylli ℥j

Pæonia ℥ß

Passular ℥iij

Sem. anisi ℥iij

Cinamomi ℥iijß

Herb. betonica Mj

Salvia Mß

Cichor. Mß

Pulveriscentur & incidantur omnia ut decet, postmodum infund. in olla vitrea benè excoctâ affundendo aq. fontanæ ferventiss. libros quatuordecim, id est quinque cantharos Lipsenses. Stent in infusione per horas duodecim, post coquantur ad medietatem. Colatura reservetur usui: exhibeantur uncia sex usque ad octo.

S. Hydroticum A.

Remanentiis decocti superioris affund. aq. fontanæ libras quatuordecim, addendo rad. scorzonera ℥ß passular. corinth. ℥vj cinamomi, sem. anisi an. ℥js santali citr. ℥ß. Coq. ad absumpt. tertiæ partis, & per se refrigescant; post colentur. Colatura servetur usui & S. Potio cibalis B.

Recip. Rad. salsa parill. ℥j. lig. guajac. lim. ℥iij

Sassafras ℥iij

Rad. scorzonera ℥j

Herb. Betonica Mj

Salvia Mß

Passular. min. ℥js

Sem. anisi

Cinamomi opt. ā. ℥js

Coq. in aq. fontan. lib. xxiiij, ad consumptionem tertiæ partis, ubi per se refrigerint, Colentur, Colatura servetur usui.

S. Potio Cibalis C.

Recip. Spetier. diatrion. Santal.

Diarhod. Abbat. ā. ℥jß

Diambre

Diarnoschi dul. ā. ℥j

Ol. macis gt. iij

Sach. albiss. soluti in aq. cichor. & beton. ā. ℥v.
F. Conf.

F. Conf. in rotulis.

S. Rotula D.

Recip. Ungvent. infrigid. Galeni

Rosati Mesuei ā. ʒvi

Cum ol. rosar. odorifero f. linimentum molle pro inunctione dextris laris.

S. Unguentum E.

Recip. Ungt. rosat. Mes.

Ceroti santalini ā. ʒß

Populei ʒij

Ol. rosacei ʒß

Mis. pro inunctione lumborum. F.

Recip. Mass. pill. cochiar. ʒß

De sumaria ʒj

Aurear. ʒß

Extracti belleb. nigristyr. gr. iij

Cum aq. salviae f. pill. n. xxj

S. Pilula G.

Recip. Mitridat. opi. ʒj

Detur ad fictile.

S. Mishridatium H.

Recip. Rad. Filipendulae

Pentaphylli

Paeonia ā. ʒiij

Malva ʒß

Sem. Paeonia

Sileris mont. ā. ʒjs

Baccar. lauri ʒij

Sem. fenugraeci ʒiij

Herb. beton.

Salvia

Origani ā. Mj

Pulegii Mß

Malva

Parietaria ā. Mj

Flor. Chamomel.

Stæchad. Arab. ā. Mß

Cog. pro lib. j. in Colatura dissol.

Electuar lenitivum

Kkk 2

De

De hiera simpl. ā. ʒiijss

Diaphœnic. ʒjs

Ol. Cheirini

Anethini

Mellis anthosati ā. ʒj

Mis. F. Enema.

De hydrotico A. bibendum manē horā tertia ʒvj. usque ad 8. ʒ, superdormiendum & sudandum ad 7. sudore absterfo inungat epar un-
gvento E. & lumbos ungvento F. comestis prius rotulis D. Horā octa-
va prandendum, primisque tribus diebus more solito edendum, sequen-
tibus aliquid subtrahendum in inquantitate cibi. Tribus diebus primis
dictis bibendum etiam nihil præter potiones B. & C. nā sanē potiones
etiam semper in promptu sint, probè curetur. In hypocausto maneat,
obambulet. Hora tertiā vespertina in lectum rursus sese recipiat; quar-
tā dein auditā sudorifera potio prædicto pondere hauriatur & per unius
horæ spacium, fiat sudoris elicum. Rotulæ quinque comedantur &
partes scriptæ inungantur. Sexta hora cœnet. Sudorificæ & cibariæ
potiones nunquam deficient.

Recip. Confect. Hamech. ʒjs

El. lenitivi ʒijs

Spec. Elect. Elefscop. ʒß

S. Electuarium K.

Recip. Syrupi de fumaria ʒjs

Aq. fumaria ʒij

Mis. S. Saccus L.

Recip. Decocti fumariæ, flor. steecchad. & cichorii ʒiijss

Elect. de succo rosar. in tabul. ʒj

Conf. Hamch. ʒij

Spec. Elect. Elefscop. ʒij

Syrupi de fumaria ʒj

Mis. S. Purgatio M.

*Rec. Aquæ fontana lb. ij, in quibus laminas
cupreas decies extingue.*

Rec. hujus aquæ lbj. aq. plantag. rosar. a. ʒiij.

Sublimati ʒß

Sachari optimi ʒß

Bulliant ad medietatem, & clarificentur cum albumine ovi.

S. Aqua N.

Hæc aqua servetur ad usum.

Reli-

Reliquorum medicamentorum usum continuet per quatuor vel sex hebdomadas.

Ubi primò hydrotico A. usus fuerit, tormina aderunt, quæ Ene-
mate I. auferet, ita tamen ut eo die sudoriferum vesperi omittat. Aliàs
etiam alvus semper sit laxa vel sponte, vel clystere I. aut electuario K.
Hoc electuarium sumat manè, sudore finito; idque vel in forma sic-
ca, vel succo L. dissolvat, & tunc à meridie cesset ab hydrotico.

Singulis etiam septimanis semel per integram diem ab hydroticis
cessabit, & eadem die utetur manè hora vj purgante M. Ubi tribus se-
ptimanis perrexerit, tandem ulcus illud venereum aquâ corticum ju-
glandium destillata diligenter abstergat: vel ejus loco utatur unguen-
to Ægyptiaco, quod dissolvat aqua plantaginis, & habeat pro garga-
rismate. Si ulcus tunc nimium dolebit, gargarismate utatur è lacte te-
pido. Quod si hoc modo ulcus vel recrudescat, vel simile quid no-
xii appareat de regenerata carne superfluâ & inutili, vel etiam id me-
dicamentum non satis sit efficax, ad potentiora descendendum.

Bombace itaque aqua N. excipiatur: ita ulcus tangatur: tunc ca-
ro putrida & dura facillè vincetur. Chirurgus postmodò carnem a-
stringentibus & exiccantibus curet. Tandemque ita è domo in aërem
patentem (sed non nisi gradatim) se conferat.

In cibum veniant ova tremula, jura Gallinacea, amygdalæ, pineæ,
jura bubula, carnes gallinarum sine aromatibus, pulticulæ, ova liqui-
dius frixa, hordeata. In mensis secundis habeat passulas, confectio-
nes amygdalorum, pinearum, anisi, fœniculi, coriandri unicâ sachari-
tunica incrustatarum. Pira, citonia, aliaque styptica & incrassantia
ad tempus proscripta sunt.

CONSILIUM LXXIX. PROPHILACTICUM

TEMPORE PESTIS.

Nec non XXX.

THERAPEVTICUM PRO IIS, QUI JAM

DENUTU ET VOLUNTATE DEI LUE

PESTIFERA SUNT INFECTI.

*Datum & promulgatum lingua vernacula ab ipso D. BRÜN-
NERO, sine tamen medicamentorum descriptione,*

Anno 1598.

Kkk 3

PRÆ.

PRÆCAUTIO IN PESTE CERTIS MEDICAMENTIS FACTA, UT ET PRÆSERVATIO.

Primò omnes Masculi & Viri sacculum literâ A. signatum & collo appensum gestent, & naribus adhibeant. Fæminæ verò & Virgines sacculum B. litera insignitum secum habeant.

Deinde utriusque sexus homines ite. tam fæminæ, quàm mares Scuta Cordialia indusiis prope cor sub sinistri lateris mamillæ inferiore parte assuant; aut tegumento pectorali annectant, idque interdium & noctu. Quæ scuta tamen aut sacculi interbassati & ex sindone confecti vel sericeo rubro variandi sunt pro ætatis diversitate. Nempe pro adultis primo, deinde sedecennibus decennibus quinquennibus trimulis, aut bimulis. Id quod benè Caudo Medico & iis, qui circa ægros versantur, observantum erit.

Tertiò Linimentum est præscriptum sub litera D. cujus quantitas erit instar pisi aut ciceris, quo nares illinantur & aurium meatus, antequam quis domo exeat.

Quartò ordinatæ sunt rotulæ sublinguales aut orales; sub litera E. quarum una semel sensim liquefieri in ore aut lingua debet & sic sensim delingi. Id quod prodest contra aërem in propinquo infectum.

Hæ rotulæ autem mulieribus non prosunt, cum moscho sint imbutæ; pro quibus substituuntur aliæ sine moscho, aut ambra aut zibetho, quibus uti ipsæ in eodem contagionis periculo possunt.

Aliàs alternatim matronæ exiccatos citriorum cortices aceto aut vino puro maceratos masticare queunt loco dictarum rotularum in ore liquecentium.

Sextò aër corrigendus est suffimigiis, qualia præscripta sunt, sub signo F. de eorum itaque portio injiciatur prunis *ἀκαιοῖς* & siccis, nulloque fumum aut fætorem emittentibus, idque quater fiat in locis suspectis aut nondum infectis manè, ante prandium, & cœnam, deumque vespere. Ne verò pestis contagium, si fortè aliquem infecterit, diu aut tam cito hæreret, nedum radices agere queat, ecce maribus sub S. G. singulo mane dimidium morsulorum erit absumendum, sicut dimidii reliquam hora 3. à meridie. Postero die & sequente alternatim rotulæ usurpandæ sunt tres vel quatuor, mane sc. & vespere sed ita; ut si hodiè morsulis usi fuerint, cras rotulis H. perendie ro-

tuli

tulis l. fruantur. Fæminæ v. solas rotulas jam diætas usurpent. Pueris verò solùm exhibentur rotulæ unæ vel duæ, præsertim de Zedeoria H.

PRO DOMESTICIS ET PAUBERIBUS.

Conclavia, quæ hi inhabitant, aut loca, ubi versantur, quater quotidie suffitum experiantur, mane, ante prandium & coenam, & post pocenium, suffimigium autem præparatum sit ex talibus quæ vel singulatim, vel conjunctim, si haberi possint, incendantur; sc. ex origano, lauri baccis aut foliis, absinthio, quernis foliis, juniperi baccis aut ramis, seu cremiis, lavendula, Ruta, betonica sylvestri, succino, mastiche, thure; apprimè commendatur pro suffitu: si vitrioli ℥iij. in semisextario vini boni contriti sumantur & infundantur in laterem ignitum, & vapor conclave, ubi ægri jacent, pervadat & imbuat, adeoque aëris malignitatem corrigat. Quod si æger inibi peste infectus fuerit demortuus, ne contagium delitescat, & ita ulterius serpat, aliosque ingressos inficiat, calce nova parietes inducendi sunt, ut ita venenosæ pestis fomes absorbeatur.

Porro singulis horis matutinis antequam quis domo, pedem efferrat, radix Angelicæ, Dictamni veri, valerianæ seu phumajoris, Levistici Helenii, Magistrantiæ & Chamophyllatæ radices aceto vini per noctem maceratas habeat, quarum portio ore assumenda & mastiganda erit Rutæ, melissæ, nigellæ Levistici aut Magistrantiæ radices vino imbutæ & nodulo insutæ pro odoramento esse possunt.

Tertio, valde profunt; Pimpinellæ, Dictamni, Magistrantiæ & Angelicæ, radices singulatim pulverisatæ, quarum pulveris manè tantum butyro & panè comedendum est, quantum uno grosso seu solido contineri potest. Pro merenda mulierculæ & ancillæ valerianæ, Levistici & Zedoariæ radicem, vel Enulæ campanæ tenuissimæ tritam eadem dosi accipiant, sed ita ut alternatim radicib. pulverisatis utantur; & hodie hac, cras alia, & sic consequenter fruantur.

QUOMODO PESTE INFECTI SE GERERE DEBEANT.

Si quis justa ex DEI ira ob peccata admittenda contagiosa peste imbuetur, ille post preces primò & seriò ad Deum non tam scelerum vinclicem, quàm patrem benignum & vitæ largitorem effusas & quotidie singulis momentis iteratas, auxilia legitima & à pio bonoque Medico præscripta negligere non debet, quod si fecerit, parùm aberit, quin
DEU

DEUS omnipotens & fidus gratiam favorem & benedictionem medicamentis & alimentis sit largiturus. Inprimis autem certa signa adsint oportet, è quibus ægro innotescet, se revera jam pestifera lue infectum esse, id quod deprehendet; 1. ex inopinata & subitanea omnium virium in corpore prostratione, item ex dolore artuum ostocopo; in quo talis sensus, qualis in iis, quibus brachia & pedes malleis, fustibus aut rota sunt contusi, unde langvor & imbecillitas tanta sequitur, ut nec stare, nec incedere, ne dum officio consveto fungi possint; sed decumbere & quiescere gestiunt & ad lectum nolentes, volentes pergunt. Quod si igitur tale quid simul ac quis persentiscat aut subodoretur citò occurrat, nec differat: Nam.

Principiis obsta, serò Medicina paratur.

Cum pestiferum illud venenum non inducias det; sed & illicò petat, ita ut unicus horæ quadrans in hoc acutissimo & lethalissimo morbo neglectus plus obsit, quàm in aliis morbis aliquot dies. Ideoque non tam diu cesset, aut cunctetur, donec capitis dolorem, frigus, horrorem, aut calorem persentiat, angorem item circa pectus & deliquia crebra animi advertat, atque ad vomitum irritetur, Hæc enim symptomata, unde morbus pestilens liquidò innotescit, arguunt certò, jam ægrum peste infectum esse & venenum illud contagiosum sanguinis massam & omnes corporis partes artusque perrepsissa & inquinasse. Quamprimum itaque langvorem & lassitudinem talem percipit, & lecto decumbere cogitur, ex officinâ sibi afferri curet, sudorificam aquam sub litera K. quæ aliquantò preciosior, aut aliam viliores sub litera M. in tribus distinctis fictilibus infusam, quorum unum calefactum illico exhauriat, & lecto contactus sudet quantum potest, ad horam 1. aut alteram, quod si haustum evomat, alterum fictile aqua sudorifica plenum fervefactum exhauriat, vel etiam tertium: quod si secum retinuerit & probè desudaverit, adeoque bubo efflorescat, aut anthrax, febrisque simul invadat, quod Medico dignoscendum relinquitur, & plerunque ex rigore & horrore deprehenditur; venam secari jubeat à barbitonsore, conveniet hæc parti, in qua bubo est ortus, id quod à Medico Chirurgis significandum erit; & quantum sanguinis detrahendum: sine qua conditione si sit, venæsection prohibetur; Quod si itaque venæsectio sit absoluta, aqua cordialis ægro sub signo N. est præscripta infictili, quæ benè circumagi debet, ut turbida fiat, & inde 4. cochlearia communia ebibat, & inde fortem haustum de aqua card. bened. superbibat; Quæ aqua cor mirè corroborat, quapropter interdum & noctu

& noctu sæpius, & singulis horis eam benè confusam & turbatam usurpet; & iterum haustum bonum aquæ card. benedi. aut scordii, aut scabiosæ superbibat; sin a. ardor vehemens superveniant & sitis, usurpet aquam acetosæ, acetosellæ, Borruginis, scordii, aut flor. Nymphæ alb. sed aqua cardui benedi. præcellentissima est. Quia v. aqua cordialis N. charior est, pauperibus alia præstat viliori precio sub signo O, qua uti possint. Quod si venæsectione non sit opus, illicò confugiant infecti ad usum aquæ Cordialis. Dum itaque sudor primus abiit, & venæsectio, si opus, facta & aqua cordialis hausta fuit, cibandus est æger alimentis corroborantibus ut jusculis galli. carnis bubulæ, it. pulmenticulade ptisanæ cremore cum emulsione amygd. dulcium, de similis albis, quib. inspergatur codimenti loco pulv. cordialis, pro cibo adhibeant tenuam bubulam carnem, vervecinam, vitulinam, itemque aviculas, apprimè alaudas; quod si carnes fastidiat, patiens, aviculæ & carnes aliæ assæ contundantur, contusis jusculum gall. aut de carne bubulo leniter affundatur & succus reprimatur & misceatur cum succo citri, granator aut limovum, aut cum rob. de herb. sal. rib. ut astringitatem acquirat, & ita propinetur. Talia enim juscula mire confortant vires hominis: quia sunt ἀπενεργὰ concoctu facilia, nec multa alteratione indigent; sed facilè in naturam spirituum & corporis nutriendi substantiam convertitur, ut Hipp. habet aph. ῥᾶον πλεονεξέει ποτε, ἢ σίτου; & ita etiam ægri vires facilius conficiuntur: Carnes & aviculæ decoqui possunt frustis citri aut limonum in orbiculos defectis aut uvis acerbis additis, & notandum omnia edulia debere esse acidiuscula: affundatur item cibus succus citoniorum aut vinum citonites imo succus eorundem pro potu in siti exhiberi potest aut cum citoniis in frusta dissectis carnes decoquantur.

Patientes debent esse abstemii & invinii: utantur verò cerevisia proba & antiquiore, item succo de citoniis, qui peculiariter veneno contagioso resipit, vel aquis scordii, cardui benedi. acetosæ, & scabiosæ, & in ardore vehementissimo, aquis de floribus nymph. alb. cucumeris, aut Endiviæ, quibus admiscentur ob acredinem succus de granat. & berber. succo aceros. citri, videndum tamen ne plus justo admisceatur, ne nausea oboriatur; sed gratia concilietur & palato ægri consulatur. Quod sit ita cibatus prima vice fuit æger, jejunium toleret, tries horas, interim crebrò usurpet & exorbiat aquas cordiales sub signis N. & O. & haustum superbibat de aqua cardui benedi. aut aliarum supra commemoratarum. Et hæc est primus dīctandi modus.

Secundò, elapsis tribus horis post jejunium, alterum fictile aquis sudoriferis plenum ebibat, & sudet in lectu sesqui horam, inde aliquid de cibo supra præscripto sumat, & aquas cordiales frequentet.

Tertiò iterum horis trib. elapsis tertium, fictile propinetur, ut tot horas sudet, quot ante, id quod in initio faciendum est quàm diligentissimè, ut intra 9. vel 10. horas ter desudet: Quia enim malignitas veneni pestilentis nimis vehemens est & in corde radices ferè egit, vix fieri potest, ut una vicè tolli & expelli possit, à corde. Licet enim quandoque post usum rectum aquarum sudorificarum semel adhibitum appareat, q. nihil mali subesset, delitescit tamen fomes velut sub cineribus consopitus; & ocyus exardescit velut scintillæ antequam in flammam abeant; neque hic securitas est ulla, ita ut posteriora pejora fiant priorib. Ideoque provocandus est sudor hydroticis aquis, & cor confirmandum aquis cordialibus quo pestilens venenum planè extingvatur, quem in finem & ad carpos & cordis regionem sacculi & fomenta sunt ordinata sub. Z. & aqua pro pulsu ad arteriis ventilandas & recreandos spiritus vitales X. & V. qua imbuantur lintheamina & carpis obducantur. Nodulus item odoratus A. A. sæpe in aqua odorata imbutus adhibeatur naribus crebrò: pro corde a. sub sinistrâ papillâ unguentum seu linimentum confectum est BB. pro ditioribus sicut CC. pro tenuioris fortunæ hominibus quod illinatut sæpe. Et licet sufficiens videatur aqua sudorifica ter usurpata in 9. aut 10. horis: non tamen negligentem aut securum hic esse debet; sed pergendum est & propinandum aquæ dictæ sudorificæ in uno fictili dimidium altero die, manè, & sudandum inde per horam aut ultra, & demum tertiam partem, donec meliusculè se habere deprehendatur: & vires manifestò redeant resectæ, roburque corporis instauretur; Sin verò nimis charæ pauperibus sint aquæ dictæ sudorificæ, pulverem habet alxipharmacum, L. cujus justa dosis cum aquis appropriatis ipsis dispensari tolerabili precio debet; idque eo modo, ut aquas adhibebunt, & si primo evomuerint, secundo & tertio alias doses vel inviti assumant; inde vero dimidium pulveris & demum tertiam partem ebibant, donec convalescere se sentiant. Porro plebeculæ infimæ, ut & gravioribus personis, nisi delicatæ nimis sint, præparate I. pharmacum de cantharidibus & fermento, uti notum chirurgis, quod arteriis anterioribus alligatum, & supra malleolos in crura aut tibia alligatum, mirè subtrahit venenum contagiosum à corde.

Sin alicui, quod optandum, proba terra figillata, bolus armenus verus, aut terra figillata Silesiaca strigensis ad manus foret, harum zjj con-

contritas in ꝑxij aquæ cardui benedicti dissolvat, & benè permisceat, ut turbida potio fieret, & cochlearia 4 communia ebiberet, loco aquæ Cordialis, superbiberetque aquæ cardui benedicti aut scordii aut scabiosæ bonum haustum, non malè suæ valetudini faciet. Vinum inprimis citonites apprimè laudatur, seu succus expressus ex citoniis recentibus aut decoctum citoniorum frigidum quo uti possunt pauperes loco aquarum stillatitiarum & cordialium. Nec improbaremus hic loram seu sapam citoniorum, aqua affusa & expressa per linteolos è citoniis confusis, ut è pyris sylvestribus pro potu, si benè deferbuisset aut despumasset, quia hoc potu nihil gratius aut miseris ægris salubrius, præsertim in tanto æstu & siti, quin & ad venenositatem luis, corrigendam & inhibendam rabiem excogitari possit. Quin & aqua ardens seu vitæ aut elixir de citoniis si cui suppetat, ille cochlear unum pro viribus recreantis usurpet, & aliis aquis appropriadis & supra notatis admisceat; nec dubium, quin refrigerium & virium instaurationem sit exinde percepturus. Præterea quoque destillata caponum cum herbis & floribus variis & radicib. quæ contagiosæ pesti, ardori, alvi profluvio, vomitui, syncope, & hæmorrhagiæ resistunt, & vires conservant, non sunt celenda: sed sæpè propinanda. Bubones, quod attinet, pustulas & febres Medicus juxtà cum chirurgo sanabit, ut symptomata. Quæ singula si hic perconsidere voluerimus, integrum volumen nobis esset complendum. Præcipua tamen prætereunda non sunt: sed advertenda & avertenda, quantum fieri potest, citissimè & tutissimè, ne vires alias languidæ prorsus prosternantur & ita venenatæ & pestiferæ lui ansa ulterius progrediendi & grassandi præbeatur.

Symptomatum primum.

EST OBSTRUCTIO ET DURITIES ALVI.

QUæ si adsit, opus est clystere leni & emolliente ex ptisana ac jusculo avenacæ pultriculæ cum paucis uvis passulis & oleo rosaceo aut violaceo; quod si hæc juscula desint, decoquitur clyisma ex herb. acetos. meliss. fol. nymph. viol. mart. lactuc. & borrag. Item de pulp. cucurb. confit. clyster cum præd. suprâ oleis, aut postuletur ex officina clyisma leniens sub numero V. Aliàs alia purgantia in initio medicina clyisma leniens sub numero V. Aliàs alia purgantia in initio medicamentis cautè sunt exhibenda, cum iis periculosum alvi profluvium excitari possit; & benè notandum, ægro nihil boni consuli aut inde evenire solet, si statim in principio purgetur; Quia enim purgantibus medicamentis certum tempus est relinquendum, donec vires suas exerant.

ferant & in actum erumpant, submeruendum non interim, ne venenum ad cor properet & illud opinione celerius invadat, quod quidem non purgantib. sed sudorificis & alexipharmacis potionibus est discutiendum & à corde fugandum. Sin a. simul æger probè desudaverit & necessitas requirat alvi solutionem, clyster adhiberi potest ante unam horam, donec demum secundò iterum desudet. Purgationem v. hîc nec natura morbi nec ars svadent. Quidquid etiam alii Medici expertissimi scribant, illud eventus docebit, quod sc. alexipharmaca nimis serò exhibeantur, si à purgantib. auspicari velimus: ut tamen necessitas alvi obstructæ urgeat, & purgantia requirat, possint ea propinari post 13 aut 14. horas, usurpatis jam debito modo sudorificis aquis, id quod benè providendum erit iis, qui ægrorum ut adstantes curam gerunt; In purgatione n. respiciendum est ad super fluitatem humoris educendi, ne unus pro altero educatur, & sic ægro plus obsumus, molestiamque majorem exhibeamus, quam levamentum.

Secundum Symptoma.

ALVI PROFLUVIUM.

QUod priori est oppositum. Quia contraria juxtà se posita magis elucescunt; quod si superveniat, nec tamen æger inde alleviationem sentiat ullam (ubi cita alvi cohibitione opus est) sin a. inde vires roborari sentiat; alvus sistenda non est, sed naturæ, quo vergit, cursus relinquendus etiamsi alvus vigesies deponatur aut exoneretur (modo non planè robur naturæ collabascit;) simulque malignitas materiæ evehatur: tunc tempus est eluendi ventriculum & intestina hac potiuncula. Decoquatur ptisana, & prima aqua effundatur, deindeque nova affundatur, & decoquatur, donec fiat q. jusculum; cujus dosis est, quantum phiala contineri potest, cum duobus cochleariis communibus succi ros. arid. quod una vice exhauriendum est, & post 4. horas repetendum. Sin displicuerit succus de rosis, aut defuerit, ille m. f. ros. rub. incarnat. aut albarum siccarum, sumat & cum jusculo ptisanæ ebulli re sinat, & transeolet, aut fortiter exprimat liquorum & ita ebibat. Similiter & ex antiqua rosarum conserva & aqua hordei potiuncula præparari potest. Sed prius melius est, cum non tam dulce sit (Nam hîc dulcia non adeò conveniunt,) Dum itaque bis potiuncula hæc adhibita fuit, post tres horas ægro alia est concinnanda tam confortans, quàm alvum fluentem sistens.

Recip. *Aq. plantag.* ℥v

Terra sigill. Strigens. ʒj

*aut bolis armen. aut terra sigill. vera
Corall. rub.*

Exacte pulverifat. 3ß probè commisceantur : & propinetur ægro una vice tepidè aut calidè. Post 4. horas iteranda est potio : nisi quid me fefellerit, aut æger non rectè se gesserit affirmare ausim, hac tamen cum exceptione, quod non dum venenum vicerit, id expulsum iri per sudorem, & alterum futurum durum : quod si fluxus non cessit, tertio usurpet, sin nec sic, pulvere utatur sub signo P. cujus dosi 3j cum aqu. plantag. in mortario probe contriti & comisti, adhibeat vero & ebibat calidè

Cautela tamen hæc observanda, ne nimis citò alvi fluor sistatur : & si reliquæ sint malignæ humorum superfluitates in corpore, quæ sine periculo cohibui & sisti nec debent nec possunt ; Medicus postquam æger de ipsius consilio potionem de ptisana usurparit, simulque tamen videt certum humorem, qui initio apparuit, etiamnum fluere, præscribat potionem ex myrobalanis sub Q. signatam, & illam propinabit post tres horas, ante quam ptisana fuerit usus ; & demum dabit potiunculam de terra sigillata Silesiaca ; ut supra monitum fuit, aut pulverem sub litera P. Nolo hic admonere, quod in potionibus & aliis exhibendis chalybs sit extinguendus.

Apud nonnullos autem, ut audio, ocysimè alvi profluvium oritur, quo vires ita prosternuntur, ut q. semimortui decumbant. Quia vero exinde colligi potest, sanguinis totam massam, uti id urinæ turbidæ & valde rubræ indicant, peste contagiosa esse infectam, saniores Medici mecum juxta considerent, an non opus hîc sit venæsectione, & post ter usurpatas sudorificas aquas, potiuncula purgante ex Myrobalanis postero die, dum malignitas materiæ per alvi profluvium fuiteducta ; sicut & aliis suprâ dictis pharmacis.

Tertium Symptoma.

VOMITUS VEHEMENS ET RUCTUS VENTRICULI.

Si humerosa vel vaporosa materiæ pestiferæ malignitas quandoque in ipso ventriculo, aut locis vicinis & circumjacentibus pessimas superfluitates attigit & infecit, ecce vomitus statim excitatur, qui promovendus & provocandus erit medicamentis in eam rem aptis, quo materia universa revomi possit ; Cujus signum 1. si æger à vomitu alleviationem sentiat ; Ideoque vomitivum ex officina petat sub litera V. Imò

nec dissuaderem, si vomitus ventriculum à materia molestante liberabit, ipsi porrigendum esse antimonium præparatum: sic n. Matiholus de hoc in Dioscoridem accipiendus, qui id valde in peste comendat; sin verò contrà à vomitu pejus se habeat & debilior fiat, æger, cohibendus est vomitus citò, ut alvi fluxus, nè vires naturæ magis debilitentur, & appetitus planè prosternatur & aboleatur. Cui malo obest frustum de latere Cocto novo calefactum aut candens, cui affundatur acetum de mentha crispa, quam quilibet patrumfamilias, sicut & acetum zedariæ, cariophyllæ, & rutæ in promptu & parato habere debet. Ut fervor extingvatur & involvatur panno linteo calido frustum binum, quorum unum ad os ensiforme, alterum ex opposito in regione dorsi applicetur: quod si æger facere aut experiri nolit, cucurbitulam magnam affigi curet ad ventriculi regionem aut ollam minorem, Prodest etiam huic rei aqua Cordialis cum corallis præparata: Item terra sigillata Strigensis, aut Bolus armenus, apprimè tamen plurimum conferunt coralli & terra sigillata Silesiaca, si cum rob. berb. aut ribium, item succo cytoniorum aut granatorum mista delingantur. Dosis succ. est ʒj, vel seorsim vel conjunctim, cui admiscetur ʒj de pulvere, aut terris: sufficit pro una dosi quantitas minoris castanæ: sed crebrò. Quod si eructationes & flatus accedant frequentiores è ventriculo, addi debent ad ʒj cordialis pulveris, aut terrarum suprâ sæpè commemoratarum s. gr. granorum Paradisi, quæ peculiarem vim hic habent. Ructus autem isti partim exurgunt à flaubus & pestiferis vaporibus in ventriculo collectis & detentis, partim ex interna inflammatione viscerum adiacentium; ideoque tempestivè occurrendum est huic malo, quia non multò post singultus insequitur. Quod si itaque à vaporibus pestiferis, aut ardore circumjacentium viscerum ructus oriantur, ægro præbeatur succus de de fruct. cynosbatos inspiss. cum ipso fructu, vel sensim vel mistus cum miva cytoniorum aut succo granatorum: sin à fuliginibus malignis, exhibeatur eidem succus de mentha crispa, cum terra sigillata Silesiaca, aut aliis id genus med. aut præp. corallis & iterum lates igniti aceto adpersi adhibeantur. Nec rejiciuntur fomenta & ungenta pro ventriculo, præsertim sacculi stomachales roborantes & adstringentes.

Quartum Symptoma.

EST LASSITUDO *ὁ στὸκοπος* **ET LANGVOR VIRIUM TOTIUS CORPORIS.**

QUæ duo non nisi à pestiferis vaporibus & fumis prodeunt insinuantibus se in inconspicuos nervorum & membranarum nervacearum

rum

um poros, sicut fumus oculos morficare & penetrare solet,) & eos eudentibus rodentib. rumpentibus. Unde tanta inquietudo miseris egriis acceritur, ut ubi placidè quiescat, non habeat: sed instigationibus variis per lectum distorquetur, & hinc inde devolvitur, modo ubi pedes ibi caput jacer, brachia capiti jam supponit, jam pedes attrahit, pro qua inquietudine oleum paratum est K quo inungatur spina dorsa, & crura & alii artus, ubi istæ distentiones & dolores percipiuntur maximè, & quidem interdum aliquoties id fiat calidè.

Quia verò hi vapores & fumi nimis subtiles sunt & citò poenetrant, incrassandi sunt & sensim absorbendi: NB. ne tam citò omnes artus pervolitent & dilatent; unde commendatur maximè, (id quod semel pro semper dictum esto) terræ sigillatæ optimæ & polus armenus verus, quam Galenus nunquam non satis laudare potuit, ʒj cum aqua cardui benedicti, quæ magis penetrat, eaque potio sæpius una die iteranda erit.

Quintum Symptoma.

EST CEPHALALGIA.

QUæ longè vehementior est, si febris putrida adsit pesti adjuncta quàm si pestis sit sola absque febre tali, ut experientia id diu comprobavit: Quod si igitur ingens capitis dolor cum peste urgeat; dicere auserim ferè, immediatè febrem synochum putridam, aut ardentem, vel ad minimum tertianam continuam cum peste conjunctam esse, sed de hac re alio loco & tempore. In hoc casu advertendum est an pene aures parotides appareant, natura malignam materiam eo loci protrudente; quæ si conspiciantur, linteamina circa frontem & caput (prius tamen administrata venæsectione) ita applicari debent, ne parotides attingantur, Fasciæ v. ita concinnari debent. Rec. amygd. amar. aut nucl. perfic. qui magis proficui quibusdam habentur, & quantum volueris; qui cum aquæ solani & flor. sambuci pari portione conterantur & q per emulsionem extrahantur: in qua cum lacte linteamina imbuantur & ita capiti circumligantur, sed tepidè, aut ex utrisque q. pulticula fiat cum dictis aquis & fiat q. cataplasma. Id quod conducibile esse ægris sum expertus: glorientur alii de aliis. Lotio pedum cum suo vapore & calore venenositatem pestiferam magis irriter & velut animet, nec ex capite aliquid subtrahere queat, penitus ab ea erit abstinendum.

*Sextum Symptoma.***VIGILIA NIMIA ET INSOMNIA,** *disomnia*

Qui provenit ex febrili & pestilenti ardore : unde unguentum somniferum præscriptum est in officinis bona copiâ in hoc casu, aut usurpari potest illud quod sub literâ T. est insignitum : quo illini debent tempora, carpi manuum, volæ manuum & plantæ crurum, ut & genu. Quin imò & Emplastrum confert, ex rad. althææ cotusæ, parte una, & tertia parte pap. alb. cum lacte papav. quod & aqua solani præparatum est. Illud fronti applicetur : Syncipiti v. aut vertici idem imponi debere mihi non placet ; sed periculosum & noxium videtur. Quia vapores & fumi è futuris maximè exhalantes ob frigus pharmaci repelluntur, cerebrumque magis lædunt & turbant.

*Septimum Symptoma.***EST DELIRIUM.**

Quod si calor nimius pestilens & febrilis caput inquietudine & vigiliis ita debilitavit, ut homo desipere incipiat, æger curandus est, ut in aliis febribus ardentib. fieri solet ; valde verò periculosum est hoc symptoma : Quod si n. delirium à pestilentibus vaporibus & fumis in cerebro natis aut illuc de latis promanat, metù & periculo extimò res non vacat, ut quilibet per se intelligere potest ; Sin autem à febre ardenti cum peste complicata emergat, tantum periculi non subest ; manente tamen eo, quod omnia Symptomata talia graviora longè sint, quàm in simplici peste, Medicamenta igitur hic adhibentur eadem quæ in phrenitide, nisi quod hic appropriata ad venenositatem misceantur.

*Octavum Symptoma.***FAUCIUM INFLAMMATIO ET PLEURITIS.**

Fauces inflammatas & anginas internas Chirurgi experti probè curare norunt ; Pleuritidi autem occurritur potiuncula.

Rec. ʒij Olei amygd. dulc. ℥j pulveris. dent. apri, aut unicornu 20.
grana cardui Mariæ quibus superfundantur 4. cochl. aq.
cardui benedicti,

quæ cum probe inter se comista patienti potanda una vice exhibentur.

*Nonum Symptoma.***STILLICIDIUM SANGUINIS NARIUM.**

ID quod accidit, si febres synochi putridæ pesti adhæreant implicatæ, ubi & maculæ seu petechiæ frequentiores & luculentiores sunt ; quam si

fin

sine his pestis sola grassatur. Ubi eadem curandi methodus, & in vomitu. Si post sanguinis fluxum è naribus levamen aliquod in capite sentiat æger; & etiam reliquo corpore se melius habeat; benè est, & fluxui viam permittat, non tamen continuam, præsertim si vires labasci sentiat: Hic enim sistendus est sanguis, (qui spirituum vehiculum est,) sive in initio fiat, sive post sudorem finitum. Ad quod confert, pulvis P. cujus & supra mentio facta est. Item Terræ Turcicæ, aut Pauli, ʒij ex aqua plantag. haustæ. Nec non terra sigill. bolus arm. & terra sigil. Silesiaca, Extus ad nares adhibentur acetum, in quo dissolutum sit Opii Theb gran. unum aut alterum: Item adhibeatur acetum rosaceum frigidum, & circa frontem adhibetur emplastrum de calce aut gypso, succo agrestæ & lacte pap. alb. Quod si hæmorrhagiarum plenè fisti non possit, Theriacæ venetissimæ ʒj. assumi jubetur, aut Laudanum Theophrasti, si in promptu sit; cujus dosis gran. iij aut 20. cum paucis rob. rib. aut berb.

Et hoc est consilium, quod ad grassantem jam pestem in patriæ, Reipubl. civium commodum, quantum experientia observare potui, dedi, illudque publicè publicæ utilitatis causa editum volui; nec dubito, quin si ista remedia fideliter & dextrè adhibeantur, & consilio isto meo locus fuerit relictus, DEUS Pater misericordiæ pestem sit depulsurus & pharmaca benedicturus, Quod ut idem faciat, eundem juxta cum omnibus piis & firmiter in ipsius Filium nostrum Mediatorem & intercessorem credentibus seriò & humiliter oro.

Sequuntur medicamenta.

Recip. Flor. lavendula ʒij

Ros. Rubear. ʒjss

Majorana

Serpilli ā. ʒss

Violarum ʒi

Stæchad. Arab.

Spice nardi

Basilicon.

Cort. citri ā. ʒss

Schœnanth.

Macis ā. ʒij

Santal. omnium ā. ʒjss

Campora ʒjss

Herb. mentha

Mmm

Pule-

Pulegii

Ruthæ ā. Mß

Cyper. rot. ʒß

Ocym. ʒiij

Moschi gr. viij

Fiant noduli Odorati.

S. Püschel A.

*Recip. Spet. iam præscriptar.
sine moscho.*

F. noduli pond. ʒiijs

S. Püschel B.

Recip. Arsenici albi ʒß

Auripigmenti ʒij

Camphora ʒx

Euphorbii ʒiij

Croci ʒi

Diptami alb. ʒjs

*Cum aq. rosar. & gum. Tragag. F. pasta ex qua formentur Trocisci
ad formam communem.*

Recip. Rad. Ostrutii

Angelica

Mex ā. q. s.

*F. Pulvis, cui incorporentur Trocisci præscripti & ligentur in dupli-
ci sacculo.*

S. Herkfüchlein C.

Recip. Extracti Angelica

Ruthæ ā. ʒiij

Ol. Angelica

Citri ā. ʒij

Mis. s. liniment.

S. Nasensalblein D.

Recip. Cort. citri

Rad. Ireos ā. ʒjs

Zedo ir.

Angelica ā. ʒiij

Lig. aloes

Macis ā. ʒj

Rosar. rub. ʒij

Mithridati ʒij
 Sacchari alb. ʒis
 Moschi gr. xvj
 Cam mucilag. Tragag.
 f. Troisci sublinguales.

S. Mundfuchlein E.

Recip. Baccar. Iuniperi lbj
 Lauri ʒiiij
 Thuris ʒij
 Thymiana ʒij
 Ladani
 Storacis calamit. ā. ʒij
 Assæ dulcis ʒß
 Fol. Lauri
 Ligni Guaiaci ā. ʒiijs
 Myrrha
 Aloes comm. ā. ʒij
 Majorana Mij
 Mis. f. pulvis grosso modo.

S. Rauchpulver F.

Recip. Boli orientalis in aq. scabios. præp. ʒj
 Succini albi præp. ʒß
 Cornu cervi usti præp. ʒijs
 Off. de corde cervi n. LX.
 Macis
 Spet. liberantis ā. ʒij
 Sem. Citri
 Card. bened. ā. ʒiiij
 Corall. rub.
 Margarit. præp.
 Hyacinth. præp. ā. ʒij
 Conser. rosar.
 Borræg. ā. ʒv
 Fol. auri n. X.

Sacchari in aq. Cinamom. & rosar. dissol. lbj
 F. Confect. in Morsulis.

S. Morsellen G.

Mmm 2

Recip.

Recip. Extract. Zedoar. ʒj

Essent. margarit.

Corall. rub. ā. ʒss

Ol. cinamomi gt. ij

Sacch. alb. soluti in aq. Card. bened. ℥j

F. Confect. in rotulis.

S. Röchlein H.

Recip. Extract. angelica ʒij

Elenii ʒj

Terra sigill. files.

Boli ex Toccaya ā. ʒij

Corall. rub. prep. ʒss

Ol. faenic. gt. ij

Sacch. albiss. soluti in aq. angelica ℥j

F. Conf. in rotul.

S. Röchlein I.

Recip. Rad. angelica

Tormentill.

Morsus diaboli

Petasitidis ā. ʒvj

Rad. & herb. pentaphyll. Mss

Fol. scordii

Cardui bened. ā. Mss

Fumaria Mj

Calendula

Scabiosa ā. Mss

Borrag.

Buglossa ā. Mjs

Acetosa Mj

Sem. citri excort. ʒss

Croci oriental. ʒij

Conser. acetosa ℥ss

Theriaca Veteris ʒvj

Incid. & contund. herba & radices add. salis Mjs.

Postea affund. aq. Card. bened.

Scabiosa ā. ℥ijs

Acetosa ℥j

Aceti acerrimi ℥ijs

Stent per noctem in loco calido in infusione, manè fiat destillatio per cineres, in qua infund. in nodulo.

Zedoaria ℥iij

Camphora ℥ij

Croci oriental. ℥j

F. Aqua Theriacalis.

S. Schweißwasser K.

Recip. Terra sigillata vera

Boli armeni

Cornu cervi usti

Margarit. præp. ā. ℥iiij

Rad. diptami albi

Tormentilla

Zedoaria ā. 3js

Sem. acetosa

Citri ā. ℥j

Camphora ℥ij

Antimon. diaphoret. ℥j

Mis. F. Pulvis Bezoarticus.

S. Gifftpulver L.

Recip. Scordii pul. 3j

Card. bened. pul. 3ß

Terra sigill. filis. 3ijs

Cornu cervi usti 3js

Nuc. vomica. ℥iiij

Salis absynth.

Card. bened.

Angelica ā. ℥ij

Antimon. diaphoret. 3ß

Aq. Card. bened.

Scabios. ā. ℥ij

Aceti lilior. convall. 3iij

Theriaca Andromachi 3ijs

Mis.

S. Schweißwasser M.

Recip. Margarit. præp. 3j

Corall. rub. præp. 3vj

Succini albi præp. 3ij

Mmm 3.

Lig.

Ligni aloes ʒjs

4. Lapid. preciosor. præp. ʒij

Lap. Bezoart. orient. gr. xv

Off. de corde cervi n. x.

Fol. auri n. iiij

Pulv. subtiliss. cujus drachma una misceatur cum aq. Card. bened. ʒvj

S. Herkswasser N.

Recip. Cornu cervi usti ʒiij

Off. de cord. cervi n. vj

Santal. citrini ʒiij

Corall. rub. præp. ʒj

Mis. f. pul. subtiliss.

Cujus etiam ʒj Misc. cum ʒv. vel vj. aq. Card. bened. & acetosa.

S. Herkswasser O.

Recip. Flor. rosar. rub. Mjs

Borrag.

Nymphaea

Buglossa

Violarum a. Mß

Anthos piij

Melissa Mß

Santal. citrini odorat. ʒijs

Ligni aloes ʒj

Cort. citri pulveris. ʒij

Ex omnibus minutissime contusis.

Fiant sacculi parvi pro pulsibus & Corde forma decenti.

S. Herk und Puls - Säcklein Z.

Recip. Aq. rosarum

Card. bened. ʒv

Nymphaea ʒj

Spec. rosar. ʒij

Spec. cordial. temperat. ʒijs

Santal. odorati ʒj

Aceti vini ʒjs

Vini malvati. i ʒj

Mis. f. Epithema.

S. Pulswasser X.

Recip.

Recip. Aq. Borriginis

Melissa

Rosarum ā. ℥iiij

Santali citrini ℥ss

Spec. eordial. ℥ij

Aceti Iuniperini

Rosacei ā. ℥js

Mis. F. Epithema.

S. Pulßwasser T.

Recip. Flor. Rosar. rub. Mj

Violarum

Nymphaea

Anthos ā. Mß

Santali citrini pulv. ℥ij

Zedoaria ℥j

Macis ℥ß

Mis. F. pulvis, & fiant noduli, qui immergantur aq. ros. odoratissima & nonnullis admisceatur Aqua ex santalis & S.

Rauchpüschel AA.

Recip. Balsami ex citro ℥js

Unguenti rosati mesuei ℥j

Theriaca Venet. ℥j

Ol. succini gt. iij

Mis. f. linimentum.

S. Herbsälblein BB.

Recip. Ung. Ros. Mes. ℥j

Theriaca opt. ℥j

Extract. zedoar. ℥ß

Mis.

S. Herbsalbe CC.

Recip. Herb. Malva

Endivia

Borrag.

Acetosa ā. Mjs

Rad. petasid. ℥ß

Coq. in s. q. aq. pro ℥bj

In Colat. dissol.

Elect. lenitivi

Dia-

Diacathol. ā. ʒß
Mell. violacei ʒiij
Ol. rosac. ʒß
Mis. f. Enema.
s. Clystier V.
Recip. Sang. Draconis
Lsp. Hematit.
Corall. rub. præp.
Sem. portulacæ ā. ʒj
Margarit. præp. ʒiiij
Balaustior. ʒij
Boli Armeni veri vel Tocajani ʒij
Mis. F. Pulvis.
s. Pulver P.
Recip. Myrobal. Citri ʒs
Passular. ʒiij
Sem. acetosa ʒj
Coq. in s. q. aq. plantaginis pro ʒiiij
In quibus dissol.
Rhabarbari electi
Pulveris. ʒj
Syr. ex rosis siccis ʒvj
Mis. f. haustus.
s. Träncklein Q.
Recip. Iuris raphani cocti ʒiiij
Ol. commun. ʒjs
Syr. acetos. ʒß

Mis.
s. Brechträncklein s.
Vel sic fiat.
Recip. Aq. Card. bened. ʒiijss
Vitri Antimon. gr. ij
Syr. acetos. simpl. ʒvj
F. Infus. per noctem.
s. Brechträncklein s.
Recip. Ol. Chamomel.
Amygdalar. dul.
Scorpion. ā. ʒj.
Nitri pulverisati ʒiij
Aq. flor. sambuci ʒiij
Decoq. ad consumt. aquositatis &
Dehl R. (fig.)
Recip. Ungt. populeon. ʒs
Ol. violar.
Nymphaea
Mandragor. ā. ʒij
Nuc. mosch. expr. ʒj
Garyophill. gr. iij
Opii veri gr. viij
Crocī gr. vj
Cum pauca cera
F. Linimentum.
s. Schlaf-Sälblein T.

FINIS.



INDEX.



INDEX.

RERUM NOTABILIVM IN HOC CONSILIORUM LIBRO CONTENTARVM.

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| A Ceti rutacei vis in sistendis catharrhis ad pectus fluentibus. | 213. | Aqua bezoartica. | 253. |
| Acida lae corrumpunt. | 144. | - - cephalica contra Epilepsiam. | 115. 121. 124. |
| Acidularum usus. | 327. | - - ceraforum descriptio. | 123. |
| Aër nimis calidus vitantus in cura epilepsiae. | 143. | - - chalybis utilis in melancholia hypochondr. | 289. |
| Aloes & Agaricus venas aperit. | 9. | - - ex floribus raporum utilis in asthmate. | 210. 214. |
| Althææ pulvis egregius in Renum calculo. | 361. | - - prophylactica contra apoplexiam & epilepsiam. | 123. |
| Alvi profluvio in febribus malignis quomodo succurendum. | 272. | - - Sudorifera. | 121. |
| Alvus in melancholia hypochondr. semper debet esse fluida. | 51. | Aquæ aureæ descriptio. | 124. |
| Ambra valde conducit cerebro. | 54. | Aromata locum non habent in epilepsiae cura. | 143. |
| Anginæ quomodo succurrendum in febribus petechialibus. | 270. | Arthritidis causæ. | 401. |
| Antidotum in epileps. curatione. | 120. | Astmatis causæ. | 202. |
| Anxietatis & lipothymiae causa in melanch. hypochondr. | 41. | Atrophia & capitis dolor ab incalescentia venarum mesaraicarum. | 15. |
| Apophlegmatismus ad capitis expurgationem. | 126. | Aurum diaphoreticum in epilepsia. | 111. |
| Apozema purgans in epilepsia & M. H. | 78. 97. | Balsamo succini inungendæ sunt nares in paroxismo epilept. | 142. |
| Aqua aluminosa & falsa ad pedum tumorem. | 301. | Betæ succus naribus attractus pituitam elicit. | 127. |
| - - antepileptica. | 102. 148. | Bezoar lapis egregie Sudorem provocat. | 265. |
| | | N n n | Bezo- |

INDEX

| | |
|---|---|
| Bezoarticorum medicamentorum virtus & natura in quibus con- sistat. 6. | Causa efficiens motus depravati pulmonis. 201. |
| Bolus alvum laxans. 16. 23. 142. 313. | - - epilepsiæ ab utero. 109. |
| - - in epilepsi. curat. 117. | Causæ ventriculi coctionem labe- factantes. 36. 37. |
| - - præservatio. apoplex. 153. | - - epilepsiæ quot. 128. |
| - - in melanch. hypochondr. 64. | - - gravioris vel mitioris paro- xysmi in melancholia hypochondr. 38. |
| Brassicæ quid succus prodest. 127. | Cerotum in epilepsia. 100. 107. |
| Capæ humectant & cale faciunt ven- triculum. 348. | - - stomachale. 70. 303. |
| Calculi in venis mesaraicis reperti. 39. | - - in diabete. 354. |
| - - in renibus generatio unde. 355. | - - pro bregmate. 304. |
| - - materia quænam. 357. | Chalybis malignitas. 19. |
| Caput mult. flux. causa. 187. | Chrysolitus lapis ad curandos me- lancholicos. 229. |
| Capitis corroboratio. 128. | Chylus corruptus causa epilepsi. 141. |
| Caponis decoctum. 79. | Claretum in melancholicum hypo- chondr. 19. 20. |
| Carnes licentiosè non comedenda. 211. | - - Antepilepticum. 98. 99. |
| - - in melanch. hypoch. 56. | Clyster in dolore capitis. 5. |
| Caro turtorum & passerum comesta adversatur comitiali morbo- Sive epilepsiæ. 113. | - - in melanch. hypochondr. (51. 70. 74. 80. |
| Cataplasma ad expectorandam ma- teriam. 211. | - - liniens in epil. 120. 141. 129. |
| - - in maturando tubercu- lo crudo pulmo- num. 220. | - - in hydrope. 318. |
| - - ex cancri in sedando dolore nephriti- co. 359. | Clysteres domestici. 51. 341. |
| - - adstringens in dysente- ria expertum. 309. | Cochlearia incidit crassum sangvi- nem. 182. 363. |
| Cauteria in cruribus & brachiis ad curandam epilepsi. 133. | (ad) Coitum quæ necessaria. 366. |
| - - in asthmate an conveni- ant. 203. 204. | Conditum in elepsia. 92. 100. 143. |
| Causa calculi in renibus. 37. | - - in mel. hypochondr. 68. 78. |
| | - - confortans stomachum & epar. 183. |
| | Confectio in atrophia, capitis gra- vitate. 15. |
| | - - in præservat. epil. 147. |
| | imbecilli visione. 175. |
| | Confortativum hepatis lienisq; 29. |
| | Cor- |

RERUM NOTABILIMUM.

| | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| Corroboratio capitis in. | 128. | Electuarium confortativum in a- | |
| Conserva confort. | 68. | peps. ventr. | 295. |
| Conspicillorum usus qualis. | 178. | - - in febre hectica. | 240. |
| Crocus sedat valde dolorem. | 419. | - - stomachicum in melanch. | |
| Crurum difficult. motus causæ. | 28. | hypoch. | 29. |
| Cucupha capitalis. | 162. | - - epaticum & spleneticum in | |
| Cucurbitularum usus in renum cal- | | melanch. | 29. |
| culo. | 360. | - - contra morbum caducum | |
| Curatio febris malignæ. | 262. | sive epileps. | 114. 123. |
| - - paroxysmi epileptici. | 105. | - - leniens in epilepsia. | 122. |
| - - alexipharmacum. | 65. | - - antepilepticum roborans. | |
| Decoctum ligni quajaci. | 6. 61. 65. | (133. 147. 134. | |
| (124. 132. 133. | | - - chalybis præparans & pur- | |
| - - in cephalæa, | 10. | gans. | 316. |
| - - caponis. | 79. | - - laxativum in imbecil. & | |
| - - in epilepsia. | 102. 114. 133. | obst. lienis. | 329. |
| (142. 143. | | - - in diabet. | 354. |
| - - lignorum in melanch. hy- | | - - ad coitum. | 347. |
| pochondr. | 79. | - - lenitiv. in melanch. hypo- | |
| - - = profiti. | 11. | chondr. | 49. |
| - - Sudoriferum pro potu | | - - corrob. | 147. |
| ad sudor. ciend. | 125. | - - confortativum in præser- | |
| - - saffr. cum quajaco. | 179. | vat. apoplex. | 155. |
| - - ad Tussim & asthma. | 197. | - - in atrophia capitis gravi- | |
| - - in asthmate. | 207. | tate ac. | 16. |
| Defluxionis ad oculum fons & | | - - in melanch. hypoch. | 69. |
| origo. | 163. | - - nocturnum in epileps. | 122. |
| Diæta nutricum in curatione infan- | | Elixyr confortans caput & stoma- | |
| tulorum epilepticorum. | 143. | machum in M. H. | 80. |
| - - qualis in febrib. malignis. | 276. | Emplastrum stom. in melanch. hy- | |
| Digestivum in epilepsia. | 129. 130. | poch. antepil. | 100. |
| Dislocatio uteri quomodo cure- | | Enema emolliens in præservazione | |
| tur. | 389. 393. | apoplex. | 153. |
| Doloris causa quænam. | 184. | - - in epilepsia. | 120. 129. 145. |
| - - hæmorrhoidum quibus se- | | - - flatus educens ac discu- | |
| detur. | 346. | tiens. | 302. |
| | | - - abstersivum in dysente- | |
| | | teria. | 307. |
| | | Ene- | |

INDEX

| | | | |
|--------------------------------------|----------|--|--------------------------------|
| Enema in melanch. hypoch. 51. 70. | (74. 80. | Hauftus evacuativus in diffenteria | prorobust. 307. |
| - - in præservat. apoplex. 153. | | - - aperitivus & purgativus in | hydrophe. 320. |
| Epilepsia per consensum ex utero. | (109. | - - sudoriferus in epileps. 146. | |
| Epilepsiæ causæ. 128. | | - - ex gaujaco in prof. apoplex. | (157. |
| Epilepticæ materiæ duplex sana- | 97. | Hæmorrhoidum apertio utilis in me- | lanch. hypochondr. 61. 74. |
| Epithema cordis & epatis. 266. | | - - dolor quomodo sedand. 346. | |
| Errhinon ad cerebri expurgatio- | 126. | Hæmorrhagiæ quomodo occurren- | dum in febribus malignis. 274. |
| - - in epilepsiæ curatione. 133. | | Hermetici melanchol. hypochondr. | morbum ☿ ☉ laris præcipita- |
| Extractum cardui. 20. | | ti vocant. 71. | |
| Febres lenticulares an veteribus | 257. | Hydromel in epilepsia. 104. | |
| cognitæ. 257. | | Hydropis curatio, quæ requirat. 315. | |
| Febrium lenticularium essentia & | 258. | Hypochondriacæ melanchol. causæ | & generationis modus. 395. |
| - - malignarum causæ & Si- | 246. | - - signa. 337. | |
| gna. 246. | | Imaginationes depravatæ causa in | melanchol. hypochondr. 39. |
| Flores verbasci utiles in dyssente- | 210. | Impotentia venereæ causæ. 366. | |
| ria. 210. | | - - venereæ curatio. 368. | |
| Fotus in obstructione lienis. 345. | | Indicationes curativæ in melanch. | hypoch. 48. 67. 68. 73. |
| - - pro intestinis. 421. | | - - curativæ in astmate. 203. | |
| Friccio arduum & doffi. 126. | | - - curativæ in renum calculo. | (359. |
| Gargarismus in epilepsia. 114. | | Ira & terror in vertigine vitanda. 87. | |
| - - in capitis affectu utilis 126. | | Iulapium purgans in mel. 24. 25. | |
| Glyzericæ frequens masticatio utilis | 361. | Lac chalybeatum in dyssenteria | utile. 307. |
| in renum calcul. 361. | | Lapis bezoar egregiè sudorem pro- | vocat. 265. |
| Gaujacum potenter incidit. 6. | | - - in vesica tauri repert. &c. 103. | |
| Gaujaci ligni decoctum. 6. 61. | | - - chrysolitus prodest in melan- | chol. 229. |
| (65. 124. 132. | | | Lie- |
| - - usus quam diu continuan- | 151. | | |
| - - dus in morbis chroni- | | | |
| cis. 151. | | | |
| - - an destillandum vel co- | 151. | | |
| quendum. 151. | | | |
| Hauftus purgativus in epilepsia 129. | | | |
| - - aperitivus. 296. | | | |

RERUM NOTABILIMUM.

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| Lienis usus qualis. | 334. | Medullæ cervinæ usus insignis in ne- | |
| - - cura opt. | 333. | phritide. | 359. |
| Lenientia opt. medic. mal. hypo- | | Melanch. hypochondr. à spagiricis | |
| chondr. | 49. | morbus ☿ ij ☉laris præcipita- | |
| Lignum saffrafras appropriatum in | | ti vocatur. | 71. |
| capitis affectibus. | 6. 178. | - - hypoch. differentia. | 33. 34. |
| - - indicum stomachicum. | 61. | causæ. | 34. 395. |
| - - in unct. in epilepsia. | 147. | - - hypochondr. fons. | 336. |
| Linctus ori puerorum ingerendus | | Mithridatij usus in melanch. hypo- | |
| in epilepsia. | 142. | chondr. | 75. |
| Linimentum spleneticum & hepa- | | - - in epilepsia. | 132. |
| ticum. | 14. 17. | - - in præservat. apoplex. | 157. |
| - - pro naribus in paraxismo | | Mirachialis morbus Avicennæ. | 33. |
| epilepti. | 107. 133. | Mixtura splenetica. | 348. |
| - - pectorale. | 211. | - - confortativa. | 78. |
| - - spleneticum & hepatic. | 69. | - - in epilepsia. | 92. 101. 118. |
| | (345. | - - ad ling. in epilepsia. | 147. |
| Lohoch. | 160. 196. 197. 209. | Morsuli capitales in vertigine pro- | |
| Lotio capitis cum herbis capitalibus | | fliganda. | 88. |
| in epilepsia. | 92. 103. 127. | - - in capitis gravitate. | 17. 162. |
| - - pedum in epilepsia per con- | | - - in melanch. hypoch. | 31. 32. |
| sensum ex utero. | 111. | | (79. 343. |
| Lumen juvat expulsionem materiæ | | - - antepileptici. | 122. |
| in epilepsia. | 144. | - - cephalici corroborant. | 155. |
| Macularum in febribus lenticularib. | | | (351. |
| differe. | 259. | - - contra marasum. | 246. |
| - - in febribus malignis quid por- | | - - in præservat. apoplex. | 156. |
| tendant. | 251. | | (351. |
| Magisterium crystallorum contra | | - - confortantes. | 372. |
| morbos tartareos. | 333. | - - ad corrigendam impoten- | |
| Majorana pituitum blandè expur- | | tiam veneream. | 375. |
| gat. | 127. | Moschus valde confert capiti con- | |
| Masticatorium ad cerebrum expur- | | fortando. | 54. |
| gandum. | 126. | Motus in ordinati causa in melanch. | |
| Materia calculi quænam. | 357. | hypochondr. | 40. |
| Mathioli descriptio spiritus ex an- | | Nephritis unde generatur | 355. |
| tidoto. | 111. | - - curatio. | 355. |
| | | N n n 3 | No- |

INDEX

| | | | |
|--|-------------|---|---------------|
| Nodulus capitalis purgans in vertigine. | 87. 89. | Pedum tumori confert aqua aluminosa & salsa. | 301. |
| - - purgans in atrophia & capitis dolore. | 17. | Penis cur interd. non erigatur. | 366. |
| - - aperitivus & laxativ. | 183. | Pessarium saccharinum ad coitum | 373. |
| | (385. 399. | Pillularum de Nitro usus egregius in capitis affectionibus. | 5. 133. |
| - - alterans, attenuans & purgans in asthma. | 226. | - - caput purgantes. | 14. 17. 88. |
| - - ad obstructionem lienis. | (329. 397. | (132. 149. 155. 159. 161. 162. | |
| - - ad cerevisiam. | 14. 184. | - - utiles in epileps. | 99. 114. 118. |
| - - laxativus cum vino in epileps. | 90. | - - nocturnæ in curatione epilepsiae. | 134. |
| - - in atrophia, &c. | 17. | - - antinephritica. | 346. |
| - - pro lotione capitis injciendo in lixivium. | 103. | - - in praeservat. apoplex. | 155. |
| - - pro lotione capitis. | 92. | - - in vertigine & spasmo. | 87. |
| Nutritionis frustratae causa. | 436. | - - in melanch. hypoch. | 23. 26. |
| | | (50. 54. | |
| Oleum stilat. castorei utilissimum in epileps. | 142. | - - montani. | 99. |
| - - salviae, auribus indendum in crura epilepsiae. | 145. | - - pro nutric. | 142. |
| - - vitrioli, mire sistit sputum sanguinis. | 219. | Pinguis flatus generant. | 369. |
| - - stomachicum in hypoch. & Tum. splen. | 343. | Pistatia ab Avicenna dicta epatis theriaca. | 63. |
| - - cordiale in impotentia aphrodisia. | 371. | Passulae purgantes. | 77. |
| - - ad tumorem varicosum scroti. | 373. | Potio purgans succum melancholicum. | 183. |
| - - ad suduram. | 148. | - - cathartica in melancholia hypochondr. | 67. 68. 69. |
| Olivæ hispanicae sunt spleneticae. | 348. | - - conveniens in cura morbi caduci. | 114. 122. |
| Parietariae usus insignis in nephritide. | 359. | - - purgans in epilepsia. | 130. 143. |
| Paracelsi descript. pro lotione pedum. | 111. | - - pectoralis. | 221. |
| | | - - purgans. | 193. |
| | | - - aperitiva. | 296. |
| | | - - abstersiva in dysenteria. | 306. |
| | | - - sudorifera in hydrope. | 320. |
| | | - - vulneraria. | 435. |
| | | Potiuncula in melanch. hypoch. | 69. |
| | | Praeservatio paroxismi epilept. | 145. |
| | | Pro- | |

RERUM NOTABILIMUM.

| | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Pognosis in epilepsia per consensum stomach. | 141. | Rotulæ in tussi & sanguinis senatu. | 217. |
| Pulvis antepilepticus. | 91. 101. | Rubedo oculorum. | 163. |
| - - dentis piscis rosmar. dicti uti- | | Ructuum acidorum causa in melan- | |
| lis in epilepsia. | 142. | chol. hypochondr. | 41. |
| - - cephalicus. | 165. | Ruta aceto trita, nares fricandæ in | |
| - - in melanch. hypoch. | 31. | epileps. | 142. |
| - - pepticus in melanch. hypo- | | | |
| chondr. | 54. 65. | Sacculus appensus collo, curat epi- | |
| - - in epilepsia. | 104. 147. | lepsiā. | 142. |
| - - epatis ranarum confert. epi- | | - - purgans. | 4. |
| lepsiæ. | 106. | - - cordialis. | 372. |
| - - ophtalmicus in continua ad | | - - ad cerevis in Erysipelat fa- | |
| oculos defl. | 165. | cie, &c. | 14. |
| - - bezoarticus. | 252. | Salivæ multæ excretiones causa quæ- | |
| - - adstringens in dysenteria | 308. | nam in melanch. hypoch. | 42. |
| - - spleneticus. | 349. | Sassafras confortativ. capitis. | 6. 178. |
| - - capitalis. | 352. | Sapo peculiaris. | 92. |
| - - contra calculum. | 361. | - - pro lotionē manum. | 103. |
| - - venerem stimulan. | 376. | - - cephalicus. | 215. |
| - - in atrophia. | 17. | Scopi curativi in mel. hypoh. | 48. |
| Purgantia valida in initio curæ me- | | Scutum stomachale. | 55. 66. 70. 81. |
| lanch. hypoch. vitanda. | 49. | Semen præoniæ tritum exhibendum | |
| | | in paroxismo epileptico. | 142. |
| Rotulæ capitales. | 7. 11. 15. 51. 65. | - - cur quandoque in coitu non | |
| (88. 89. 148. 156. 255. | | externatur. | 367. |
| - - pro præservatione paroxismi | | Seri lactis damna. | 20. |
| hypoch. | 30. 31. 51. 65. | - - caprini utilitas in contempe- | |
| - - contra lipothymiam. | 30. | rando calore hyp. | 50. |
| - - antepilepticæ. | 92. 102. 105. | Signa melancholiæ hypochondr. | 38. |
| (106. 147. 148. | | - - epilepsiæ per consensum à | |
| - - pectorales. | 160. 209. 212. | cruribus. | 94. |
| - - caput confortant. | 352. | - - antecedentia febres mali- | |
| - - venerem stimulant. | 375. | gnas. | 259. |
| - - in cephalæa & cathar. | 11. | - - prognostica earundem fe- | |
| - - contra vertiginem. | 89. | brium. | 260. |
| - - in præserv. apoplex. | 156. | Sinapismus in epilepsia. | 100. |
| - - ad asthma. | 197. 209. | Sin- | |

INDEX.

| | | | |
|--|------------------------|---|---------------------|
| Singultui in febribus malignis quomodo occur. | 274. | Syrupus magistralis in obstructione lienis. | 338. 338. 399. 399. |
| Sitis in febribus ardentibus quomodo profligando. | 271. | - - antinephriticus. | 360. |
| Somni materia sunt benigniores fumi. | 73. | - - parientariæ & glyzerizæ insignis in curando calculo & arenulis expellendis. | 361. 362. |
| Somnus diurnus improbatur. | 227. | - - in præservat. apoplex. | 155. |
| Sopor quomodo corrigendus in febribus malig. | 270. | - - in epilepsia. | 130. 131. 132. |
| Species pro coct. cap. | 79. | - - in melanch. hypoch. | 31. |
| Spiritus ceraforum laudatur in vertiginæ & epilepsia. | 142. | - - in marasmo curando. | 243. (256. |
| - - antepilept. | 103. 106. 111. | Tabulæ ad venerem stimuland. | 375. |
| - - sulphuris insignis virtutis in asthmate. | 213. | Terror & ira sumopere vitanda in vertigine. | 87. |
| Splenetica medicam. quænam. | 310. | Theriaca epatis Avicennæ. | 63. |
| Stomachicum. | 70. | Thermæ quomodo profunt in cephalæa & cath. | 9. |
| Succus pituitosus ac melancholicus non prorsus à causa morbi caduci excludendus. | 128. | - - carolinæ lentum ac frigidum succum consumunt ac calesfaciunt ventriculum. | 9. |
| - - expertissimus in melanchol. hypochondr. | 31. | - - carolinæ quomodo utendæ an in tumore flatulento conf. | 322. |
| Sudoriferus haustus in epileps. | 146. | - - in melanch. | 28. |
| - - ex decoct. gaujaci. | 157. | Thermarum earundem in commoda in melancholicis. | 8. 9. |
| Suffimigium in tenesmo. | 310. | Tortari virtus. | 332. |
| Suffusionis causa. | 177. | Tragæa in melanch. hyp. | 27. 65. 76. |
| Suppositorium anodynum in dysenteria. | 310. | - - in melanch. | 27. |
| Symptomata melanch. hypoch. non in omnibus sunt eadem. | 44. | - - stomachalis in atrophia & | 18. |
| Syrupus ad evacuandos humores adustos in melanchol. hypochondr. | 3. 24. 53. 63. 64. 78. | - - in Epilepsia sive pulvis pepticus. | 147. |
| - - longus purgans. | 154. | - - ad ardorem ventriculi. | 297. |
| - - purgans antepileptic. | 97. 98. (119. 130. | Trochisci pro fumo in melanchol. hypoch. | 76. |
| - - concoquens materiam pituitosam in asthmate. | 204. | - - pro fumo in impotentia aphrodisia. | 372. |
| | | Tro- | |

RERUM NOTABILIMUM.

| | | | |
|---|-----------------|---|-----------|
| Trochisci pro fumo in impotentia decumbendi. | 387. | Vinum Ketzschbergicum noxium epar calidum habendibus. | 83. |
| Venerem languidam stimulantia. | 368. | Vinum Laxativum. | 87. |
| Venæ sectio in melancholia hypochondr. | 61. 67. 74. | Vinum Medicatum Muralti præp. | 319. |
| - - quandoque necessaria incurat. epileps. | 130. | - - Erasti purgans. | 316. |
| - - periculosa in malignis febribus. | 267. | Virga in coitu cur interdum non erigatur. | 366. |
| - - in nephritide quando & quomodo instid. | 359. | Visionis modus qualis. | 167. 169. |
| Ventriculus frigidus comes epatis calidioris. | 298. | Vitrioli olei usus in hæmoptosi sistenda. | 219. |
| Ventriculus causa primaria cephal. | 9. | Vita ad confortationem visus. | 176. 177. |
| - - mali melanch. hypochondr. | 58. | Ulcernum dysepuloticorum curatio. | 427. |
| Verbasci florum usus in dysenteria. | 310. | Ulcus Sinuosum. | 427. |
| - flores sedant dolorem hæmorrhoidum. | 346. | Unguendum pro rimis labiorum. | 15. |
| Vesicatorium in epilepsia per consensum. | 91. 100. 108. | - - stomachale. | 55. 81. |
| - - affectibus oculorum ex deflux. | | - - epaticum. | 69. 156. |
| Victus ratio quæ servanda in melanch. hypochondr. | 56. 57. 62. 71. | - - renum refrigerans. | 156. |
| - - in epilepsia. | 103. 104. 113. | - - refrigerans pro hepate. | 303. |
| - - qualis instituenda in febr. malig. | 276. | - - in hydrope. | 317. |
| Vigiliæ quomodo corrigendæ in febribus malig. | 269. | - - - obstructione lienis. | 331. |
| | | - - nephriticum. | 356. |
| | | - - ad varicorum tumorem scroti. | 373. |
| | | - - digestivum. | 429. |
| | | Unguentum pro præservat. parox. epil. | 148. |
| | | - - splen. & hepat. in præservat. apoplex. | 156. |

INDEX RERUM NOTABILIU M.

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Vomitioni nimius in febribus ma- | Usus ligni tormina gignit. | 152. |
| lignis quomodo. | 273. | |
| Urinæ Signa. | 60. | |
| Succurrendum. | | |
| Urinarum tenuium & albarum it. | Uteridis locatio quibus medicamen- | |
| acrium causæ. | 34. | 389. 390. |
| | | thermarum carolinarum |
| | | qualis. 295. |

FINIS.



